


LONG POINT BIRD OBSERVATORY, ONTARIO

EN RESERAPPORT FRÅN SYDÖSTRA KANADA

17/8 – 7/11 1999

Long Point ligger beläget i södra delen av provinsen Ontario, ca. 200 km söder om Toronto. Som namnet antyder så går Long Point ut som en udde i sjön Erie, den sydostligaste av de fem stora sjöarna.



Fågelstation 1: Stationen heter Old Cut och är basstationen varifrån verksamheten organiseras. God standard på stationen som om du stannar längre än tre veckor står med gratis mat och logi, mot att du hjälper till med ringmärkning och dyl.

Old Cut är den station som oftast ringmärker mest fågel per säsong, mycket tack vare dess skyddade läge gentemot den ofta ihållande blåsten.

Som fåltornitolog så är dock Old Cut den station som ger minst utbyte när det gäller antal arter p.g.a. dess läge, insprängt i ett villaområde. Av tättingar är i stort sett samtliga arter anträffade vid Long Point möjliga i trädgårdarna kring Old Cut. Den största fördelen som jag ser det med Old Cut är närheten till områdets många våtmarker speciellt den s.k. Causeway med tillhörande hägrar, änder och vadare.

Fågelstation 2: Stationen heter Breakwater och är belägen 10 km väster om Old Cut. Detta är den minsta och enklaste stationen och saknar både elektricitet och toalett, har dock ett väl fungerande utedass.

Breakwater är enligt min mening det klart charmigaste platsen. Närheten till alla fåglar är mycket påfallande men rörelsefriheten är tyvärr begränsad p.g.a. att marken där stationen ligger ägs av Long Point Company.

Breakwater avslutar sin verksamhet tredje veckan i september varje år då andjakten drar igång.

Goda möjligheter att se doppingar, änder, rovfåglar samt tättingar.

Fågelstation 3: The Tip är som namnet antyder beläget på spetsen av den drygt 30 km långa udden.

Tippens utsatta läge, nästan i mitten av sjön Erie, gör att det nästan alltid blåser härute.

Dagar då riktiga "nedfall" med fågel sker så är detta bästa platsen att vara på, då avsaknaden av stora täta buskage gör att man har goda förutsättningar att hitta egna godbitar i mängderna av övriga fåglar.

Tippen är också den bästa stationen beträffande studier av sträckande och rastande sjöfågel.

Under senare delen av oktober och i november samlas stora mängder bergänder för att födosöka runt omkring udden och i dessa flockar finns det alltid andra spännande dykänder m.m.

Vädret hösten 99

Augusti

Förhållandevis varmt med kring +23 - +31 grader på dagarna. Vindarna mest svaga och varierande. Nederbörd noterades under fyra dagar, då i form av lättare regn, men även några kraftiga åskväder drog förbi. Vattentemperaturen nådde upp till behagliga 25 grader.

September

Började som augusti slutade med svaga vindar och +25 - +30 graders värme. Andra halvan av september var mer ostadig med friska västliga vindar och dagstemperaturer omkring 20 graders strecket. Nederbörd noterades under åtta dagar, alltifrån lätt regn till kraftiga åskväder. Vattentemperaturen sjönk till 18 grader i slutet av månaden.

Oktober

En blåsig och sval månad, dagstemperaturen sjönk från ca 20 grader ned till +8 - +10 grader och träden avlövdades i snabb takt. Även denna månad noterades nederbörd under åtta dagar. Hårda vindar noterades under många dagar även om höststormarna uteblev. Vattentemperaturen sjönk ned till outhärdlig för bad

November

Den första novemberveckan bjöd på ihållande västliga vindar, dagstemperatur på ett par plusgrader och det första snöblandade regnet föll den 3 november

Nedan följer en komplett artlista på alla ringmärkta samt observerade fåglar mellan 17 augusti och 7 november. När det gäller ringmärkningsciffrorna, så är antalet som står sist i varje artsammanfattning en summa av de fåglar som har fångats och ringmärkts på just den station jag för tillfället befann mig. Det är alltså inte någon totalsumma för Long Point Bird Observatory.

Detta har jag gjort för att man lättare skall kunna få en känsla av vad man själv skulle kunna få fånga och ringmärka om man stannar där en höst.

Under 1999 ringmärktes totalt 8411 fåglar på Long Point, varav 4280 på Old Cut, 819 vid Breakwater samt 3312 vid Tippen.

Totalsumman ligger ca 1500 fåglar under snittet. Mycket tack vare det alldeles för fina vädret som rådde under speciellt första septemberhalvan.

Red-throated Diver *Gavia stellata*

Totalt sågs 7 ex mellan den 17/9 och 23/10.

Great Northern Diver *Gavia immer*

Totalt sågs 254 ex mellan 31/8 och 7/11 Toppdagar: 43 str. Tippen 23/10 samt 51 str. Old Cut 4/11.

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps*

Sågs under hela perioden, ökade dock i antal under senhösten, som mest med 96 ex längs Causeway 29/10.

Horned Grebe *Podiceps auritus*

Sågs mellan 1/9 och 28/10 med 100 tals ex. Toppdagar: 38 rst/str 2/10, 67 str 21/10, 54 rst 27/10.

Alla observationer avser Tippen

Red-necked Grebe *Podiceps grisegena*

Totalt sågs 3 ex mellan 21/10 och 27/10. Samtliga obsar vid Tippen.

Double-crested Cormorant *Phalacrocorax auritus*

Sågs under hela perioden, största antalen i sept. därefter sinande antal bl.a. 1200 rst vid Tippen 13/9.

American Bittern *Botaurus lentiginosus*

Sågs vid ett tillfälle, 3 ex flygande över vassarna vid Breakwater 28/8.

Great Blue Heron *Ardea herodias*

Sågs under hela perioden, som mest ett 20 tal Breakwater i september, minskade i antal under oktober månad, endast enstaka kvar i november

Green-backed Heron *Butorides striatus*

Nästan dagligen sågs enstaka från 18/8 fram till 9/10, flest observationer gjordes vid Old Cut.

Great Egret *Casmerodius albus*

Sågs mellan 17/8 och 21/9. Toppnoteringar: 11 ex längs Causeway 20/8, 7 ex Breakwater 17/9.

Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax*

Sågs mellan 29/8 och 17/9. 1 ex Breakwater 28/8, 4 ex Causeway 6/9, 2 ex Causeway 11/9, 1 ex Breakwater 17/9.

Tundra Swan *Cygnus columbianus*

Sågs mellan 23/10 och 7/11. Ökade dag för dag, kulminerade i början av november med ca 600 ex vid Old Cut.

Trumpeter Swan *Cygnus buccinator*

1 par sågs vid Turkey Point Marsh 21/8 (återinplanterad).

Mute Swan *Cygnus olor*

Sågs mellan 23/8 och perioden ut. Som mest ca: 15 ex kring Old Cut.

Brent Goose *Branta bernicla nigricans*

1 adult str. vid Tippen 11/10

Canada Goose *Branta canadensis*

Sågs under hela perioden. Antalen ökade under hösten och kulminerade i mitten av oktober

Wood Duck *Aix sponsa*

Sågs nästan dagligen mellan 20/8 och 2/10 (1 ex sågs även den 4/11) ofta 5-15 ex.

Green-winged Teal *Anas crecca carolinensis*

Sågs nästan dagligen under hela perioden, som mest 1900 ex vid Causeway 10/9.

American Black Duck *Anas rubripes*

Sågs nästan dagligen under hela perioden, som mest 50 ex vid Breakwater 2/10.

Mallard *Anas platyrhynchos*

Sågs dagligen under hela perioden, som mest 2000 ex vid tippen 9/10.

Northern Pintail *Anas acuta*

Sågs från 28/8 och perioden ut, ökade gradvis under hösten och kulminerade med 450 ex Tippen 9/10.

Blue-winged Teal *Anas discors*

Sågs från 17/8 till slutet av september, kulminerade med 400 ex Causeway 10/9.

Northern Shoveler *Anas clypeata*

Sågs mellan 19/8 till början av oktober (4 ex Old Cut 6/11) Som mest 55 ex Causeway 10/9.

Gadwall *Anas strepera*

Sågs sparsamt under hela perioden.

American Wigeon *Anas americana*

Sågs från 28/8 och perioden ut, antalen ökade under hösten och kulminerade med 600 ex vid Tippen 9/10.

Canvasback *Aythya valisineria*

Sågs från 20/9 och perioden ut, fåtalig under september/oktober, som mest drygt 7000 ex vid Old Cut 2/11.

Redhead *Aythya americana*

Sågs fåtaligt mellan 16/10 och 30/10, totalt endast ett 10 tal individer.

Ring-necked Duck *Aythya collaris*

Sågs med enstaka exemplar mellan 22/10 och 4/11 Totalt ca 12 ex

Greater Scaup *Aythya marila*

Första fåglarna dök upp 17/9 och sågs perioden ut. Antalen ökade under hela hösten och arten sågs dagligen i mer eller mindre stora flockar under andra halvan av oktober. Toppdagar: 5 000 ex Tippen 21/10, 8 500 ex Tippen 22/10.

Lesser Scaup *Aythya affinis*

Första dök upp 30/8 och sågs sedan perioden ut. Likt dess större släkting växte antalen rejält under hösten, t.ex. 1 300 ex 7/10, 10 000 ex 14/10, 33 000 ex 21/10, 65 000 ex 22/10 samtliga vid Tippen.

Oldsquaw *Clangula hyemalis*

Sågs fåtaligt/sparsamt mellan 31/8 och 27/10, som mest 27 str ex Tippen 27/10.

Black Scoter *Melanitta nigra americana*

Sågs fåtaligt från 28/9 och perioden ut, max 20 ex inblandade.

Surf Scoter *Melanitta perspicillata*

Sågs sparsamt/allmänt från 20/9 till 28/10. Bl.a. 30 ex Tippen 9/10, 45 ex Tippen 19/10.

White-winged Scoter *Melanitta fusca*

Sågs sparsamt från 30/8 och perioden ut, som mest 21 str ex Tippen 14/10.

Common Goldeneye *Bucephala clangula*

Dök upp 22/10 och antalen ökade fram till slutet. Som mest ca 25 ex vid Causeway 1/11.

Bufflehead *Bucephala albeola*

Sågs från 19/10 och perioden ut. Antalen ökade under hösten och som mest sågs 125 ex vid Turkey Point Marsh 4/11.

Hooded Merganser *Lophodytes cucullatus*

Sågs med 1 ex 20/10, därefter först i november med 14 ex Old Cut 4/11 samt ca 7 ex per dag vid Old Cut den 5/11- 7/11.

Common Merganser *Mergus merganser*

Fåtalig gäst under senhösten, totalt mindre än 50 ex. Samtliga fåglar observerades vid Tippen.

Red-breasted Merganser *Mergus serrator*

Sågs från 16/9 och perioden ut och antalen ökade allt eftersom hösten gick. Nästan samtliga observationer gjordes vid Tippen med som mest 50-75 per dag i slutet av oktober.

Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*

Sågs från 17/9 och perioden ut, antalen ökade under perioden och kulminerade med en flock på 1800 ex vid Old Cut den 2/11. Tidigare under hösten hade endast flockar på mellan 50-100 ex setts, främst vid Tippen.

Turkey Vulture *Cathartes aura*

Observerades sparsamt under nästan hela hösten, som mest ett 10tal ex per dag i slutet av september.

Osprey *Pandion haliaetus*

Sparsam sträckare under hösten. Sista fågeln observerades 18/10 och som mest sågs 4 ex vid Breakwater den 17/9.

Bald Eagle *Haliaeetus leucocephalus*

Sågs mellan 25/8 och 5/11 Trots att arten troligen häckar med något par på Long Point så sågs örnar relativt sällan (i snitt var tredje dag). Fynden ökade under senare delen av september/oktober då framförallt fler ungfåglar sågs. Högsta dagsnotering blev 5 ex i såväl september som oktober vid Breakwater/Tippen.

Northern Harrier *Circus cyaneus*

Allmänt observerad i augusti/september och första halvan av oktober, därefter endast noterad med några enstaka exemplar fram till 6/11. De största antalen sågs vid Breakwater och toppen kom 17/9 då 25-30 ex sågs.

Sharp-shinned Hawk *Accipiter striatus*

Sågs näst intill dagligen från slutet av augusti och två månader framåt. Toppdagar blev bl.a. 1/9 med 269 str vid Breakwater, 125 str. Breakwater 2/9, 75 str. Breakwater 17/9 samt 65 str vid Tippen 20/10. Totalt sträckte det något tusental under hösten varav 19 ex kunde ringmärkas.

Cooper's Hawk *Accipiter cooperii*

Sågs fåtaligt under hela perioden, dock med en liten topp i oktober. Totalt sågs ca. 15-18 individer och 1 ex ringmärktes även vid Old Cut i början av november.

Northern Goshawk *Accipiter gentilis*

Totalt 6 observationer under de sista höstveckorna, samtliga fåglar var juvenila.

Red-shouldered Hawk *Buteo lineatus*

Totalt sågs ca 18 individer under de tre sista höstveckorna, som mest 6 str 24/10 vid Tippen.

Broad-winged Hawk *Buteo platypterus*

Under de två första veckorna i september sågs 24 str ex, alla vid Breakwater. (De stora antalen uteblev tyvärr p.g.a. brist på väst-nordvästliga vindar i början av september).

Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis*

Sågs regelbundet under hela perioden, antalen var som störst under senhösten med bl.a. 30 str ex 6/11 vid Old Cut.

Rough-legged Hawk *Buteo lagopus*

Totalt observerades 11 ex från 18/10 och perioden ut, flest 4/11 med 3 str vid Old Cut.

American Kestrel *Falco sparverius*

Observerades sparsamt/allmänt mellan 21/8 och 23/10, som mest 18 str vid Breakwater 17/9.

Merlin *Falco columbarius*

Uppträdde sparsamt/allmänt mellan 22/8 och 26/10, som mest 11 str vid Breakwater 17/9.

Peregrine *Falco peregrinus*

Mellan 17/9 och 16/10 observerades 7-8 ex. Flertalet var yngre fåglar inkl. 1 1k hane med en radiosändare på ryggen!

Virginia Rail *Rallus limicola*

En adult sågs promenera omkring helt öppet vid en liten damm vid Tippen 27/9.

Sora *Porzana carolina*

Sågs vid tre tillfällen, 2 ad+1 1k vid Causeway 11/9 samt en 1k vid tippen 27-28/9.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*

Sågs mellan 17/8 och 7/9 med upp till 5 ex vid främst Causeway.

American Coot *Fulica americana*

Sågs inte förrän och 29/10 och perioden ut. Som mest räknades 860 ex in vid Causeway 31/10.

Sandhill Crane *Grus canadensis*

Sågs vid tre tillfällen mellan 21/8 och 29/10, totalt 14 fåglar. Samtliga obsar utgjordes av översträckande fåglar vid Old Cut.

Black-bellied Plover *Pluvialis squatarola*

Sågs sparsamt mellan 17/8 och 1/11 vid främst Causeway. Som mest 25 ex 31/10.

American Golden Plover *Pluvialis dominicana*

Mellan 23/8 och 31/10 observerades 8 ex (1 Ad + 7 1k). Observationerna var jämnt utspridda mellan de olika stationerna.

Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus*

Sågs tämligen allmänt kring Causeway men även på de tre stationerna fram till 14/10. Som mest observerades 35 ex vid Causeway 22/9.

Killdeer *Charadrius vociferus*

Allmän häckare kring Long Point och den sågs perioden ut.

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca*

Sågs sparsamt under hela perioden, som mest 15 ex Causeway 27/9.

Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*

Sågs allmänt under augusti och första halvan av september, sista obs 30/9. Toppdag blev 7/9 med 175 ex vid Causeway.

Solitary Sandpiper *Tringa solitaria*

Sågs sparsamt mellan 17/8 och 2/9 och ca 15 observationer gjordes. Som mest 4 ex 18/8 Causeway.

Willet *Catoptrophorus semipalmatus*

Vid Turkey Point Marsh rastade 1 ex 7/9.

Spotted Sandpiper *Tringa solitaria*

Sågs sparsamt men dagligen mellan 17/8 och 15/9. Arten tillhörde häckfågelfaunan på Long Point och som mest sågs 12 ex vid Tippen 26/8.

Upland Sandpiper *Bartramia longicauda*

En förbisträckande fågel vid Breakwater den 29/8 blev enda fyndet av denna häftiga vadarart.

Whimbrel *Numenius phaeopus*

Totalt sågs 8 ex mellan 23/8 och 5/9, 2 ex vid Tippen och 6 ex vid Breakwater.

Hudsonian Godwit *Limosa haemastica*

Totalt sågs 8 ex mellan 23/8 och 5/11. 4 ex vid Causeway, 3 str vid Tippen samt 1 ex vid Old Cut.

Marbled Godwit *Limosa fedosa*

Längs Causeway rst 1 1k från 11/9 och någon vecka framåt.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*

Vid Tippen sågs 1 ex den 14/10.

Red Knot *Calidris canutus*

Längs Causeway sågs upptill 15 ex mellan 7/9 och 26/9.

Sanderling *Calidris alba*

Denna vadarart sågs endast vid Tippen och Breakwater från 25/8 till 27/10. Antalen kulminerade i mitten av oktober med ca 65 ex dagligen.

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla*

Sågs allmänt under aug/sept. Samtliga fåglar sågs vid Causeway och där fanns som mest 120 ex 7/9.

Least Sandpiper *Calidris minutilla*

Sågs allmänt under aug/sept. Samtliga fåglar sågs vid Causeway och högsta notering blev 105 ex 7/9. En sen obs av 6 ex gjordes vid Causeway den 31/10.

White-rumped Sandpiper *Calidris fuscicollis*

Noterades vid två tillfällen vid Causeway, 9 ex 7/9 samt 1 ex 22/9.

Baird's Sandpiper *Calidris bairdii*

Mellan 6/9 och 26/9 noterades ca 35 ex längs Causeway.

Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*

Sågs allmänt längs Causeway under aug/sept, enstaka obsar gjordes även vid Breakwater och Tippen fram till 14/10. Högsta notering vid Causeway blev 86 ex 26/9.

Dunlin *Calidris alpina hudsonia*

Första fåglarna dök upp 22/9 och antalen ökade senare under hösten och kulminerade den 31/10 med 380 ex inräknade vid Willow Ave, Old Cut.

Stilt Sandpiper *Micropalama himantopus*

Längs Causeway observerades 12 ex mellan 19/8 och 22/9, som mest 4 ex 10/9.

Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus*

Längs Causeway sågs ett 70 tal ex mellan 17/8 och 11/9, som mest 37 ex 7/9.

Common Snipe *Gallinago gallinago delicata*

Sågs under hela perioden. Antalen var som störst under de två sista höstveckorna och som mest räknades 69 ex in längs Causeway.

American Woodcock *Scolopax minor*

Tre ex stöttes upp under andra halvan av oktober ute på Tippen.

Red Phalarope *Phalaropus fulicarius*

Vid Tippen rastande 1 ex tillfälligt den 20/10.

Parasitic Jaeger *Stercorarius parasiticus*

Totalt observerades 6 str. individer mellan 6/9 och 6/10. 4 ex vid Breakwater samt 2 ex vid Tippen.

Little Gull *Larus minutus*

Observerades sällsynt vid samtliga stationer, ca 25 individer inblandade.

Bonaparte's gull *Larus philadelphia*

Sågs under hela perioden även om antalen varierade starkt från vecka till vecka. Toppnoteringen blev 2780 ex 25/10.

Ring-billed Gull *Larus delawarensis*

Sågs under hela perioden i goda antal, som mest ca. 4000 ex runt Tippen i början av september.

Herring Gull *Larus argentatus smithsonianus*

Sågs allmänt under hela perioden, dock i lägre antal än den ringnäbbade måsen. Toppnotering blev 371 ex runt Tippen.

Lesser Blacked-backed Gull *Larus fuscus graellsii*

Ute på Tippen sågs 1 Ad den 28/9 samt 1 2k den 4/10.

Great Black-backed Gull *Larus marinus*

Sågs sparsamt men nästan dagligen hela perioden, som mest 86 ex rst runt Tippen 28/9.

Caspian Tern *Sterna caspia*

Sågs nästan dagligen fram till 18/10. Upptill 30 ex per dag sågs under aug/sept.

Common Tern *Sterna hirundo*

Sågs ganska allmänt kring Long point mellan 20/8 och 27/10. Högre sträcksiffror noterades 28/8 med 995 ex vid Breakwater, 285 ex 27/9 samt 320 ex 29/9 vid Tippen.

Forster's Tern *Sterna forsteri*

Sågs i snitt varannan dag fram till 22/9, som mest 25 ex längs Causeway i september.

Black Tern *Chlidonias niger*

Vid Breakwater sträckte 1 lk förbi i en fisktärneflock 28/8.

Rock Dove *Columba livia*

Enstaka observationer gjordes under hela perioden.

Mourning Dove *Zenaida macroura*

Sågs under hela perioden men antalen sjönk rejält under okt/nov. I aug/sep observerades upptill 100-150 ex per dag, främst vid Old Cut.

Black-billed Cuckoo *Coccyzus erythrophthalmus*

Totalt ca 10 observationer mellan 27/8 och 1/10, ca 5 ex kring Breakwater, 3 ex vid Tippen samt 2 ex vid Old Cut. 2 ex kunde ringmärkas.

Yellow-billed Cuckoo *Coccyzus americanus*

Totalt 5 observationer uppdelat på två datum, 3 ex vid Breakwater 27/8 samt 2 ex vid Tippen 30/9 där en av fåglarna ringmärktes.

Great Horned Owl *Bubo virginianus*

Vid Breakwater hoade 1 ex under kvällen den 1/9.

Long-eared Owl *Asio otus*

Vid Tippen sågs 1 ex 23/10 och två ex sågs sitta på dagkvist vid Old Cut 7/11.

Northern Saw-whet Owl *Aegolius acadicus*

De första ugglorna dök upp under de första dagarna av oktober och stora antal passerade under senare delen av okt/nov. Enstaka ex kunde med tur hittas sittande på dagkvist men de flesta hamnade i näten. Under bästa natten fångades 89 ugglor!. Totalt ringmärktes ca 700 ex (Old Cut och Tippen sammanslaget). Detta var rekord för Long Point.

Common Nighthawk *Chordeiles minor*

Sågs var och varannan kväll mellan 18/8 och 11/9 vid samtliga stationer. Som mest ett 30 tal vid tippen 23/8.

Chimney Swift *Chaetura pelagica*

Sågs sparsamt mellan 20/8 och 2/10 vid samtliga stationer, men inga dagar med mer än en 10 ex noterades.

Ruby-throated Hummingbird *Archilochus colubris*

Denna Kolibri uppträdde sparsamt/allmänt fram till 25/9. Bl.a. str 216 ex förbi Breakwater under en tredagars period i månadsskiftet aug/sept. Arten hamnade nästan dagligen i näten men den är för liten för att kunna ringmärkas.

Belted Kingfisher *Ceryle alcyon*

Sågs näst intill dagligen men sparsamt vid samtliga stationer fram till 20/10.

Red-headed Woodpecker *Melanerpes erythrocephalus*

Sågs sparsamt vid Breakwater och Tippen mellan 14/9 och 5/10. Knappast mer än 10 ex inblandade.

Red-bellied Woodpecker *Melanerpes carolinus*

1 ex av denna vackra hackspett ringmärktes vid Tippen 11/10.

Yellow-bellied Sapsucker *Sphyrapicus varius*

Dök plötsligt upp vid Breakwater den 17/9 med 5 ex, dagen därpå 9 ex. Sista obsen gjordes vid Tippen 12/10. Totalt borde ett 30 tal individer varit inblandade. Totalt kunde 4 ex ringmärkas.

Downy Woodpecker *Picoides pubescens*

Sågs näst intill dagligen vid Old Cut och Breakwater under hela perioden, något mer sällan vid Tippen. Totalt kunde 10 ex ringmärkas.

Northern "Yellow-shafted" Flicker *Colaptes auratus*

Sågs näst intill dagligen vid Old Cut och Breakwater, lite glesare med obsar ute vid Tippen. Denna stora hackspett sträckte aktivt under framförallt mitten av september med bl.a. 110 str ex vid Breakwater den 18/9. Totalt kunde 9 ex ringmärkas.

Eastern Wood-pewee *Contopus virens*

Sågs mellan 23/8 och 1/10 vid samtliga stationer, ofta dagligen i september. Totalt kunde 11 ex ringmärkas.

Yellow-bellied Flycatcher *Empidonax flaviventris*

Sågs ganska sällsynt mellan 21/8 till 26/9. Hamnade oftare i näten och 16 ex kunde ringmärkas.

"Trails Flycatcher" (*Alder / Willow flycatcher*) *Empidonax alnorum / traillii*

Sågs dagligen under de två första veckorna, sista obs 1/9. P.g.a. svårigheter att bestämma även handhållna tysta fåglar så har de två ovannämnda arterna slagits ihop och kallades populärt för "Trails Flycatcher".

Totalt kunde 18 ex ringmärkas.

Least Flycatcher *Empidonax minimus*

Sågs mellan 18/8 och 4/10 allmän under aug/början av september, därefter ganska sällsynt. Oktoberfyndet var riktigt sent. Som mest 60 ex rst vid Tippen 26/8. Totalt kunde 40 ex ringmärkas.

Eastern Phoebe *Sayornis phoebe*

Sågs mellan 4/9 och 5/11. Vanligast i skiftet sept/oktober och två veckor framåt, som mest 65 ex rst vid Tippen 11/10. Totalt kunde 20 ex ringmärkas.

Great Crested Flycatcher *Myiarchus crinitus*

Observerades sällsynt mellan 20/8 och 15/9 vid samtliga stationer. Totalt kunde 3 ex ringmärkas.

Eastern Kingbird *Tyrannus tyrannus*

Sågs dagligen fram till 14/9. Som mest ett 10 tal ex per dag vid Old Cut och Breakwater. Endast 1 ex kunde ringmärkas.

Horned Lark *Eremophila alpestris*

Det första exemplaret sågs 12/10 och därefter sågs enstaka fåglar perioden ut.

Purple Martin *Progne subis*

Allmän häckare kring Long Point och den sista fågeln sågs 14/9 vid Breakwater.

Tree Swallow *Tachycineta bicolor*

Allmän häckfågel på Long Point och sågs mestadels allmänt fram till 26/10, betydande antal sträckte även förbi under sept./oktober.

Bank Swallow *Riparia riparia*

Allmän sträckare, som mest ca 5000 ex vid Breakwater 28/8. Sista obsen gjordes 17/9.

Cliff Swallow *Hirundo pyrrhonota*

Sågs sällsynt/sparsamt vid samtliga stationer mellan 25/8 och 24/9

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Allmän sträckare, som mest ca 3000 ex vid Breakwater 28/8. Sista obsen gjordes 30/9.

Cave Swallow *Hirundo fulva*

Höstens stora sensation, 10 – 15 ex dök upp vid Old Cut 4/11 och nästföljande dag sågs ca 8 ex. Denna svala, som närmast häckar i Mexiko, var en ny art för Long Point(!) och 2:a fyndet för Ontario. Vid Tippen lyckades vi även ringmärka 1 ex, då fågeln tog nattkvist i ett gammalt trädsvalebo.

Blue Jay *Cyanocitta cristata*

Sågs sparsamt under hela perioden. Sträckrörelser noterades vid Tippen under sept./oktober, som mest 85 ex 30/9. Totalt kunde 4 ex ringmärkas.

American Crow *Corvus brachyrhynchos*

Sågs nästan dagligen under hela perioden.

Tufted Titmouse *Parus bicolor*
Vid Tippen kunde 1 ex ringmärkas 19/10.

Black-capped Chickadee *Parus atricapillus*
Sågs allmänt under hela perioden. Uppvisade invasionstendenser och 38 ex kunde ringmärkas.

Red-breasted Nuthatch *Sitta canadensis*
Sågs allmänt under hela perioden. Uppvisade klara invasionstendenser och 64 ex kunde ringmärkas.

White-breasted Nuthatch *Sitta carolinensis*
Sågs sparsamt mellan 22/8 och 25/10. Uppträdde vid samtliga stationer och 26 ex kunde ringmärkas.

Brown Creeper *Certhia americana*
Sågs ifrån 4/9 och perioden ut, nästan dagligen, som mest ca 50 ex vid Tippen 19/10. Totalt kunde 94 ex ringmärkas.

Carolina Wren *Thryothorus ludovicianus*
Sågs sparsamt mellan 17/8 och 11/9 samt under första novemberveckan. Samtliga sågs kring Old Cut och troligen var inte mer än 5 ex inblandade, varav 2 ex kunde ringmärkas.

House Wren *Troglodytes aedon*
Sågs tämligen allmänt fram till mitten av oktober, som mest ca 15 ex vid Tippen 4/10. Totalt kunde 27 ex ringmärkas.

Winter Wren *Troglodytes troglodytes*
Sågs sällsynt/sparsamt från 14/9 och perioden ut, som mest 8 ex Tippen 2/10. Totalt kunde 13 ex ringmärkas.

Marsh Wren *Cistothorus palustris*
Sågs sällsynt från 20/8 till början av september samt 1 ex 27/10. Totalt kunde 4 ex ringmärkas.

Golden-crowned Kinglet *Regulus satrapa*
Sågs allmänt från 18/9 och perioden ut och 271 ex kunde ringmärkas.

Ruby-crowned Kinglet *Regulus calendula*
Sågs allmänt från 14/9 och perioden ut och 169 ex kunde ringmärkas.

Blue-grey Gnatcatcher *Poliophtila caerulea*
Sågs sällsynt/sparsamt vid samtliga stationer mellan 20/8 och 30/9. Den hamnade emellanåt i näten, men arten är för liten för att ringmärkas.

Eastern Bluebird *Sialia sialis*
Sågs sparsamt från 10/10 och perioden ut. Totalt obsades ca 18 individer och 1 ex kunde ringmärkas vid Tippen den 11/10.

Veery *Catharus fuscescens*
Sågs sparsamt mellan 19/8 till 11/9. Arten sågs främst vid Old Cut och 14 ex kunde ringmärkas.

Grey-cheeked Thrush *Catharus minimus*
Sågs sparsamt mellan 28/8 till 4/10. Totalt ringmärktes 59 ex.

Swainson's Thrush *Catharus ustulatus*
Sågs tämligen allmänt mellan 22/8 till 4/10. Totalt ringmärktes 81 ex.

Hermit Thrush *Catharus guttatus*
Sågs allmänt mellan 30/9 och 30/10, som mest ca 300 ex vid Tippen 11/10. Totalt ringmärktes 103 ex.

Wood Thrush *Hylocichla mustelina*
Endast 3 ex sågs mellan 30/8 och 10/10 varav 2 ex kunde ringmärkas.

American Robin *Turdus migratorius*

Häckade allmänt på Long Point och sågs dagligen. Under oktober passerade stora antal, speciellt över Old Cut. Totalt kunde 11 ex ringmärkas.

Northern Shrike *Lanius excubitor*

Under de sista två veckorna sågs 5-6 ex vid såväl Tippen som Old Cut.

Grey Catbird *Dumetella carolinensis*

Sågs allmänt fram till början av oktober, främst kring Old Cut. Totalt kunde 34 ex ringmärkas.

Northern Mockingbird *Mimus polyglottos*

Höstens två fynd utgjordes av vardera ett ex vid Breakwater 28/8 samt Old Cut 29/10. Fågeln vid Breakwater kunde även ringmärkas.

Brown Thrasher *Toxostoma rufum*

Sågs sällsynt/ sparsamt vid samtliga stationer mellan 10/9 till 2/11. Totalt kunde 4 ex ringmärkas.

American Pipit *Anthus rubescens*

Sågs från 25/9 och perioden ut. Antalen var som störst under första novemberveckan med 50 ex str över Old Cut. Intressant i sammanhanget är att inga observationer gjordes av fåglar på marken utan samtliga var överflygande.

Cedar Waxwing *Bombycilla cedrorum*

Observerades under hela perioden. Antalen var som störst under augusti med bl.a. 300 ex str vid Tippen 23/8. Totalt kunde 5 ex ringmärkas.

European Starling *Sturnus vulgaris*

Sågs allmänt under hela perioden. Antalen var som störst under senhösten med bl.a. ca 40 000 ex str vid Old Cut 6/11. 1 ex kunde ringmärkas.

Solitary Vireo *Vireo solitarius*

Sågs sällsynt/sparsamt vid Breakwater och Tippen mellan 18/9 och 20/10. Totalt kunde 7 ex ringmärkas.

Warbling Vireo *Vireo gilvus*

Sågs sparsamt vid samtliga stationer mellan 18/8 och 22/9. Totalt kunde 7 ex ringmärkas.

Philadelphia Vireo *Vireo philadelphicus*

Sågs sällsynt vid samtliga stationer mellan 22/8 och 7/10. Totalt kunde 7 ex ringmärkas.

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus*

Sågs relativt allmänt vid samtliga stationer mellan 18/8 och 2/10. Totalt kunde 42 ex ringmärkas.

Blue-winged Warbler *Vermivora pinus*

Vid Breakwater sågs 3 ex 30/8 och två av dessa kunde även ringmärkas.

Tennessee Warbler *Vermivora peregrina*

Sågs sparsamt mellan 26/8 och 20/10. Totalt kunde 6 ex ringmärkas.

Orange-crowned Warbler *Vermivora celata*

Endast enstaka ex sågs i fält men totalt kunde 13 ex ringmärkas, varav hela 7 ex 11/10 vid Tippen.

Nashville Warbler *Vermivora ruficapilla*

Sågs sparsamt från 26/8 till 14/10 samt 1 ex 1/11. Totalt kunde 32 ex ringmärkas.

Northern Parula *Parula americana*

Vid Breakwater sågs en vacker hane 4/9.

Yellow Warbler *Dendroica petechia*

Sågs nästan dagligen mellan 17/8 och 28/8, därefter sporadiskt fram till 5/9. Totalt kunde 12 ex ringmärkas varav majoriteten vid Old Cut.

Chestnut-sided Warbler *Dendroica pensylvanica*
Sågs sparsamt mellan 17/8 och 11/10. Totalt kunde 16 ex ringmärkas.

Magnolia Warbler *Dendroica magnolia*
Observerades allmänt framtill slutet av september. En sen obs gjordes 18/10 vid Tippen. Totalt kunde 142 ex ringmärkas.

Cape May Warbler *Dendroica tigrina*
Sågs sparsamt/allmänt mellan 28/8 och 6/10. Som mest ca 20 ex tippen 14/9. Totalt kunde 26 ex ringmärkas.

Black-throated Blue Warbler *Dendroica caerulescens*
Sågs sparsamt/allmänt mellan 19/8 och 6/10. Totalt kunde 58 ex ringmärkas.

Yellow-rumped Warbler *Dendroica coronata*
Observerades mellan 30/8 och 3/11. Stora antal sågs i månadsskiftet sept./oktober och två veckor framåt. Som mest ca 110 ex 30/9 samt ca 400 ex vid Tippen 11/10. Totalt kunde 216 ex ringmärkas.

Black-throated Green Warbler *Dendroica virens*
Sågs sparsamt mellan 23/8 och 12/10, som mest 10 ex per dag månadsskiftet sept./oktober. Totalt kunde 20 ex ringmärkas.

Blackburnian Warbler *Dendroica fusca*
Sågs sällsynt/sparsamt mellan 18/8 och 4/9, som mest 5 ex vid Old Cut 23/8. Totalt kunde 3 ex ringmärkas.

Pine Warbler *Dendroica pinus*
Vid Breakwater sågs 3 ex, 28/8, 31/8 resp. 18/9.

”Western” Palm Warbler *Dendroica palmarum*
Sågs mellan 1/9 till 22/10, speciellt allmän kring månadsskiftet sept./oktober då bl.a. 100 ex noterades vid Tippen 30/9. Totalt kunde 31 ex ringmärkas.

Bay-breasted Warbler *Dendroica castanea*
Observerades sällsynt/sparsamt mellan 29/8 och 5/10. Totalt kunde 3 ex ringmärkas.

Blackpoll Warbler *Dendroica striata*
Sågs tämligen allmänt mellan 29/8 och 11/10, som mest ca 75 ex vid Tippen 14/9. Totalt kunde 99 ex ringmärkas.

Black-and-white Warbler *Mniotilta varia*
Sågs sparsamt mellan 18/8 och 18/9. Totalt kunde 14 ex ringmärkas.

American Redstart *Setophaga ruticilla*
Sågs tämligen allmänt mellan 19/8 och 3/10. Totalt kunde 50 ex ringmärkas.

Ovenbird *Seiurus aurocapillus*
Sågs sällsynt mellan 26/8 och 4/10. Något fler hamnade i näten och 14 ex kunde ringmärkas.

Northern Waterthrush *Seiurus noveboracensis*
Sågs sällsynt mellan 19/8 och 5/10. Totalt kunde 10 ex ringmärkas.

Connecticut Warbler *Oporornis agilis*
Vid Breakwater kunde 1 ex ringmärkas 29/8.

Mourning Warbler *Oporornis philadelphia*
Totalt kunde 6 ex ringmärkas. Inga fältobsar gjordes.

Common Yellowthroat *Geothlypis trichas*
Sågs tämligen allmänt mellan 19/8 och 11/10. Totalt kunde 30 ex ringmärkas.

Hooded Warbler *Wilsonia citrina*

En utfärgad hane sågs 25/9 vid Old Cut och den kunde ringmärkas dagen därpå.

Wilson's Warbler *Wilsonia pusilla*

Sågs sällsynt/sparsamt mellan 20/8 och 22/9. Totalt kunde 24 ex ringmärkas.

Canada Warbler *Wilsonia canadensis*

Sågs sällsynt/sparsamt mellan 17/8 och 8/9. Totalt kunde 11 ex ringmärkas.

Yellow-breasted Chat *Icteria virens*

Under hösten obsades och ringmärktes två ex, 1 ex Tippen 14/9 samt 1 ex Old Cut 24/9.

Scarlet Tanager *Piranga olivacea*

Sågs sällsynt vid samtliga stationer mellan 26/8 till 25/9. Totalt kunde 3 ex ringmärkas.

Northern Cardinal *Cardinalis cardinalis*

Sågs dagligen kring Old Cut under hela hösten, mer sällan vid Breakwater och Tippen. Totalt kunde 2 ex ringmärkas.

Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus*

Sågs vid ett par tillfällen vid såväl Breakwater som Tippen mellan 26/8 och 30/9. Totalt kunde 4 ex ringmärkas.

Indigo Bunting *Passerina cyanea*

Observerades sällsynt mellan 30/8 och 9/10. Totalt kunde 6 ex ringmärkas.

Rufous-sided Towhee *Pipilo erythrophthalmus*

Sågs sparsamt från 28/9 till 31/10, som mest 3 ex 10/10 vid Tippen. Totalt kunde 4 ex ringmärkas.

American Tree Sparrow *Spizella arborea*

Dök upp 18/10 och sågs perioden ut i ökande antal, som mest 55 ex 6/11 vid Old Cut. Totalt kunde 24 ex ringmärkas.

Chipping Sparrow *Spizella passerina*

Sågs ganska allmänt mellan 17/8 och 27/10. Högsta antal blev ca 50 ex vid Tippen 11/10. Totalt kunde 22 ex ringmärkas.

Field Sparrow *Spizella pusilla*

Observerades sparsamt mellan 1/9 och 27/10, som mest 6 ex vid tippen 25/10. Totalt kunde 8 ex ringmärkas.

Vesper Sparrow *Poocetes gramineus*

Arten sågs vid Tippen den 23-24/10 med minst 3 ex, varav 1 ex kunde ringmärkas.

Savannah Sparrow *Passerculus sandwichensis*

Vid Tippen sågs ca 5 ex mellan 8/10 och 19/10 och 1 ex kunde även ringmärkas där.

Fox Sparrow *Passerella iliaca*

Denna stora sparv sågs från 30/9 och perioden ut. Totalt kunde 11 ex ringmärkas.

Song Sparrow *Melospiza melodia*

Sågs relativt allmänt vid samtliga stationer mellan 21/8 och 4/11. Som mest obsades ca 75 ex vid Tippen 11/10 samt ca 35 ex 18/10. Totalt kunde 47 ex ringmärkas.

Lincoln's Sparrow *Melospiza lincolnii*

Sågs sällsynt mellan 29/8 och 11/10. Totalt kunde 6 ex ringmärkas.

Swamp Sparrow *Melospiza georgiana*

Sågs sparsamt mellan 6/9 och 4/11. Totalt kunde 6 ex ringmärkas.

White-throated Sparrow *Zonotrichia albicollis*

Dök upp vid Breakwater 18/9 och sågs sedan perioden ut, ofta i stora antal. Som mest sågs ca 100 ex vid Tippen 11/10. Totalt kunde 90 ex ringmärkas.

White-crowned Sparrow *Zonotrichia leucophrys*

Sågs allmänt mellan 26/9 och 27/10, som mest ca 200 ex vid Tippen 11/10. Totalt kunde 38 ex ringmärkas.

Dark-eyed Junco *Junco hyemalis*

Första fågeln sågs redan 27/8 (troligen från lokal häckning), därefter dröjde det ca två veckor innan sträcket började komma igång. Som mest ca 80 ex 11/10 samt ca 60 ex 19/10 vid Tippen. Totalt kunde 81 ex ringmärkas.

Lapland Longspur *Calcarius lapponicus*

Mellan 11/10 och 6/11 observerades 7 individer vid Tippen och Old Cut.

Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*

Dök upp vid Tippen 14/10 och sågs i småflockar perioden ut, som mest ca 60 ex 27/10.

Bobolink *Dolichonyx oryzivorus*

Observerades mellan 23/8 och 30/9, som mest 29 str ex 3/9 samt 50 str ex 4/9 vid Breakwater. Samtliga utan 1 ex utgjordes endast av översträckare.

Red-winged Blackbird *Agelaius phoeniceus*

Sågs dagligen under hela perioden, ofta i mycket stora antal. Bl.a. 12 000 vid Breakwater 1/9 samt ca 30 000 översträckande vid Old Cut 6/11.

Eastern Meadowlark *Sturnella magna*

Sågs sparsamt mellan 30/9 och 3/11, ofta i småflockar. Som mest sågs 10 ex vid Tippen 26/10.

Rusty Blackbird *Euphagus carolinus*

Sågs sparsamt/allmänt från 18/9 och perioden ut, ofta flockvis. Som mest sågs ca 60 ex vid flera tillfällen vid Tippen under oktober.

Common Grackle *Quiscalus quiscula*

Sågs nästan dagligen under hela perioden, ofta i stora antal. I slutet av oktober/början av november sågs en jättelik flock dra förbi Old Cut varje kväll för att övernatta ute i vassarna. Uppskattningsvis bestod flocken av 75 000 – 125 000 fåglar!

Brown-headed Cowbird *Molothrus ater*

Sågs sparsamt från 28/8 och perioden ut. Vid Tippen kunde 1 ex ringmärkas.

Northern Oriole *Icterus galbula*

Observerades vid samtliga stationer nästan dagligen fram till 2/9, som mest 12 ex vid Old Cut 18/8. Totalt kunde 2 ex ringmärkas.

Purple Finch *Carpodacus purpureus*

Sågs sparsamt men lite oregelbundet från 26/8 och perioden ut. Totalt kunde 5 ex ringmärkas.

House Finch *Carpodacus mexicanus*

Sågs sparsamt under hela perioden, främst vid Old Cut. Totalt kunde 2 ex ringmärkas.

Pine Siskin *Carduelis pinus*

Dök upp vid Tippen 6/10 och sågs sedan perioden ut. Som mest sågs 130 str ex vid Tippen 18/10.

American Goldfinch *Carduelis tristis*

Sågs allmänt under hela perioden, som mest ca 200 str ex vid Tippen 11/10. Totalt kunde 80 ex ringmärkas.

White-winged Crossbill *Loxia curvirostra*

Under första novemberveckan sågs arten under tre dagar, totalt ca 11 individer.

House Sparrow *Passer domesticus*

Sågs allmänt runt Old Cut under hela perioden, mer sällan vid de övriga stationerna. Totalt kunde 14 ex ringmärkas.

Common Redpoll *Carduelis flammea*

Under den första novemberveckan noterades små antal dagligen vid Old Cut.

Evening Grosbeak *Coccothraustes vespertinus*

Vid Old Cut sågs 1 ex 29/10 samt en flock på 5 ex 6/11.

Nedan följer en uppräknig av de däggdjur, kräldjur (inkl. sköldpaddor)samt groddjur som noterades under perioden.

Det skall tilläggas att jag hade förmånen att följa med en sköldpaddsinventerare vid ett par tillfällen och utan hans kunskap om kräldjur, reptiler och förstås sköldpaddor så hade antalet arter som listas här nedanför varit betydligt lägre.

Däggdjur:

Raccoon *Procyon lotor* Allmän

Striped Skunk *Mephitis mephitis* Enstaka kring Old Cut

Mink *Mustela vison* Enstaka kring Old Cut

Eastern Chipmunk *Tamias striatus* Allmän vid Breakwater samt sparsam vid Tippen

Red Fox *Vulpes fulva* Sågs tillfälligt vid Old Cut samt nästan dagligen vid Tippen

Grey Squirrel *Sciurus carolinensis* Sågs sparsamt kring Old Cut

Red Squirrel *Tamiasciurus hudsonicus* Sågs allmänt kring Old Cut

White-tailed Deer *Odocoileus virginianus* Noterades en gång vardera vid Old Cut och Tippen

Eastern Cottontail *Sylvilagus floridanus* Sågs allmänt kring Old cut

Virginia Opossum *Didelphis virginiana* Sågs vid ett tillfälle vid Old Cut

Kräl- och Groddjur:

Fox Snake *Elaphe vulpina* 1 exemplar sågs i närheten av Causeway

Milk Snake *Lampropeltis triangulum* 2 exemplar sågs vid Tippen

Garter Snake *Thamnophis s. sirtalis* Allmän vid Tippen, sparsam vid Breakwater och fåtalig vid Old Cut

Northern Brown Snake *Storeia dekayi* Tämligen allmän vid Breakwater och Tippen

Northern Water Snake *Nerodia sipedon* Sågs vid ett par tillfällen vid Tippen

Eastern Hognose Snake *Heterodon platyrhinos* Ett nyligen ihjältrampat exemplar sågs vid Tippen

American Toad *Bufo americanus* Enstaka sågs vid främst Old Cut

Fowlers Toad *Bufo woodhousei* Sågs allmänt vid Tippen

Bull frog *Rana catesbeiana* Sågs sparsamt vid Old Cut och Tippen

Northern leopard Frog *Rana pipiens* Sågs tämligen allmänt, speciellt vid Breakwater

Grey Tree Frog *Hyla versicolor* Hördes regelbundet vid Breakwater

Sköldpaddor:

Snapping Turtle *Chelydra serpentina* Sågs sparsamt kring samtliga tre stationer samt längs Causeway

Painted Turtle *Chrysemys picta (marginata)* Sågs allmänt

Soft Shelled Turtle *Trionyx s. spiniferus* Enstaka exemplar sågs kring Tippen

Blending's Turtle *Emydoidea blandingi* Enstaka exemplar kring Tippen

Spotted Turtle *Clemmys guttata* Enstaka exemplar kring Tippen

Martin Oomen

Timgatan 10, 415 08 Göteborg

martin_oomen@hotmail.com