

Sydafrika

5 - 27/1 2001

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
OM RESAN	3
Deltagare	3
Flyg	3
Bil, bensin och vägar	3
Logi	3
Mat och dryck	4
Pengar	4
Ekonomi	4
Säkerhet	4
Guider och kontakter	5
Litteratur	5
Resans upplägg	6
VÅR RESRUTT I SYDAFRIKA	8
Borakalolo NP	9
Nylsvlei	9
Krüger NP	9
Wakkerstroom	11
Mkuzi GR	11
Bonamanzi GR	12
S:t Lucia - Cape Vidal	12
Oribi Gorge NR	12
Franklin Marsh	13
Underberg, Sani Pass m.m.	13
Ladysmith	13
Suikerbosrand NR	13
Sandveld NR	14
Kimberley	14
Augrabies Falls NP	14
Pofadder	15
Akkerendam NR	15
Lamberts Bay	15
Velddrif	16
West Coast NP	16
Eierkop	16
Paarl Bird Sanctuary	16
Cape Agulhas/De Mond NR/De Hoop NR	16
Kaphalvön	17
ARTLISTA	18
Fåglar	18
Däggdjur	48
Herptiler	51
Ej observerade arter	51

OM RESAN

Deltagare

Björn Albinson, Alingsås
Emma Albinson, Alingsås
Ola Elleström, Malmö
Sofia Wikström, Stockholm

Reserapporten har skrivits av Ola Elleström. Frågor om resan och synpunkter på rapporten kan ställas till ola.ellestrom@bredband.net.

Flyg

Ola och Sofia flög från Sturup, Björn och Emma från Landvetter. Byte i Amsterdam och därefter Boeing 747 direkt till Johannesburg. Hem från Kapstaden, via en kort mellanlandning i Johannesburg för att plocka upp passagerare (behövde ej lämna planet) och sedan direkt till Amsterdam, och därefter till Sturup/Landvetter.

Vi flög med KLM. Biljetterna kostade 7300 kr + flygskatt (ca 250 kr) per person. Vi bokade dessa i juli 2000 och det var inga problem att få plats då. När vi väl flög var det däremot fullt.

Bil, bensin och vägar

Vi hyrde en Toyota Condor från Europcar. Björn hade viss rabatt via sitt arbete, vilket gjorde att vi fick den för ca 9500 kr inkl fria mil och självriskeliminering från vår ankomst till Johannesburg tills vi lämnade den i Kapstaden. Bilmodellen är bra att skåda från, framför allt då man kör i hög gräsvegetation, då man kommer upp en bit. Det är lite av ett mellanting mellan bil och minibuss, således väldigt rymlig för fyra personer.

Bensinen kostade i genomsnitt ca 3,50 Rand (ca 4,50 kr) med vissa skillnader beroende på var i landet man befann sig. Bensinstationer är det gott om och man behöver inte tanka själv, då det finns speciella anställda för detta.

De stora vägarna är bra och bortsett från N1, norrut från Johannesburg och N2, kustvägen i Natal, med inte alltför mycket trafik. Några av de mindre asfaltvägarna i öknen, t.ex. vägen västerut från Kimberley, var rena njutningen att åka på. Raksträckor på flera mil och nästan inte en bil i sikte. En del grusvägar i Bushmanland var dock inte lika trevliga. Ingen trafik, men däremot väldigt ojämna ("tvättbräda") med punktering utanför Brandvlei som följd. I Krügerparken är de större vägarna asfalterade.

Logi

Vi hade bokat 14 av 22 nätter på förhand, via hemsidor på internet eller e-mail till privatpersoner. I övrigt tog vi något lämpligt ställe längs vägen, huvudsakligen Bed & Breakfast (be om att få ta med frukost om ni åker tidigt, annars kan man ev. få lite avdrag på kostnaden om man skippar frukost helt), men även andra boendeformer (se nedan). Vi valde att inte campa någonting (dels av säkerhetsskäl och dels för att slippa släpa med extra utrustning). Standarden var generellt god och det var genomgående även väldigt billigt.

Här följer en lista på våra övernattningsplatser. Tyvärr har jag inte antecknat namn och priser på alla ställen på plats, varför jag har fått försöka rekonstruera i efterhand. En del uppgifter kanske därför inte stämmer till 100%.
(1R=ca 1,30 SEK, 1 USD=ca 10 SEK)

- 5-6/1 Lalapanzi Guesthouse, väster om Warmbad. B&B, ca 100R per person. Ej bokat.
- 6-8/1 Punda Maria Camp, Krüger NP. Stuga, ca 150R per person/natt. Bokat i förväg.
- 8-9/1 Olifants Camp, Krüger NP. Stuga, ca 150R per person. Bokat i förväg.
- 9-10/1 Skukuza Camp, Krüger NP. Stuga, ca 175R per person. Bokat i förväg.
- 10-11/1 Beautiful Just B&B (hos John McAllister), Wakkerstroom. 125R per person. Bokat i förväg.
- 11-13/1 Mantuma camp, Mkuzi. Stuga, ca 130R per person/natt. Bokat i förväg.
- 13-14/1 Lalapanzi B&B, S:t Lucia. Lyxig B&B, 165R per person. Obokat.
- 14-15/1 Oribi Gorge Hotel, Oribi Gorge. Hotell, ca 150R per person. Obokat.
- 15-17/1 Underberg, "stuga" i Rob Guy's trädgård. 8USD per person/natt. Bokat i förväg.
- 17-18/1 Wyford Guesthouse. Stuga, ca 100R per person. Rob Guy fixade bokning åt oss dagen innan.
- 18-19/1 Sandveld Nature Reserve. Stuga vid entrén, 45R per person. Obokat.

19-20/1 Langberg Guest Farm, 2 mil söder Kimberley. B&B, 95R per person. Bokad i förväg.
20-21/1 Pofadder Guesthouse. Lägenhet, ca 100R per person. Obokat.
21-22/1 Hantamhuis Guesthouse, Calvinia. Lägenhet, ca 150R per person. Obokat.
22-23/1 Riviera Hotel, Velddrif. Hotell, ca 130R per person. Obokat.
23-27/1 Kirstenhof, Kapstaden. "Stuga" i Jim Enticott och Caz Thomas's trädgård. 100R per person/natt. Bokad i förväg.

Mat och dryck

För den som gillar kött är Sydafrika att rekommendera. Man får ofta stora bitar till låga priser och nötköttet är av högsta kvalitet. Därtill serveras det struts och antilop på många ställen. Fisk är de sämre på, åtminstone i inlandet. Ofta har de bara en sort, Hake, som dessutom inte är så kul. Om det även finns Kingklip, är denna att föredra. Vid kusten är det däremot avsevärt bättre, t.ex. var vi på en trevlig fisk- och skaldjursrestaurang i S:t Lucia (minns ej namnet). Vegetarisk mat finns en del, men det är inte särskilt prioriterat. På många ställen kan man dock få goda sallader.

Generellt sett var restaurangstandarden hög. Några ställen som höjde sig över mängden var följande:

- Weaver's Nest, Wakkerstroom. Superb trerätters för 85R inkl. dryck. Lyxigt ställe med en cool engelsk ägare i halmhatt.
- Langberg Guest Farm. Extremt smarrig trerätters (Eland till huvudrätt) för 65R + dryck.
- Cattle Baron, Kirstenhof, Kapstaden. Innehållsrik meny. Rena, nästan kubformade, köttbitar på 400g (fanns även mindre varianter på 230g) serverade till valfri potatis. Garlic Rump rekommenderas.
- Hos Rob Guy åt vi middag hemma hos Rob och hans fru Bella, vilket var både gott och trevligt. Fördrink på verandan var en höjdare.
- Wyford, norr om Ladysmith. Rob Guy ringde och bokade detta åt oss dagen innan, eftersom han kände ägarinnan. Vi fick därför kungligt mottagande med en superb trerätters middag i en privat matsal i ägarinnans bostad. Kommer inte ihåg priset, men vill minnas att det var extremt prisvärt.

Vad gäller dryck finns ett normalt utbud av öl, inkluderande några inhemska sorter (vi drack huvudsakligen Castle, som är ett medelgott, lättdruckat öl) och ett gott utbud av vin. Det sydafrikanska vinet är ofta mycket gott. Priserna på restaurangerna är dessutom låga. Vi köpte en flaska av en god sort till maten på Langberg. Den kostade då 65R. Samma sort hittade vi i en vinbutik för 49R.

Pengar

Den sydafrikanska valutan heter Rand. 1 Rand motsvarade under vår resa ca 1,25-1,30 SEK. Visakort funkar på de allra flesta ställen. Dessutom finns det uttagsautomater i alla större samhällen (kostar en smärre avgift). Vi växlade inga pengar i Sverige (bortsett från en smärre summa Rand, för säkerhets skull), utan tog ut det allra mesta direkt ur uttagsautomater i Sydafrika.

Ekonomi

Vår totala reskostnad, inkluderat flyg, bil, bensin, logi, mat, guider, fickpengar och souvenirer slutade på ca 18500 kr/person.

Säkerhet

Det pratades mycket om kriminaliteten i Sydafrika. Vi märkte inget alls av detta och kände inte obehag någon enda gång. Det är möjligt att detta berodde på att vi från början var medvetna om problemet och verkligen gick in för att undvika problem. Vi besökte t.ex. inte storstäderna Johannesburg, Pretoria eller Durban. I Kapstaden bodde vi i en trygg förort, med bilen parkerad innanför grindar. Vi gick sällan var för sig i tätbebyggda områden och vi lämnade inte kvar några värdesaker öppet i bilen. Vi hade dessutom med en filt som vi täckte över packningen i bagageluckan med, när vi gick iväg på promenader. Det bästa är nog helt enkelt att vara medveten om och respektera problemet och bete sig därefter.

Guider och kontakter

Vi hade två guider under resan som vi hade tagit kontakt med redan på förhand. I Wakkerstroom skådade vi med John McAllister och tillsammans med honom såg vi Rudd's Lark, Botha's Lark, Blue Korhaan, Buff-streaked Chat och Yellow-breasted Pipit under en morgon och en förmiddag. John tog 100R/timme inkl. transport och frukost i fält, men trots att vi var ute i 7 timmar nöjde han sig med 500R, d.v.s. 125R per person. John har också bra koll på resten av landet och ger mer än gärna tips på arter och bra lokaler.

I Sani Pass och Underberg skådade vi med Rob Guy i en och en halv dag. Robs priser är 220 USD för en heldag i Lesotho och Sani Pass och 110 USD för en halvdag. Totalt således 330 USD inkl. transport. För att komma upp i Sani Pass är det nog nödvändigt med fyrhjulsdriven bil, och Rob's kunskaper om området är tämligen svärlagna, så det var definitivt värt priset.

Inför den tilltänkta havsfågelturen hade jag mailat en skådare i Kapstaden, Callan Cohen, och han fixade detta åt oss. Men det är egentligen en dam vid namn Anne Gray som har hand om detta och det var med henne vi hade de dagliga kontakterna när vi väl kom ner (jag har dessvärre inte hennes e-mailadress). Callan gav oss däremot flera andra bra tips på fågellokalerna i Kapprovinsen och hade dessutom vänligheten att kommentera vårt upplägg på resan. Jim Enticott, som vi bodde hos, är en internationellt erkänd havsfågelexpert och gav oss också en del tips angående skådning i Kap.

Daniel Bengtsson, Södertälje, gav oss en hel del användbara tips innan avfärd, bl.a. flera rykande aktuella uppgifter, då han lett en resa dit i november 2000. Stort tack för detta!

E-mailadresser (aktuella januari 2001):

John McAllister: mcallister@vlr.dorea.co.za

Rob Guy: rguysani@hotmail.com

Caz Thomas och Jim Enticott: cthomas@iafrica.com

Callan Cohen: callan@birding-africa.com

Litteratur

Det finns en uppsjö av böcker och andra publikationer som behandlar fåglar, större däggdjur och lokaler i Sydafrika. Egentligen behöver man dock endast fyra titlar, om man inte avser bestämma herptiler, smådäggdjur och växter, nämligen dessa:

- Essential Birding - Western South Africa av Callan Cohen och Claire Spottiswoode (lokalguide till västra Sydafrika med detaljerade vägbeskrivningar). Kan beställas via <http://www.birding-africa.com/>
- The Illustrated Guide to Birds Of Southern Africa av Ian Sinclair och Phil Hockey, illustrerad av Peter Hayman och Norman Arlott (SASOL).
- Southern African Bird Sounds (6 CD-skivor) av Guy Gibbon.
- The Larger Mammals Of Africa av Chris och Tilde Stuart.

För planering på ett tidigt stadium kan man även använda Top Birding Spots In Southern Africa av Hugh Chittenden, men denna ger sällan några detaljerade lokalbeskrivningar utan mer tips på vilka lokaler som verkar bra. Southern African Birds - A Photographic Guide av Ian Sinclair och Ian Davidson är en vacker bok, som jag köpte i Kirstenbosch, men inget man behöver för att bestämma fåglarna (om man redan har Sinclair & Hockey).

Självklart finns det även ett antal användbara reserapporter. Bra samlingar med en hel del rapporter från Sydafrika finns på bl.a. <http://www.crosswinds.net/~birdtrips/TripReports.html> (många rapporter, men uppdateras tyvärr inte längre) och www.skof.se.

Andra användbara websidor:

För nyheter om rariteter, havsfågelturer m.m.: <http://www.zestforbirds.co.za/>

För information om fåglar i Kapregionen, havsfågelturer m.m.: <http://www.birding-africa.com/>

För lokalbeskrivningar till ett stort antal fågellokalerna: <http://www.sabirding.co.za/>

För bokning av logi i bl.a. Krüger och Mkuzi: <http://www.ecoafrika.com/saparks/idxknpidx.htm>

Två reserapporter som ej finns på nätet, som vi hade stor nytta av:


- Sydafrika 4-25/11 2000. Bongoresor, av Daniel Bengtsson.
- South Africa & Namibia. A Birding Trip, Nov 4 - Dec 12 1996. Av Erling Jirle.

Resans upplägg

- 4/1 Ola och Sofia flög från Sturup och Björn och Emma från Landvetter. Vi möttes på Schiphol, Amsterdam, varifrån flyget tog oss direkt till Johannesburg.
- 5/1 Ankomst Johannesburg på morgonen. Björns väska saknades, vilket försenade oss. Hämtade ut vår hyrbil, en Toyota Condor, och körde mot Borakalolo. Skådade i Borakalolo på eftermiddagen. Övernattade utanför Warmbad.
- 6/1 Hannade mitt i en cykeltävling, vilket försenade oss en del. Skådade i Nylsvlei från förmiddag till tidig eftermiddag. Körde norrut på N1 och anlände till Punda Maria i Krüger strax innan de stängde grindarna på kvällen (1830).
- 7/1 Pafuri på morgonen. Björns väska hade anlänt till campen när vi kom tillbaka på eftermiddagen. Skådade på Punda Maria camp på eftermiddagen. Åkte på en organiserad "night-drive" längs Mahonie Loop under tre timmar på kvällen (ungefär hälften i rent mörker).
- 8/1 Tidig morgonpromenad på campen. Körde runt Mahonie Loop och därefter vidare mot Shingwedzi, där vi åt lunch. Skådade oss söderut till Olifants camp, dit vi anlände strax innan mörkret.
- 9/1 Tidig morgonskådning på Olifants. Safari genom de mer öppna delarna av Krüger under hela dagen, med stopp på Satara för skådning och på Lower Sabie för lunch. Anlände till Skukuza strax innan skymningen.
- 10/1 Morgonskådning vid bron öster om Skukuza och därefter inne på campen. Körde sedan söderut och lämnade Krüger ca kl 11 via Crocodile Bridge. Åkte sedan västerut genom jordbrukslandskap och sedan söderut genom gräsländet i östra Transvaal. Hittade en trevlig våtmark vid Kwa-Zanele. Anlände till Wakkerstroom på kvällen och hann precis lite kvällsskådning vid våtmarken norr om samhället.
- 11/1 Skådade med John McAllister runt Wakkerstroom från 0500-1200. Efter lunch körning via Piet Retief till Mkuzi Game Reserve, dit vi anlände omkring kl 1700.
- 12/1 Skådade i Mkuzi hela dagen. Åkte på en organiserad "night-drive" på kvällen.
- 13/1 Skådade i Mkuzi under morgon och förmiddag. Med havererad a/c på bilen körde vi först till Bonamanzi, där vi gick runt under några heta eftermiddagstimmar. Anlände ganska tidigt till S:t Lucia, där vi tog in på ett lyxigt guesthouse. Ågnade sena eftermiddagen åt bad (Ola och Sofia i Indiska Oceanen, Björn och Emma i poolen). Fick ny bil av hyrfirman på kvällen.
- 14/1 Tidig uppstigning och körning till Cape Vidal, 3,5 mil norrut. Skådade där i några timmar innan vi drog oss tillbaka mot S:t Lucia. Skådade vid flodmynningen och den närbelägna skogen innan vi fixade lite praktiska saker inne i S:t Lucia. Lång körning söderut, med ett längre stopp vid Mtunzini. Passerade söderut förbi Durban och tog in på spöklika (p.g.a. strömavbrott) Oribi Gorge Hotel.
- 15/1 Skådade från tidig morgon till 1300 i härliga ravinen Oribi Gorge. Drog oss sedan mot Underberg, men hann med ett stopp vid Franklin Marsh. Anlände till Underberg under sen eftermiddag och checkade in hos Rob Guy, varefter det blev middag med Rob och hans fru Bella.
- 16/1 Hela dagen tillsammans med Rob. Tidig uppstigning för en extra exkursion åt sydväst för Wattled Crane. Efter frukost åkte vi upp i Sani Pass och in i Lesotho för en fantastisk heldagsexkursion. På vägen ner hann vi med lite våtmarksskådning kring Underberg.
- 17/1 Återigen exkursion med Rob. Först besökte vi en våtmark, The Swamp, strax utanför Underberg. Fortsatte till Xumeni Forest och avslutade vid ett spektakulärt ställe kallat Hella Hella, där vi bl.a. såg Blue Swallow. Lämnade Rob och Underberg mitt på dagen och körde till Ladysmith, där vi skådade till skymningen. Övernattade på ett underbart ställe vid namn Wyford, som Rob hade fixat åt oss.
- 18/1 Började med en nätt 25-milakörning till Suikerbosrand, där vi sedan körde runt ett par timmar, innan det åter var dags att ge sig av. Denna gång åt sydväst, till Sandveld Nature Reserve utanför Bloemhof. Anlände strax innan skymningen och fick en billig, men ändå mycket fräsch, stuga precis vid parkens entré.
- 19/1 Skådade i Sandveld under förmiddagen. Körde sedan till Kimberley där vi skådade under eftermiddagen. Betade av Kamfers Dam, Big Hole, Beaconsfield Park och Marrick Game Farm innan vi tog in på Langberg Guest Farm, två mil söder om Kimberley. Hann med en promenad där innan skymningen.
- 20/1 Morgonskådning vid Langberg med bl.a. Short-toed Rock Thrush. Sedan 53 mils körning med endast kortare stopp då vi såg något intressant. Nästan ingen trafik på vägarna så vi anlände till Augrabies Falls NP strax efter lunch, i tryckande hetta. Efter några timmars skådning körde vi mot Pofadder. Nu kom vi ut i ren öken vilket medförde många stopp för att vi såg intressanta fåglar. Övernattade i den märkliga lilla byn Pofadder.
- 21/1 Mycket tidig uppstigning för att köra ut till Aggenys Red Dunes, sydväst om Pofadder för Red Lark. Körde sedan genom öken hela dagen längs ruten Aggenys Red Dunes - Pofadder - Brandvlei - Calvinia. Fick punktering strax innan Brandvlei och valde bort några områden öster om Brandvlei, som skulle vara bra för Sclater´s Lark, på grund av detta. Övernattade i Calvinia.
- 22/1 Morgon och tidig förmiddag i Akkerendam, alldeles norr om Calvinia. Körde sedan västerut och gjorde ett stopp vid Kransvlei Poort för Protea Canary. Kom sedan äntligen till havet igen, då vi anlände till sulekolonin på Bird Island i Lamberts Bay, där vi stannade några timmar. Körde sedan återigen söderut och kom strax innan skymningen till Velddrif, där vi övernattade.

- 23/1 Morgonskådning vid Velddrif innan vi åkte till West Coast NP, där vi huvudsakligen kollade vadare från Geelbek Hide. Drog oss sedan österut in i Karoo, där vi besökte Eierkop, framför allt för Karoo Eremomela. Körde en slingrig serpentinväg åt sydväst och åt lunch i Karoopoort. Eftermiddagsskådning i det fågelrika Paarl Bird Sanctuary innan vi kom ner till Kapstaden. Bodde sedan fyra nätter hos Jim Enticott och Caz Thomas i Kirstenhof, en av de sydliga förorterna.
- 24/1 Kraftig vind tillintetgjorde möjligheterna till havsfågeltur. Vi åkte i stället österut och började vid Sir Lowry's Pass. Fortsatte till Cape Agulhas där Björn och Ola skådade havsfågel en stund medan damerna fotograferade varandra på Afrikas sydligaste spets. Besökte först Struusbaai Plaat och sedan De Mond för att se Damara Tern. Anlände sent till De Hoop och hann bara skåda en halvtimme runt campen innan vi var tvungna att åka tillbaka till Kapstaden.
- 25/1 Fortsatt blåsigt och ingen havsfågeltur. Ägnade dagen åt Kaphalvön och i tur och ordning Die Hel, Kirstenbosch Botanical Garden, Kommetjie, Godahoppsudden och pingvinkolonin vid Boulders Beach, Simonstown.
- 26/1 Jodå, fortfarande för blåsigt för havsfågeltur så vi ägnade dagen åt havsfågelskådning från land. Först vid Godahoppsudden och sedan från tågstationen (!) i Glencairn på Kaphalvöns östsida. Hade också tid mitt på dagen till inköp av souvenirer m.m. i Simonstown.
- 27/1 Lugnare på havet, men tydligen ändå för mycket för havsfågeltur. Hade ändå en hyfsad havsfågelmorgon och förmiddag vid Kommetjie. Flög hemåt mot Sverige på eftermiddagen.
- 28/1 Via flygplansbyte i Amsterdam anlände vi till Sturup resp. Landvetter på morgonen.

VÅR RESRUTT I SYDAFRIKA



Lokaler

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. Borakalolo NP | 9. Franklin Marsh | 17. Akkerendam NR |
| 2. Nylsvlei | 10. Underberg/Sani Pass | 18. Lamberts Bay |
| 3. Krüger NP | 11. Ladysmith | 19. Velddrif/West Coast NP |
| 4. Wakkerstroom | 12. Suikerbosrand NR | 20. Eierkop |
| 5. Mkuzi GR | 13. Sandveld NR | 21. Paarl Bird Sanctuary |
| 6. Bonamanzi GR | 14. Kimberley | 22. Cape Agulhas/De Mond NR/De Hoop NR |
| 7. S:t Lucia/Cape Vidal | 15. Augrabies Falls NP | 23. Kaphalvön |
| 8. Oribi Gorge NR | 16. Pofadder | |

NP - National Park, NR - Nature Reserve, GR - Game Reserve

Grannländer

NAM - Namibia, BOT - Botswana, ZIM - Zimbabwe, MOZ - Mozambique, SWA - Swaziland, LES - Lesotho

Storstäderna är markerade med svarta fyrkanter. Rutten börjar i Johannesburg och alldeles norr därom ligger Pretoria. Vid kusten öster om Lesotho ligger Durban. Rutten avslutas vid Kapstaden längst i sydväst. De två markerade städerna på sydkusten heter Port Elisabeth (väster) och East London (öster).

Borakalolo NP

Ett trevligt reservat i "bushveld", ca 10 mil nordväst om Pretoria. Rikt på vilt, varför man anmodas att hålla sig i bilen utom vid vissa markerade ställen (där man förvisso lika gärna kan bli angripen av farliga djur). Vi såg bl.a. White Rhinoceros, Giraffe och resans enda Tsessebe. Med tur kan man se Sable, Leopard och Caracal. Fågelfaunan innehåller många arter som är svåra på andra håll i Sydafrika, åtminstone längs den rutt vi körde. Vi var bara här en eftermiddag, vilket dessutom var den första dagen på resan. Då är man ju ivrig att se allt det vanliga också, så vår fokusering på specialiteterna var tyvärr inte den bästa. Bushveld Pipit, Meyer's Parrot, Shaft-tailed Whydah och Pied Babbler ska inte vara direkt svåra, men vi såg ingen av dem. Dessutom lär det vara en av Sydafrikas allra bästa lokaler för Finfoot.

Vi började med att köra den västligaste loopen, Tholo Loop, vilket gav Burnt-necked Eremomela, Black Widowfinch och Great Sparrow, arter som vi ej såg senare under resan. Crimson-breasted Shrike och Marico Flycatcher såg vi också här. Sista timmen lades vid Moretele Camp, där vi förgäves letade efter Finfoot. Det såg bra ut längs en lång sträcka, så vi hann inte spana så noga som vi önskat. African Black Duck var lite plåster på såren.

Nylsvlei

Norr om Pretoria ligger det som under rätt årstid en av Sydafrikas bästa våtmarkslokaler. Rätt årstid är februari-maj, när det är blötare, sålunda var vi lite för tidigt ute. Det består mest av vidsträckta våtmarker med bara mindre öppna vattenytor. Skådningen bedrivs framför allt från tre gömslen på bekvämt gångavstånd från parkeringen. Arter som man ska kunna se, främst under våtperioden, är Dwarf Bittern, Lesser Moorhen och Lesser Gallinule. Vi fick nöja oss med bl.a. Black-winged Pratincole, Fulvous Whistling-duck, Ethiopian Snipe och den lokala subariteteten European Marsh Harrier. Vi hade African Barred Warbler i buskmarken på väg ut till våtmarken västerifrån, vid den sista grinden på vänster sida innan man kommer ut i det öppna våtmarksområdet. Den var mycket lätt att spela fram med bandspelare.

Krüger NP

En gigantisk nationalpark, 35 mil lång och 7 mil bred, placerat i nordosthörnet av Sydafrika. Biotopen varierar, och det skulle ta tid att gå in på detaljer, men huvudsakligen är det något mer igenväxt än man tänker sig klassisk östafrikansk savann. Speciellt norra halvan är i stort sett bushveld eller woodland, huvudsakligen bevuxen med trädarterna mopane. Mopaneskog ser yttligt sett ut lite som fjällbjörkskog. De centrala delarna är mer savannlika och det är därmed lättare att se större mängder av storvilt. I den sydligaste delen är det åter mer igenvuxet. Längs några av floderna finns en del fin skog. Här och där har det byggts dammar som drar till sig mycket vattenfåglar.

Vi var i Krüger 3,5 dagar och 4 nätter, vilket får anses som ett minimum för att göra parken rättvisa om man vill täcka in större delen av parkens naturtyper. Till skillnad från de flesta andra lokaler vi besökte hade vi inte så mycket information om var man skulle skåda utan det blev mycket improvisation. Detta gjorde att vi missade en del specialiteter, men å andra sidan är det nog svårt att göra en fullständig "clean-up" av ett så stort område med så mycket arter som det finns i Krüger, speciellt som man ej kan (eller åtminstone får) lämna bilen och vandra ut i terrängen.

Parken kan angöras och lämnas via 8 olika grindar. Vi åkte in vid Punda Maria (2:a från norr) och lämnade via Crocodile Bridge längst i sydost. Infrastrukturen är utmärkt, med ett antal helt perfekta asfaltvägar (hastighetsbegränsning 50 km/h) och ett oräkneligt antal mindre grusvägar.

Vi bodde de första två nätterna i Punda Maria, den nordligaste campen. Därefter en natt i Olifants och sista natten i parkens största camp, Skukuza. Just camperna är lämpliga att besöka för att se småfåglar, eftersom det är tillåtet och ofarligt att gå omkring där. Vi såg dock en hel del även från bilen.

Pafuri, längst i nordost, ligger vid Luvuvhu River och här finns en fin "Riverine Forest" med flera arter som är mycket svåra på andra håll i landet. Meves' Long-tailed Starling, Tropical Boubou och Wattle-eyed Flycatcher såg vi ingen annanstans under resan och i floden såg vi White-crowned Plover. Det bästa sättet att se åtminstone staren och Bouboun är att stanna vid Picnic-spoten och gå en runda i skogen alldeles väster om. Om man väl lär sig Boubouns läte kommer man nog ändå att höra den på fler ställen i Pafuri-området. Vill man se en imponerande flod kan man köra ner till Crooks Corner och titta över Limpopofloden in i Mozambique, ur fågelsynvinkel ger detta dock troligen inte så mycket extra. Vår retligaste dipp i Pafuri var Böhms Spinetail, som ska kunna ses längs med Luvuvhu. Vi såg inte heller Arnot's Chat, som finns i området mellan Pafuri och Punda Maria. Sträckan däremellan gav däremot Grey-headed Kingfisher, Cuckoo Hawk och inte minst 7 Lions i en flock några mil söder om Pafuri.

KRÜGER NATIONAL PARK

Camper som nämns i rapporten.


1. Punda Maria
2. Shingwedzi
3. Letaba
4. Olifants
5. Satara
6. Lower Sabie
7. Skukuza
8. Crocodile Bridge

Övriga lokaler

- A. Pafuri
- B. Mahonie Loop
- C. Engelhard Dam
- D. Orpen Dam
- E. Sunset Dam

X - Entrance/Exit gate

Den heldragna linjen markerar vår rutt. Övriga vägar i Krüger är ej med på kartan.



Punda Maria är en trevlig camp, både att bo på och att skåda på. Man kan gå en liten naturstig runt campen; "Paradise Flycatcher Nature Trail". Bearded Robin, African White-throated Robin, Jameson's Firefinch och resans enda Icterine Warbler var några av de arter vi såg. Vid ett tillfälle hade vi Dickinson's Kestrel som passerade över campen. Vid Punda Maria utgår också en ca 25 km lång slinga, Mahonie Loop, som vi dels åkte i och efter skymningen, på en organiserad night-drive, men även själv en morgon. Natt-turen var trevlig, med flera Bronze-winged Coursers som orädda stod på vägen. Turen var på ca tre timmar varav hälften i dags-/skymningsljus. Vid passage av en liten bäck flög det upp en Dwarf Bittern. Här såg vi också den enda större hjorden av African Buffalo. Nattskärror var det gott om, vi lyckades bestämma Freckled Nightjar och Mozambique Nightjar, men möjligen kan det ha varit någon art till. Pennant-winged Nightjar lär förekomma sällsynt, men vi såg den inte. Giant Eagle-Owl finns också, men vår enda uggla blev en Southern White-faced Owl. Dagsturen blev inte mycket sämre, bl.a. hade vi resans enda papegojor. Två arter till och med, då både Brown-necked (Cape) och Brown-headed Parrot sågs. Vi åkte rundan på morgonen, vilket var ett bra val, då vi ideligen fick stanna för nya fåglar. I ett bird-party hade vi Yellow-bellied Eremomela och Grey Penduline Tit, i övrigt såg vi Southern Black Tit, Red-headed Weaver, Brubru, Black Cuckoo-shrike m.fl. bra arter. Längs loopen lär också vara bra för Stierling's Barred Warbler, som vi dock inte lyckades hitta trots flera försök att locka fram den med bandspelare.

När man kör bil i Krüger ser man mycket fåglar och mycket däggdjur. Bland fåglarna är European Roller och Lilac-breasted Roller, Red-backed Shrike, Fork-tailed Drongo och flera arter Hornbills karaktärsfåglar. Magpie Shrike är en annan trevlig sak man ser gott om, speciellt i norra och mellersta delen av parken, liksom diverse biätare, inte minst

Southern Carmine Bee-eater. I luften ser man allt som oftast Bateleur och White-backed Vulture. Stannar man bilen och vevar ner rutan lär man inte kunna undgå sången från Rattling Cisticola och Sabota Lark.

Kring Shingwedzi går vägen vid flera tillfällen längs eller över floden med samma namn. I floden var det vid vårt besök gott om sandbankar, vilket drog till sig mycket fåglar, bl.a. 7 Saddle-billed Storks och större antal av Marabou och Woolly-necked Stork. Lunch på Shingwedzi camp är att rekommendera, då man har perfekt span över floden och många småfåglar gärna kommer fram till matborden för att snylta. Perfekt för fotografer och filmare.

Engelhard Dam, nordost om Letaba, var tillsammans med Sunset utanför Lower Sabie, den bästa dammen vi besökte i Krüger. Resans enda två natthägrar sågs flyga in hit. Vilken tur då att det var två olika, en White-backed och en Black-crowned Night Heron! Bra hägerlokal även i övrigt, t.ex. sågs Goliath Heron.

Letaba camp besöktes som hastigast för African Mourning Dove, vilken bara finns här och på Satara. De är mycket lätta att få syn på. Söder om Letaba hittade vi två stora träd med gamar som landat för övernattning. Förutom alla White-backed Vultures sågs även Cape, Lappet-faced och White-headed Vulture. Parkens femte gamart, Hooded Vulture, såg vi på några ställen längre söderut i parken.

Vi bodde alltså en natt på Olifants, som ligger på en höjd med fantastisk utsikt över floden som heter just Olifants. Saddle-billed Stork häckar nedanför. Den stora attraktionen på Olifants är annars Bat Hawk, som vi såg jaga omkring i skymningen och en stund framåt (belyst med gatlampor), bara några hundra meter från restaurangen.

Mellan Olifants och Satara och ner mot Lower Sabie var det mest öppna området vi passerade i Krüger, vilket medförde att vi såg större mängder av däggdjur som Blue Wildebeest (uttalas Will-de-beest, alltså inte Wajld-beest), Burchell's Zebra (d.v.s. den vanliga zebran), Impala, Giraffe och en del African Elephant. På Satara camp tittade vi på häckande Red-billed Buffalo Weaver och vi såg African Scops Owl på dagkvist. Burchell's Starling var vanlig. Vid Lower Sabie ligger den fina dammen Sunset, som är bra för storkar som Woolly-necked Stork, Marabou och Yellow-billed Stork. Open-billed Stork ska tydligen ses där ganska ofta, men vi såg tyvärr ingen sådan. Även här hade vi häckande Red-billed Buffalo Weaver.

Vägen mellan Lower Sabie och Skukuza var bra för däggdjur, bl.a. flera Greater Kudu samt ett Lion och en stor flock (21 ex) av African Elephant. Öster om Skukuza korsas Lower Sabie River av några broar. Från någon av dessa ska man kunna se Finfoot. Vid vårt besök var nog vattenståndet lite för högt, så vi missade tyvärr den här också. Vi försökte även en gång till den följande morgonen, men även då utan resultat. Vi hade däremot 3 Southern Ground Hornbills söder om bron närmast Skukuza. På Skukuza camp, som snarast kan betecknas som ett mindre samhälle, skådade vi lite sista morgonen i Krüger. Red-faced Cisticola sjöng från vassen nedanför restaurangen och Green-capped Eremomela sågs i ett bird-party.

I den sydligaste delen av Krüger är det åter mer tätvuxet, man ser således färre däggdjur, men däremot en hel del fåglar. Vi hade t.ex. ytterligare 4 Southern Ground Hornbills, Red-crested Korhaan, White-crowned Shrike, resans enda Garden Warbler och en skruv med 25 Steppe Eagles längs sträckan från Skukuza till Crocodile Bridge.

Wakkerstroom

Beläget på 1700 meters höjd i gräslandet i östra Transvaal, utgör Wakkerstroom centrum för ett område som hyser flera exklusiva endemiska fågelarter. Vi skådade själv längs vägen från Ermelo ner till Amersfoort och vidare ner till Wakkerstroom. Dagen efter skådade vi med den lokale skådaren John McAllister en halv dag. John är en mycket trevlig man och dessutom en duktig skådare som kan området utan och innan. Utan honom hade vi inte haft en chans att se alla endemerna inom den begränsade tid vi hade att tillgå. Första dagen lyckades vi i alla fall med att utan hjälp se två flockar med Southern Bald Ibis och 4 Eastern Long-billed Larks norr om Amersfoort. Strax norr om Wakkerstroom såg vi Blue Korhaan och Pale-crowned Cisticola, liksom övriga arter i släktet är den mycket lätt att spela fram med bandspelare. Man bör också stanna till vid våtmarken i norra kanten av Wakkerstroom, där det häckar bl.a. Hottentot Teal, Grey Crowned Crane och Red-chested Flufftail. Sistnämnda art hörde vi två stycken av i skymningen.

Dag 2 tog John oss först till ett område söder om samhället där vi efter en stund hittade Yellow-breasted Pipit. Även Buff-streaked Chat och Sentinel Rock Thrush sågs i samma område. Nordväst om Wakkerstroom lyckades vi med att se Botha's Lark utan större problem, och efter en hård arbetsinsats, som t.o.m. John blev imponerad av, även världens sällsyntaste och mest hotade lärka, Rudd's Lark. Southern Bald Ibis var vanlig, och bilskådning i området gav Secretary Bird (som vi missade i Krüger) och flera Blue Korhaans.

Mkuzi GR

En av Sydafrikas mest kända fågellokaler, belägen i norra delen av Kwazulu-Natal, inte långt från Swaziland. Vi var knappt två dygn i Mkuzi, vilket var ganska lagom. Reservatet påminner en del om Krüger, både i natur och fauna,

men det är lite lättare att se däggdjur och framför allt finns det bland fåglarna en hel del ovanliga arter, som är svåra på andra håll.

Vid parkeringen intill Kubube Hide såg vi Neergaard´s Sunbird båda dagarna, den kom direkt då man spelade upp dess sång. Även Purple-banded Sunbird sågs i detta området och Rudd´s Apalis var vanlig. Andra arter här var Gorgeous Bush-shrike och Yellow-spotted Nicator. Andra dagen såg vi Pink-throated Twinspot där också, en art som vi även såg vid swimmingpoolen på campen. Kumasinga Hide var inte lika givande som Kubube. Nsumo Pan är däremot väl värt ett besök. Bäst span har man från stranden nedanför picnic-spoten. Det finns även två fågeltorn, men därifrån är det längre avstånd och sämre vinkel till området, där flest hägrar och storkar rastar. Vi såg bl.a. Open-billed Stork båda dagarna samt resans enda Squacco Herons. Vid parkeringen fanns såväl Natal som Heuglin´s Robin. Thick-billed Weaver häckade troligen vid det norra fågeltornet. I övrigt körde vi runt och bilskadade vilket gav White Rhinoceros och en lång fågellista, bl.a. Greater Scimitarbill, Mouse-coloured (Pale) Flycatcher, African och Jacobin Cuckoo m.m. I lufrummet svävade bl.a. Bateleurs, Tawny Eagles, Brown Snake-eagles och White-backed Vultures.

Vi åkte på en night-drive andra kvällen. Inte så mycket djur förutom Impala och Nyala, men två stycken av den häftiga lilla katten Large-spotted Genet samt Spotted Eagle-Owl, Fiery-necked Nightjar och två olika ormar gjorde det mödan värt. Leopard finns också i parken, och guiden sa att de brukade jaga antiloper på campen om natten. Vi var dock lite för trötta för "lepo"-vaka.

Bonamanzi GR

Ett privatägt viltreservat nära Mkuzi, som vi tänkte besöka kort för att se Lemon-breasted Canary, en på andra håll mycket svår art. Vi var inte informerade om att man var tvungen att övernatta för att få besöka området, men vi lyckades komma in ändå, möjligen tack vare att vi kom just den timmen som receptionen hade stängt och vi hade därför ingen möjlighet att anmäla oss.

Väl inne i reservatet tog vi oss till Lalapanzi camp, där kanarien ska finnas. Efter en stunds eftersök hittade vi ett par i palmerna vid swimmingpoolen. Arten är helt knuten till lalalpalmer. Vi såg även Golden-rumped Tinker-barbet och Scarlet-chested Sunbird. Den sistnämnda häckade i ett av träden utanför den lyxiga obsbyggnaden/baren vid sjön nedanför campen. Det är inte varje dag man besöker fågel-"torn" med bar, soffa, lyxiga fåtöljer att spana från, litteratur etc. Har man tid, kan man mycket väl lägga en övernattnings i Bonamanzi, då det verkar vara en bra fågelokal även bortsett från kanarien. Green Coucal ska t.ex. inte vara alltför svår.

S:t Lucia - Cape Vidal

S:t Lucia är en semesterort vid kusten i norra Natal. Längs kusten norrut sträcker sig en grusväg in i den stora Greater S:t Lucia Wetland Park. Vägen slutar fyra mil norr om S:t Lucia, vid en campingplats vid namn Cape Vidal. Vid Cape Vidal finns en fin och djungelliknande "Dune Forest" som hyser flera arter, vars utbredning i Sydafrika är mycket begränsad. Redan på campingplatsen är det inga problem att notera Livingstone´s Lourie, Woodward´s Batis och Brown Robin. Det är dock mycket folk och inte den trevligaste skådmiljön, även om Samango Monkey är ett charmigt inslag. Då kan man i stället gå en bit på den 7 km långa naturstigen genom skogen. Lourien och Batisen verkar vara ännu lättare där (däremot såg vi Brown Robin endast vid campingplatsen). Vi såg också bl.a. Scaly-throated Honeyguide. Längs vägen ut till Cape Vidal hade vi också en flock med Crested Guineafowl som gick på vägen. Det är en art som de flesta ser i Mkuzi, men vi lyckades faktiskt missa den där. Längs vägen ligger också flera våtmarker. Vid en våtmark med mycket näckrosor på västsidan av vägen, uppskattningsvis halvvägs, hade vi flera African Pygmy Geese och White-backed Ducks samt resans enda Black-backed Cisticola.

Vid S:t Lucia tog vi oss ut till nordsidan av flodmynningen och spanade av sandrevlar, där det var gott om tärnor, bl.a. Little Terns, Caspian Terns och resans enda Lesser Crested Terns. Skogen här ute är också fin, med en artsammansättning liknande den i Cape Vidal.

När man kör in i S:t Lucia västerifrån passerar man genom ett större vassområde alldeles innan stan. På södra sidan av vägen finns en blandkoloni med Yellow Weaver och Southern Brown-throated Weaver. Några km söder om avtaget från N2:an mot S:t Lucia (d.v.s. längs N2) ligger en liten damm som ska vara bra för Pygmy Goose och Lesser Jacana. Vid vårt besök var det dock helt översvämmat så det var kört.

Oribi Gorge NR

En underbart vacker, skogsklädd ravin ca 10 mil söder om Durban. Gott om bra arter, bl.a. är Knysna Lourie vanlig. Bäst utdelning får man sannolikt genom att gå längs vägen som går rakt genom ravinen. Crowned Eagle häckar nära den övre rastplatsen och vid samma rastplats sjöng charmtrollet Starred Robin sin jazzinfluerade sång. Chorister Robin, Cape Batis, Grey Sunbird, Cinnamon Dove, Forest Buzzard och Pygmy Kingfisher var annat kul i skogen. Vi gick även en stig längs floden längst ner i ravinen, vilket bl.a. gav Mountain Wagtail. Här ska man också kunna se Knysna Woodpecker och African Broadbill, men dessa båda arter blev två av de retligaste missarna på hela resan.

Franklin Marsh

Ligger som namnet antyder vid Franklin och bra beläget för ett stopp under transport från Oribi Gorge till Underberg. Ta av från stora vägen in mot Franklin, kör över järnvägen och stanna där det är vass på båda sidor. African Rail är vanlig och reagerar omedelbart på bandspelare. Grey Crowned Crane finns också, liksom den svåra och sällsynta White-winged Flufftail, som vi dock inte hörde vid vårt korta besök en blåsigt eftermiddag. Gryning är bästa tid enligt Rob Guy.

Underberg, Sani Pass m.m.

Vi bodde hos Rob Guy i Underberg två nätter och exkurerade med honom i hans fyrhjulsdrivna jeep i en och en halv dag. Rob är en mycket trevlig, äldre gentleman och dessutom en skarp skådare som kan hela området som sin egen ficka. Extra trevligt med att bo hos honom i stället för på hotell etc. var middagarna på kvällarna tillsammans med Rob och hans fru Bella, med fördrink på verandan och snack om allt möjligt. Inte bara fåglar faktiskt, då Rob har koll på det mesta som rör den här delen av Sydafrika och för all del även Lesotho.

Robs trädgård i utkanten av Underberg är ett kapitel för sig. En stor, lummig trädgård som är en klart giftig fågellokal, bl.a. häckar Buff-spotted Flufftail. Den hade dock tystnat för säsongen och att se den är nästan omöjligt. Vi försökte spela fram den på natten, men utan resultat. I trädgården fick vi däremot se trevliga arter som Red-throated Wryneck och tre arter solfåglar; Greater Double-collared, Black och Malachite Sunbird, som Rob har gjort en speciell foderautomat till.

Första dagens exkursion började med en liten extrarunda sydväst om Underberg för att vi skulle få se Wattled Crane. Arten, som är hotad i Sydafrika, häckar i området men de brukar flytta i december när ungarna blivit flygga. Rob hade dock kontakt med en lantbrukare, vars par hade stannat kvar längre så därför fick även vi se dessa vackra djur. På väg dit såg vi även Stanley's Bustard.

Sedan åkte vi upp i Sani Pass, Sydafrikas högsta pass på 2870m. Längs grusvägen avlöste de nya arterna varandra; Bush Blackcap, Barratt's Warbler, Gurney's Sugarbird, Ground Woodpecker, Redwing Francolin, Orange-breasted Rockjumper, Drakensberg Prinia, Drakensberg Siskin och Cape Rock-thrush. Därefter över gränsen till Lesotho och en öl på Afrikas högst belägna pub, Sani Top Chalet. I Lesotho fler trevliga arter såsom Greywing Francolin, Lammergeier, Mountain Pipit, African Rock Pipit, Cape Vulture, Layard's Titbabbler, Fairy Flycatcher, Southern Grey Tit och Horus Swift. Landskapet här uppe (som högst var vi på 3240m) är helt fantastiskt vackert och fåglarna kändes nästan bara som en bonus. Bergen är gräsklädda nästan ända upp på topparna och det är oförglömligt med böndernas stenhyddor som ligger här och var längs vägen.

Tillbaka i Underberg besöktes en liten å med häckande Half-collared Kingfisher och intill denna hade vi African Yellow Warbler. En yngre Black Harrier vid en närliggande våtmark var en överraskning och en fin avrundning på en helt fantastisk och oförglömlig dag.

Nästa dag tog Rob med oss på en halvdagsexkursion till några lokaler öster om Underberg. Vi började vid en våtmark, kallad "The Swamp" där vi efter en bra stund lyckades se Broad-tailed Warbler. Orange-breasted Waxbill var desto lättare. Därefter åkte vi till Xumeni Forest för en timmes högkvalitativ skogsskådning. Forest Canary, Yellow-throated Warbler, Narina Trogon, Olive Bush-shrike och inte minst den häftiga Orange Ground-thrush var några av höjdpunkterna. Vi avslutade med ett besök vid Hella Hella, där vi ganska omgående fann vår målart och en av hela resans allra mest önskade arter, Blue Swallow.

Ladysmith

En relativt stor stad, vars omgivning är bra för två svåra arter, Melodious Lark och White-bellied Korhaan. Lärkan lyckades vi efter hårt arbete hitta strax väster om stan, medan våra försök på trappen tyvärr blev fruktlösa, mycket beroende på att vi var sent ute och skymningen kom innan vi hunnit genomsöka de allra mest intressanta områdena. För att komma till lokalen där vi såg lärkan, utgå från korsningen mellan N11 och R103 alldeles väster om stan. Där finns ett "truck-stop" och vid denna utgår en mindre väg åt väster. Efter en liten bit när den ett krön och strax efter krönet hade vi två ex på vänster sida. Den ska dock finnas spridd längs denna väg, både innan och efter vår obsplats. Det är nog lättare tidigare på säsongen, då de sjunger flitigt. Vi hade även Cloud Cisticola här. Trappen finns enligt uppgift dels i samma område som lärkan, men bäst är att testa i lämplig biotop på avtagsvägar från N11, nordost om Ladysmith.

Suikerbosrand NR

Detta är ett ganska stort viltreservat några mil söder om Johannesburg. Huvuddelen är gräsmark, på sina håll bruten av klippformationer. I vissa delar är det mer dragning åt savann. Lokalen är inte viktig för någon av de svårare endemerna, och besöks därför förhållande sällan av skådare från Europa. Efter att ha läst lite om lokalen tyckte vi dock att den verkade vara bra för en del halvsvåra arter som man lätt kan missa, inte minst flera arter Cisticola.

Mycket riktigt hade vi resans enda Tinkling Cisticola här och flera andra arter, bl.a. Cloud Cisticola. Man kör en enkelriktad slinga på sex mil runt i reservatet. På grund av närvaron av många vilda djur, bl.a. finns det enstaka Cheetah i området, får man inte gå ur bilen utom vid en särskild "picnic-spot", belägen halvvägs längs rundan. Bland däggdjuren gladdes vi bland annat åt Black Wildebeest och Eland. Vid "Picnic-spoten" hade vi den översnygga Mocking Chat och den första kontakten med en del Kalahariarter. Inga sensationer, men vi lade inte så väldigt mycket tid (endast 4 timmar i reservatet, varav ca 1,5 timme på "picnic-spoten").

Sandveld NR

Ett viltreservat med ett relativt biotopbeskrivande namn, beläget nära den lilla staden Bloemhof längs stora vägen mellan Johannesburg och Kimberley. Som antyts är det ett ganska sandigt ställe, uppblandad med buskar av olika storlekar och i vissa delar större bestånd av acaciaträd. Vid infarten finns stugor av mycket god standard som man kan hyra till en billig penning. Runt entrén finns också större bestånd av träd som lämpar sig bra för småfågelskådning.

Lokalen är bra för både vilt och fåglar. Här finns dels Kalaharispecialiter och även en del trevliga återseenden från de allra första dagarna på resan. Bland de förstnämnda kan nämnas Northern Black Korhaan, Desert Cisticola, Scaly-feathered Finch, Pirit Batis och Fawn-coloured Lark. Vi hade också resans enda obs av Orange River Francolin. Bland de arter vi såg i början på resan fanns t.ex. Groundscraper Thrush, Crimsonbreasted Shrike och Marico Flycatcher. Bland viltet är det framför allt antiloper, och vi hade resans enda observationer av Oryx och Sable, båda i relativt stora flockar. Dessutom såg vi en flock med tio White Rhinoceros som var på sprängmarsch över ett större sandfält, en imponerande syn.

Kimberley

Kimberley är inte en fågelokal utan en stad, mest känd för sina diamantförekomster och därför kallad för "diamantstaden". I och kring staden ligger däremot ett antal spännande fågellokaler som vi betade av under en eftermiddag samt under två timmar nästföljande morgon.

Kamfers Dam är en mycket stor anlagd damm, belägen strax öster om staden, norr om stora vägen när man kommer från Johannesburg/Bloemhof. Lokalens största attraktion är jättelika ansamlingar av såväl större som mindre flamingo. Vi skattade ca 6000 ex (varav 5000 mindre) men ibland kan det vara betydligt mer. I övrigt såg vi inga sensationer, även om Cape Teal och en del nordliga vadare var nya på reslistan. Längs sydsidan av dammen, ca 1 km från sydvästhörnet, går en liten väg ner till dammkanten, varifrån man har bra överblick.

Inne i Kimberley besökte vi den gamla diamantgruvan Big Hole, som dels är ett spektakel i sig, men även en mycket bra seglarlokal. Bradfield's Swift är målarten och vi behövde inte mycket mer än lyfta kikaren för att se ett antal individer. Även Alpine, White-rumped och Little Swift fanns på lokalen.

Vi gjorde sedan ett kort stopp i Beaconsfield Park. Det var här Dr Richard Liversidge upptäckte Long-tailed Pipit *Anthus longicaudatus* som en ny art för vetenskapen i mitten på 90-talet. Den övervintrar (d.v.s. svenska sommarmånaderna) dock endast här så det var ju ganska kört på förhand. Dock har Richard ännu en ny art på gång, "Kimberley Pipit". Den är väldigt lik Long-billed Pipit. Även denna har setts i parken, men vi hade inga piplärkor alls, och inget annat speciellt intressant heller. Det var nog fel säsong, helt enkelt.

Runt Kimberley ligger ett stort antal Game Farms, som kan vara intressanta att besöka eftersom man befinner sig i Kalaharis randområde och därigenom har god chans på öken- och halvökenarter. De flesta Game Farms är dock privata, utan tillträde för allmänheten. Vi hade dock tips om en, Marrick Game Farm, 15 km väster om Kimberley, där man kunde få köra in om man pratade med ägaren först. Vi gjorde detta, och åkte en tur med piplärkor som högsta prioritet. En Buffy Pipit var det enda vi lyckades åstadkomma i den vägen. I övrigt hittade vi en uttorkad damm, där det sprang en del lärkor och flera Double-banded Coursers på den uttorkade botten. Ett flertal Capped Wheatears uppehöll sig också här, resans första.

Sist på Kimberleyprogrammet stod Langberg Guest Farm, två mil söder om Kimberley längs vägen mot Kapstaden. Vi hade fått tips om att det var en bra lokal för den annars svåra Short-toed Rock Thrush. Vi kombinerade stentrastletande med övernattnings och supé på den trevliga 1800-talsgården. Superbt boende och mat till löjligt lågt pris. Rekommenderas verkligen! På morgonen gick vi en runda och hittade den eftersökta arten. Vi följde då en stig markerad med hjälmar (!). Efter en bit kom man till ett område med några större kullar, och efter att ha passerat den första stora kullen på höger sida såg vi en hane. På gårdsplanen såg vi Red-headed Finch, som av allt att döma häckade där.

Augrabies Falls NP

Uppkallad efter ett massivt (56 m) vattenfall i Orange River ligger denna nationalpark bara några mil från gränsen till Namibia. Det är ett mycket kargt område med en årsnederbörd på i genomsnitt 190 mm. Fallet i sig är imponerande

och bör givetvis avnjutas. Vi besökte lokalen på eftermiddagen och det var då över 35 grader i skuggan och vindstilla. Inte de bästa förutsättningarna för lyckad fågelskådning men det gick ganska bra ändå.

Målarten för de flesta besök här är Namaqua Warbler. Det bästa sättet att få se och höra denna är att alldeles innan campingplatsen, ta vänster. Fortsätt på denna väg som passerar över ett stort antal bäckar. Det är i vegetationen kring dessa bäckar som arten trivs. Om ni inte ser eller hör någon spontant, försök med bandspelare. Vi fick napp vid fjärde eller femte bäcken med en individ som svarade på bandspelare och då också kom fram och visade upp sig fint. P.g.a. den stekande hettan nöjde vi oss med detta ex. Senare noterades dock ännu ett ex, invid dammen som ligger i kanten av campingplatsen.

Resterande tid på lokalen lades i campingområdet där det trots hettan var tämligen fågelrikt. Bl.a. Pale-winged Starling, Karoo Robin, White-throated Canary var nya arter för resan och Dusky Sunbird var vanlig. Intill campingen (vid motsatt sida från floden) finns ett lite lummigare parti med en liten damm. Förutom Namaqua Warbler såg vi bl.a. Ashy Tit och Pririt Batis där. Längre in i parken lär det häcka Verreaux's (Black) Eagle, vilket vi prioriterade bort på denna lokal.

Pofadder

Pofadder är ett litet samhälle mitt ute i det ökenområde som kallas Bushmanland. Byn är inte stor och består av ca tre långsgående och fem tvärgående gator. Här finns dock ett hotell, ett guesthouse, några små restauranger och några affärer, så den är ett självklart centrum för skådare som besöker området för att se ökenspecialiteter. Pofadder var också udda (och positivt) i det att svarta och vita människor verkade umgås med varandra.

Vi lade timmarna innan skymningen 20/1 och hela 21/1 på skådning i öknen. Detta är lite knappt, eftersom det intressanta området är mycket stort och antalet intressanta arter likaså. Dessutom är det väldigt lite aktivitet när det börjar bli riktigt varmt fram på dagen.

De flesta arter som förekommer i öknen är nomadiska och dras till ställen där det finns vatten. Ibland finns det nästan inget, och då är de vattentankar, som markägarna ställt ut, intressanta ur ornitologisk synvinkel.

En art som dock inte verkar påfallande nomadisk är den endemiska Red Lark. Den har en känd lokal vid Aggenys Red Dunes, ca 6 mil sydväst om Pofadder. Vi var på plats här i gryningen och hade inga problem med arten. Efter detta körde vi grusvägen tillbaka in mot Pofadder och därefter på småvägar ner till Brandvlei. 15 mil på grusvägar av "tvättbräde"-karaktär tar både på bildäck och passagerare och med bara några kilometer kvar till Brandvlei fick vi punktering. Då vi märkte att ytterligare ett däck hade ganska lite luft, valde vi att inte fortsätta in på småvägar öster om Brandvlei, där vi fått uppgifter om att Sclater's Lark hade setts nyligen. I stället tog vi asfaltvägen rakt söderut till Calvinia.

Vi såg alla specialiteter i öknen utom Sclater's Lark och Burchell's Courser. Då det anses vara bättre i öknen tidigare på säsongen (okt-nov) och vi lade begränsat med tid så är vårt resultat helt acceptabelt. Burchell's Courser är allmänt känd som en besvärlig art som man bör ha mycket tur med. Slutligen bör naturligtvis poängteras att det i sig är en fantastisk upplevelse att köra omkring i de oändliga markerna.

Akkerendam NR

Alldeles norr om Calvinia ligger detta reservat, vars mest framträdande drag är några imponerande raviner. Det är huvudsakligen ett torrt område med ställvis tät buskmark, som håller en del intressanta fågelarter. Detta var vår första kontakt med typiska Karoo-arter såsom Grey-backed Cisticola och Karoo Prinia. Den mest eftersökta arten här är dock Cinnamonbreasted Warbler och efter en lång vandring upp i den vänstra/västra ravinen (av två, som man har rakt i norr när man kommer in i reservatet), så spelade vi fram ett ex med hjälp av bandspelare. Detta får anses som tur, då många före oss fått lämnat lokalen utan framgång. Efter denna succé skådade vi ytterligare någon timme i reservatet, och såg bl.a. Verreaux's (Black) Eagle, Fairy Flycatcher, Layard's Titbabbler, Black-headed Canary, Cape Penduline Tit och våra första Cape Francolin.

Lamberts Bay

Efter att ha åkt genom öken och halvöken är det en härlig, befriande känsla att komma ner till Västkusten, med havsdoft och nya fågelarter. Lamberts Bay's stora attraktion är en anseelig koloni av Cape Gannet som häckar utanför hamnen, på det som kallas Bird Island. Det är dock inte mycket till ö, eftersom man kan gå ut dit via hamnpiren. Upp till 14000 sulor häckar på lokalen, och dessa kan avnjutas från ett gömsle alldeles intill kolonin.

Övrig skådning på lokalen är trevlig om man kommer norrifrån och inte har skådat på Västkusten tidigare, men tämligen ordinär om man tidigare varit på Kaphalvön. Vi såg inget direkt anmärkningsvärt bortsett från ett större antal av Cape Fur Seal, men andra reserapporter nämner bl.a. enstaka African Penguin, Bank Cormorant och African

Black Oystercatcher. På vägen ner till Lamberts Bay från motorvägen (N7) observerade vi däremot Southern Black Korhaan.

Innan vi åkte ner till Lamberts Bay besökte vi en lokal strax söder om Clanwilliam, benämnd Kransvlei Poort. Det är en liten ravin, där vi bl.a. såg ett par av Verreaux's (Black) Eagle. Lokalen är annars mest känd för att vara en av de säkraste för Protea Canary. Från N7, ca 10 km söder om Clanwilliam, kör av N7 västerut på en grusväg, mot "Paleisheuvel". Följ grusvägen drygt 2 km så kommer man in i en mindre ravin, och då är man framme. Vi behövde i princip bara gå ur bilen för att se ett antal ex av målarten.

Velddrif

Från Lamberts Bay kan man antingen välja en ca 7 mil lång grusväg längs kusten, vars beskaffenhet jag inte känner till, eller så kan man köra ut till N7 igen och då blir sträckan till Velddrif ca 19 mil i stället. P.g.a. att en del grusvägar i Sydafrika är rent förfärliga och vi hade lite luft i ett däck (och redan förbrukat vårt reservdäck) valde vi motorvägsalternativet för att komma till Velddrif, som alltså också är en lokal nära kusten. Däremot skådar man inte vid själva havet utan de ställen som vi kollade var några revlar i en flod ("Berg River"), några saliner samt några ängar innanför kusten.

Artmässigt är den största attraktionen nog Chestnut-banded Plover, som man ser vid Cerebos Salt Works, beläget alldeles väster om bron som korsar floden, söder om Velddrif samhälle.

Individmässigt är det annars mer imponerande att spana av "Riviera mudflat" som ligger öster om bron på norra sidan. Vid vårt besök var det en del White Pelican och Greater Flamingo samt större antal av vadare här.

På strandängarna nära flodmynningen ska man kunna se Cape Long-billed Lark, men vi hade ingen exakt lokal och testade bara några fålt på måfå, vilket gav negativt resultat. Fina obsar på Spotted Dikkop (Thick-knee) blev det i alla fall.

West Coast NP

En ganska stor nationalpark söder om Langebaan, några mil söder om Velddrif. Den består av den stora Langebaan Lagoon och omgivande buskmarker. Småfågelskådning i parken lär kunna vara givande. Vi lade dock vår tid på att skåda vadare från det fina gömslet vid Geelbek, beläget längst in (söder) i lagunen. Mycket vadare sprang omkring på njutbart avstånd, med Curlew Sandpiper som dominerande art. Inga sensationer, men ytterligare några Chestnut-banded Plovers och en Terek Sandpiper var trevligt. Det är också en bra lokal för Black Harrier. Det är också en av favoritlokaler för många av skådarna i Kapstaden, då den är mycket bra för rariteter. Strax innan vårt besök hade det t.ex. setts White-rumped Sandpiper *Calidris fuscicollis* (vitgumpsnäppa).

Eierkop

Eierkop är en lokal för dem som inte själv orkar eller har tid att leta fram en lokal för den tämligen svåra endemen Karoo Eremomela. Det innebär en del extra körning, men man får se lite mer av den speciella biotop som dominerar i The Great Karoo. För att hitta till Eierkop, kör man från Ceres österut på väg R46, viker av åt NNO på R355 mot Katbakkies och Calvinia. 14 km efter avtaget (där R355 är åt vänster och R356 åt höger) ligger två stora kullar av bergarten tillit utmed vägen, en på vardera sida. En oansenlig grusväg leder upp till en parkering invid den högra (=östra) kullen. Det blåste en hel del när vi var här och det var mitt på dagen, men ändå hade vi inga som helst problem att omgående se ett antal av eremomelan, alldeles vid parkeringsplatsen.

Paarl Bird Sanctuary

Detta fågelreservat består av några dammar och ligger fint i linje om man kör från Eierkop till Kapstaden. Flera gömslen finns vid dammarna, men man kan också skåda från bilen eftersom man kör runt alldeles vid dammkanterna. Vi såg gott om änder, en del vadare samt inte minst flera stora flockar med vitvingade tjärnor. Bland änderna kan nämnas Maccoa Duck och White-backed Duck.

Cape Agulhas/De Mond NR/De Hoop NR

Cape Agulhas är Afrikas sydligaste spets, belägen ca 15 mil öster om Kapstaden. Vi gjorde ett kort besök, mest för att ha varit där, men hann också med att spana lite havsfåglar. Längs kusten österut letade vi sedan efter Damara Tern som häckar i området. Vi körde först ner till Struusbaai Plaas, som det är skyltat till när man kör ner mot Cape Agulhas. Härifrån och österut ska man kunna se tjärnorna (små pålar finns längs stranden för att skydda tjärnorna under häckningstid), men det är tungt att gå i sanden och man kan få gå långt för att hitta några tjärnor. Vi gav därför upp och körde i stället ner till flodmynningen vid De Mond, som rekommenderats i någon reserapport. På långt håll fick vi syn på en stor ansamling av tjärnor ute i flodmynningen och efter en lång promenad och noggrann genomgång av den stora ansamlingen, kunde vi konstatera att vi sett två ex av Damara Tern.

Vi fick lägga ganska mycket tid på tärnan och hann endast med en kort visit vid naturreservatet De Hoop, ytterligare några mil österut. Pearl-breasted Swallow och Southern Tchagra hann vi dock med att leta fram vid campen. Från bilen såg vi även en del vilt, bl.a. Bontebok och Mountain Zebra. Enligt uppgift ska det inte vara helt omöjligt att se Knysna Woodpecker i en skogsravind, men vi hade inte tid att leta eftersom de stängde reservatsgrinden klockan 18.

Småvägarna i området kring Agulhas och De Hoop är bra områden för bilskådning och gav för vår del bl.a. Agulhas Long-billed Lark (mellan De Mond och De Hoop), Southern Black Korhaan samt ett antal Stanley's Bustard och Blue Crane.

När man kör österut från Kapstaden till Agulhas-området passerar man Sir Lowry's Pass, ca 5 mil öster om staden. Detta ligger på hög höjd med fantastisk utsikt över False Bay och Kapstaden. Lokalen är den som utländska skådare oftast besöker för att se Cape Rockjumper. Vid vårt besök blåste hård vind, så vi fick jobba hårt. Men efter lite klättring och hårt slit fick vi fina obsar till slut. Andra intressanta arter här är bl.a. Victorin's Warbler, Ground Woodpecker, Orange-breasted Sunbird och Cape Sugarbird.

Kaphalvön

Vi ägnade de sista 2,5 dagarna åt den ca 5 mil långa halvön som sträcker sig från själva Kapstaden i norr, ner till Godahoppsudden och Cape Point i söder. En dag besökte vi ett flertal lokaler för några bofasta arter, medan resten av tiden ägnades åt havsfågelskådning.

Vi började vid naturreservatet Die Hel, beläget i det långsträckta grönområdet Constantia Greenbelts, alldeles nedanför Taffelbergets (Table Mountain) sydöstra sluttning. Här var det framför allt Knysna Warbler och Cape Siskin som lockade. Sångaren sjöng inte, och den är känd som en riktig skulkare, varför läget inte var det bästa. Vi spelade upp dess sång och lyckades uppfatta ett svagt läte (varningsläte?) från ett buskage. Efter en lång stunds väntan kunde vi konstatera att lätet kom från just Knysna Warbler, och vi fick fina obsar på två ex som, mer eller mindre, kröp omkring på marken under buskaget. Vi såg även Cape Siskin, som inte är skulmig men däremot väldigt rörlig. Vi såg den dock två gånger till på Kaphalvön, i Kirstenbosch och vid Cape Point, men vid samtliga tillfällen var obstiderna korta. Chaffinch är ett udda och något bisarrt inslag på lokalen.

Nästa lokal var den enastående botaniska trädgården Kirstenbosch. I avdelningen för Proteor får man fina obsar av Cape Sugarbird och Orange-breasted Sunbird ser man lite varstans i trädgården. Vi tog det ganska lugnt på lokalen och gick mest runt och njöt några timmar. Annars kan man gå några stigar uppåt Taffelbergets sluttning och ha chans på t.ex. Forest Canary och Cinnamon Dove. I anslutning till entrén finns en välsorterad souvenirshop med bl.a. en hel del böcker om djur och växter.

I Kommetjie, på halvöns västkust, besökte vi ett litet rev som är bra för skarvar. Här såg vi resans enda Bank Cormorants och de första African Black Oystercatcher.

Efter en turist- och havsfågelvisit vid sydligaste spetsen, Cape Point, avslutade vi första dagen på Kaphalvön med att besöka pinvinkolonin vid Boulders Beach, Simonstown. Häcklokalen ligger i södra utkanten av Simonstown och de första pingvinerna väntade på oss redan vid parkeringen. De flesta håller till lite längre norrut och nås via en stig längs stranden.

Resten av Kapvistelsen ägnade vi åt havsfågelskådning. Vi hade alltså hoppats på att komma ut på en havsfågeltur med båt, men p.g.a. för hård vind under hela Kapvistelsen blev denna tyvärr inställd. Detta är något som händer ganska många skådare som reser till Sydafrika, eftersom den hårda vinden ofta varar i ett antal dagar eller t.o.m. en vecka, när det väl kommit i gång.

I stället spanade vi från land. En heldag när det blåste riktigt mycket (sydostlig kuling) började vi vid Godahoppsudden, först på själva udden och när solen började störa för mycket flyttade vi över till östsidan. På eftermiddagen stod vi i lä av tågstationen i Glencairn, alldeles norr om Simonstown. Vi såg en del havsfåglar men ändå förvånansvärt lite med tanke på den hårda vinden.

Sista dagen (hemresedagen) hade vi förmiddagen ledig och åkte till Kommetjie på västsidan. Vi tog lä av fyren (privat egendom, fråga den trevliga fyrvaktaren om lov!) och konstaterade att det var mycket havsfåglar i farten, bl.a. stora mängder Sooty Shearwaters och bland udda arter märktes Sabine's Gull och Subantarctic Skua. Märkligt nog var det mycket mer havsfåglar än dagen innan, trots att vinden hade avtagit markant.

ARTLISTA

Fåglar

Systematiskt har jag följt The Illustrated Guide to Birds Of Southern Africa av Ian Sinclair och Phil Hockey, som avseende en del vadare och tättingar skiljer sig från Europeiska fälthandböcker.

OSTRICH *Struthio camelus* (struts)

5 ex Borakalolo 5/1, 2 ex söder Pietersburg 6/1, 1 ex mellan Punda Maria och Pafuri 7/1, 2 ex mellan Satara och Lower Sabie 9/1, 1 ex söder Skukuza 10/1, 10 ex Sandveld 19/1, 2 ex öster Lamberts Bay 22/1, 10 ex West Coast NP 23/1, 10 ex De Hoop 24/1, 3 ex Godahoppsudden 26/1.

AFRICAN (JACKASS) PENGUIN *Spheniscus demersus* (afrikansk pingvin)

Minst 500 ex Boulders Beach, Simonstown 26/1. Världspopulationen har minskat med 98% under 1900-talet och står idag på ca 160000 individer. De flesta kolonier ligger på svårtillgängliga öar så kolonin vid Simonstown är ett givet mål under en Sydafrikatur. Fåglarna är som väntat mycket oskygga och observans på ca halvmeter är att förvänta. Lokalen är en turistattraktion även för andra än fågelskådare.

DABCHICK (LITTLE GREBE) *Tachybaptus ruficollis* (smådopping)

2 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex öster Letaba 8/1, 100 ex Kwa-Zanele 10/1, 2 ex Wakkerstroom 11/1, 8 ex Cape Vidal 14/1, 10 ex längs vägen 15/1, 20 ex Underberg 16/1, 1 ex norr Calvinia 21/1, 10 ex Velddrif 23/1, 200 ex i en tät flock, Paarl 23/1.

GREAT CRESTED GREBE *Podiceps cristatus* (skäggdopping)

5 ex Kwa-Zanele 10/1, 1 ex Underberg 16/1, 2 ex Velddrif 23/1.

BLACK-NECKED GREBE *Podiceps nigricollis* (svarthalsad dopping)

10 ex Kamfers Dam 19/1, 1 ex Paarl 23/1.

WHITE-CHINNED PETREL *Procellaria aequinoctialis*

10 ex Godahoppsudden och 15 ex Glencairn 26/1, 300 ex Kommetjie 27/1.

SOOTY SHEARWATER *Puffinus griseus* (grålira)

10 ex Cape Agulhas 24/1, 25 ex Godahoppsudden och 10 ex Simonstown 25/1, 30 ex Godahoppsudden och 50 ex Glencairn 26/1, 5000 ex under 4 timmar vid Kommetjie 27/1.

CORY'S SHEARWATER *Calonectris diomedea* (gulnäbbad lira)

15 ex Cape Agulhas 24/1, 25 ex Godahoppsudden 25/1, 10 ex Godahoppsudden och 10 ex Glencairn 26/1, 300 ex Kommetjie 27/1.

CAPE GANNET *Morus capensis* (kapsula)

Minst 5000 ex i häckningskolonin vid Lamberts Bay 22/1, 100 ex Cape Agulhas 24/1, täml allmän runt Kaphalvön 25/1, 6000 ex Godahoppsudden och 200 ex Glencairn 26/1, 1500 ex Kommetjie 27/1. Från ett gömsle i Lamberts Bay kan man studera de häckande sulorna på ner till några centimeters håll (bara en glasruta emellan).

WHITE-BREASTED CORMORANT *Phalacrocorax carbo lucidus* (storskarv)

Under perioden 5-19/1 noterad i mindre antal under sex dagar, som mest 30 ex Underberg 16/1. Från 22/1 sedd dagligen; allmän vid kusten och en del större ansamlingar även vid inlandsvåtmarker, t.ex. 100 ex Paarl 23/1.

BANK CORMORANT *Phalacrocorax neglectus*

2 ex Kommetjie 25/1. Arten kan vara lite lurig att hitta, men Kommetjie verkar vara en bra lokal att döma även av andra reserapporter.

CAPE CORMORANT *Phalacrocorax capensis*

Allmän vid kusten 22-27/1. Uppenbart den klart vanligaste skarven.

REED (LONG-TAILED) CORMORANT *Phalacrocorax africanus* (långstjärtad skarv)

Noterad i växlande antal under 16 dagar 5-24/1. Största antal var 100 ex Mkuzi (Nsumo Pan) 13/1.

CROWNED CORMORANT *Phalacrocorax coronatus*

200 ex Lamberts Bay 22/1 (sitter gärna på båtar inne i hamnen), enstaka vid kusten 23/1, 10 ex Kommetjie 25/1, täml allmän Kaphalvön 26/1, 20 ex Kommetjie 27/1.

AFRICAN DARTER *Anhinga rufa* (afrikansk ormhalsfågel)

1 ex Pafuri 7/1, 4 ex Paarl 23/1.

PINK-BACKED PELICAN *Pelecanus rufescens* (rosaryggad pelikan)

250 ex vid häckningskoloni Mkuzi (Nsumo Pan) 12-13/1, 1 ex S:t Lucia 14/1.

WHITE PELICAN *Pelecanus onocrotalus* (vit pelikan)

50 ex Velddrif 22/1, 10 ex Velddrif 23/1, 20 ex West Coast NP 23/1.

DWARF BITTERN *Ixobrychus sturmii*

1 ex flög upp ur en liten bäck längs Mahonie Loop, Punda Maria 7/1.

LITTLE BITTERN *Ixobrychus minutus* (dvärgrördrom)

1 hona Augrabies Falls 20/1. Sågs i ett vassområde längs en bäck när vi letade Namaqua Warbler. Arten ses i Sydafrika främst i nordöstra delen av landet så detta fynd var något oväntat.

GOLIATH HERON *Ardea goliath* (goliathäger)

1 ex Engelhard Dam 8/1, 1 ex söder Olifants 9/1, 1 ex Crocodile Bridge 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex S:t Lucia och 1 ex Mtunzini 13/1.

PURPLE HERON *Ardea purpurea* (purpurhäger)

5 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex Wakkerstroom 11/1, 1 ex Mtunzini 14/1.

GREY HERON *Ardea cinerea* (gråhäger)

Sedd i små antal under 11 dagar 5-24/1, som mest 10 ex 22/1.

BLACK-HEADED HERON *Ardea melanocephala* (svarthuvad häger)

Sedd i växlande antal under 16 dagar 5-26/1, som mest 15 ex 10/1. Betydligt vanligare än föregående art.

YELLOW-BILLED EGRET *Egretta intermedia* (mellanhäger/plymhäger)

2 ex Nylsvlei 6/1, 3 ex Wakkerstroom 11/1.

GREAT WHITE EGRET *Egretta alba* (ägrethäger)

1 ex Brits 5/1, 1 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex Pafuri 7/1, 1 ex Letaba 8/1, 6 ex Wakkerstroom 10/1, 2 ex Wakkerstroom 11/1, 2 ex mellan S:t Lucia och Cape Vidal 14/1.

LITTLE EGRET *Egretta garzetta* (silkeshäger)

1 ex Shingwedzi 8/1, 1 ex Sunset Dam 9/1, 1 ex längs vägen 10/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 3 ex Mkuzi 13/1, 2 ex mellan S:t Lucia och Cape Vidal 14/1, 1 ex längs vägen 15/1, 1 ex De Hoop 24/1, 3 ex Kommetjie 27/1.

CATTLE EGRET *Bubulcus ibis* (kohäger)

Sedd i 20 dagar 5-27/1. Allmän utom i Krüger (där 1 ex söder Satara 9/1 var enda obs) och i ren öken 20-21/1.

SQUACCO HERON *Ardeola ralloides* (rallhäger)

2 ex Mkuzi (Nsumo Pan) 12/1.

WHITE-BACKED NIGHT HERON *Gorsachius leuconotus*

1 ex Engelhard Dam 8/1.

BLACK-CROWNED NIGHT HERON *Nycticorax nycticorax* (natthäger)

1 ex Engelhard Dam 8/1. Märkligt nog resans enda natthägerobs. Kom inflygande och landade tillsammans med närmast ovanstående art.

GREEN-BACKED HERON *Butorides striatus* (grönhäger)

1 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Pafuri 7/1, 2 ex Engelhard Dam och 1 ex längs vägen 8/1, 3 ex öster Skukuza 10/1.

BLACK STORK *Ciconia nigra* (svart stork)
1 ex söder Pietersburg 6/1, 1 ex mellan Satara och Lower Sabie 9/1.

ABDIM'S STORK *Ciconia abdimii* (abdimstork)
1 ex norr Brits 5/1 och 80 ex öster Kimberley 19/1.

WHITE STORK *Ciconia ciconia* (vit stork)
30 ex norr Brits 5/1, 24 ex Wakkerstroom 10/1, 1 ex Wakkerstroom 11/1, 50 ex mellan Kokstad och Underberg 15/1, allmän Underberg - Sani Pass 16/1, allmän ("på varenda fält") mellan Underberg och Ladysmith 17/1, 200 ex Suikerbosrand och 30 ex längs vägen 18/1, 200 ex längs vägen mellan Sandveld och Kimberley 19/1, 50 ex längs vägen i området kring Agulhas - De Hoop 24/1.

WOOLLY-NECKED STORK *Ciconia episcopus* (ullhalsstork)
1 ex Pafuri 7/1, 10 ex Shingwedzi 8/1, 3 ex Sunset Dam 9/1, 1 ex Mtunzini 14/1.

AFRICAN OPEN-BILLED STORK *Anastomus lamelligerus* (afrikansk gapnäbbstork)
1 ex Mkuzi 12/1 och 5 ex Mkuzi (Nsumo Pan) 13/1. Sunset Dam i Krüger ska vara bra, men vi kammade noll där. Turligt nog fanns ett litet gäng i Mkuzi i stället.

MARABOU STORK *Leptoptilus crumeniferus* (maraboustork)
3 ex Pafuri (bl.a. 1 ex på nattkvist under "night-drive") 7/1, 11 ex Shingwedzi och 9 ex norr Olifants 8/1, 30 ex Sunset Dam och 4 ex Skukuza 9/1, 11 ex öster Skukuza 10/1.

SADDLEBILLED STORK *Ephippiorhynchus senegalensis* (sadelnäbbstork)
7 ex Shingwedzi 8/1, 2 ex Olifants och 1 ex söder Satara 9/1. Arten häckar enligt uppgift nedanför Olifants Camp.

YELLOW-BILLED STORK *Mycteria ibis* (afrikansk ibisstork)
1 ex söder Olifants och 3 ex Sunset Dam 9/1, 14 ex Mkuzi 13/1, 3 ex S:t Lucia 14/1.

AFRICAN SPOONBILL *Platalea alba* (afrikansk skedstork)
2 ex Letaba 8/1, 7 ex Wakkerstroom 10/1, 10 ex Wakkerstroom 11/1.

HADEDA IBIS *Bostrychia hagedash* (hadedaibis)
Noterad i totalt ca 155 ex under 17 dagar 8-26/1. Ofta observerad inne i samhällen eller i andra mänskligt påverkade miljöer. Har ett förfärligt läte.

SOUTHERN BALD IBIS *Geronticus calvus* (sydlig eremitibis)
2 flockar om 7 + 21 ex norr om Amersfoort 10/1, 30 ex Wakkerstroom 11/1.

GLOSSY IBIS *Plegadis falcinellus* (bronsibis)
20 ex Wakkerstroom 10-11/1, 1 ex i en liten pöl väster Suikerbosrand 18/1.

SACRED IBIS *Threskiornis aethiopicus* (helig ibis)
Ca 450 ex under 14 observationsdagar 6-27/1. Oftast i små antal, men en mycket läcker observation var 200 ex inflygande för övernattning vid Velddrif 22/1.

HAMERKOP *Scopus umbretta* (skuggstork/skuggfågel)
Totalt ca 30 ex under 10 observationsdagar 5-17/1, sist sedd vid Ladysmith.

GREATER FLAMINGO *Phoenicopterus ruber* (större flamingo)
1000 ex Kamfers Dam 19/1, 2 ex söder Upington 20/1, 1000 ex Velddrif 22/1, 500 ex Velddrif 23/1.

LESSER FLAMINGO *Phoenicopterus minor* (mindre flamingo)
5000 ex Kamfers Dam 19/1.

SPUR-WINGED GOOSE *Plectropterus gambensis* (sporrvingad gås)
1 ex Nylsvlei 6/1, 4 ex mellan Amersfoort och Wakkerstroom 10/1, 3 ex längs vägen 15/1, 6 ex Underberg 16/1, 15 ex Ladysmith 17/1, 4 ex norr Wyford 18/1, 1 ex Paarl 23/1.

EGYPTIAN GOOSE *Alopochen aegyptiaca* (nilgås)

Täml allmän, sedd under 17 dagar 5-26/1. Ofta enstaka eller i smågrupper, men större antal noterades på några ställen i Krüger, 50 ex söder Uppington 19/1, 100 ex norr Calvinia 21/1 och 300 ex Paarl 23/1.

KNOB-BILLED (COMB) DUCK *Sarkidiornis melanotos* (knöland)

1 ex Punda Maria 7/1, 3 ex Olifants och 15 ex söder Satara 9/1 och 1 hona Mkuzi 12/1. Förekommer normalt endast i nordöstra delen av landet.

AFRICAN PYGMY GOOSE *Nettapus auritus*

5 ex i näckrostäckt våtmark ungefär halvvägs mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1. Vi spanade hårt efter Lesser Jacana (som kan sägas vara en följeart till Pygmy Goose), men förgäves. En bra lokal för båda arterna är en liten damm på östra sidan av N2:an, några km söder om avtaget mot S:t Lucia. P.g.a. kraftigt regn tidigare under säsongen var denna översvämmad när vi var där (och såg mer ut som en sjö), och då hittar man varken små ankor eller jacanor.

SOUTH AFRICAN SHELDUCK *Tadorna cana*

1 hona Wakkerstroom 10/1, 5 ex Wakkerstroom 11/1, 4 ex velddrif 22/1, 4 ex West Coast NP 23/1.

FULVOUS WHISTLING-DUCK *Dendrocygna bicolor*

10 ex Nylsvlei 6/1.

WHITE-FACED WHISTLING-DUCK *Dendrocygna viduata* (vitmaskad visseland)

2 ex Nylsvlei 6/1, 4 ex norr Letaba 8/1, täml allmän i Krüger 9/1, 10 ex Krüger 10/1, 2 ex Underberg 16/1.

SOUTHERN POCHARD *Netta erythroptalma*

1 par Kwa-Zanele 10/1, 1 hona Wakkerstroom 11/1, 2 ex Mkuzi 13/1, 3 ex Underberg 16/1, 20 ex Akkerendam 22/1.

WHITE-BACKED DUCK *Thalassornis leuconotus*

1 ex Kwa-Zanele 10/1, 9 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1, 1 ex Paarl 23/1.

MACCOA DUCK *Oxyura maccoa*

12 ex Paarl 23/1.

YELLOW-BILLED DUCK *Anas undulata*

Den vanligaste anden, noterad under 11 dagar 6-26/1. Större antal noterades bl.a. i Wakkerstroom, Velddrif och Paarl.

AFRICAN BLACK DUCK *Anas sparsa*

2 ex Borakalolo 5/1 blev enda obs av denna sparsamma, flodlevande art.

CAPE SHOVELER *Anas smithii* (kapskedand)

3 ex Kwa-Zanele 10/1, 2 ex Underberg 16/1, 4 ex Velddrif 22/1, 2 ex De Hoop 24/1.

HOTTENTOT TEAL *Anas hottentota*

4 ex Wakkerstroom 10/1, 2 ex Wakkerstroom 11/1.

RED-BILLED TEAL *Anas erythrorhyncha*

3 ex Kwa-Zanele 10/1. Överraskande nog bara en obs, och detta på en lokal vi inte kände till innan.

CAPE TEAL *Anas capensis*

4 ex Kamfers Dam 19/1, 6 ex norr Calvinia 21/1, 4 ex Velddrif 22/1, 20 ex Paarl 23/1.

SECRETARYBIRD *Sagittarius serpentarius* (sekreterarfågel)

1 ex Wakkerstroom 11/1. Arten ska inte vara alltför svår i Krüger eller på Agulhashalvön, men vi såg inga där.

LAPPET-FACED VULTURE *Torgos tracheliotus* (örongam)

1 ex i övernattningsträd norr Olifants 8/1, 2 ex söder Olifants 9/1.

HOODED VULTURE *Necrosyrtes monachus* (mungskam/kappgam)

6 ex söder Olifants och 2 ex öster Skukuza 9/1.

WHITE-HEADED VULTURE *Trigonoceps occipitalis* (vithuvad gam)

1 ex i övernattningsträd norr Olifants 8/1, 2 ex söder Olifants och 4 ex Lower Sabie 9/1.

CAPE VULTURE *Gyps coprotheres* (kapgam)

2 ex i övernattningsträd norr Olifants 8/1, 6 ex Sani Pass 16/1.

AFRICAN WHITE-BACKED VULTURE *Gyps africanus* (vitryggad gam)

Allmän i Krüger 7-9/1, 10 ex Krüger 10/1, upp till 50 ex dagligen i Mkuzi 11-13/1.

BEARDED VULTURE (LAMMERGEIER) *Gypaetus barbatus* (lammgam)

5 ex Sani Pass 16/1, bl.a. 1 par på bohylja, som varit bebodd av lammgamar åtminstone sedan 60-talet.

AFRICAN FISH EAGLE *Haliaeetus vocifer* (afrikansk fiskörn/skrikhavsörn)

2 ex Borakalolo 5/1, 4 ex Pafuri 7/1, 2 ex Shingwedzi och 2 ex Engelhard Dam 8/1, 1 ex väster Lower Sabie 9/1, 1 ad S:t Lucia och 1 juv mellan S:t Lucia och Cape Vidal 14/1, 1 ad West Coast NP 23/1.

BATELEUR *Terathopius ecaudatus* (gycklarörn)

Sedd i Krüger med 8 ex 7/1, 10 ex 8/1 och 7 ex 9/1. I Mkuzi sägs 8 ex 12/1 och 2 ex 13/1. En utpräglad viltreservats-art.

BROWN SNAKE-EAGLE *Circaetus cinereus* (brun ormörn)

3 ex norr Pietersburg 6/1, 1 ex mellan Punda Maria och Pafuri 7/1, 1 ex mellan Lower Sabie och Skukuza 9/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 2 ex mellan S:t Lucia och Cape Vidal 14/1.

BLACK-CHESTED SNAKE-EAGLE *Circaetus (gallicus) pectoralis* (ormörn)

1 ex söder Louis Trichard 6/1. Denna mycket ljusa ormörnsform har av en del auktorer ansetts vara en egen art.

LESSER SPOTTED EAGLE *Aquila pomarina* (mindre skrikörn)

1 ex Punda Maria 7/1, 1 ex Mkuzi 12/1.

STEPPE EAGLE *Aquila nipalensis* (stäppörn)

25 ex, de flesta yngre fåglar, i en skruv norr Crocodile Bridge 10/1.

TAWNY EAGLE *Aquila rapax* (savannörn)

5 ex mellan Shingwedzi och Olifants 8/1, 2 ex mellan Olifants och Lower Sabie 9/1, 2 ex mellan Skukuza och Crocodile Bridge 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1.

WAHLBERG'S EAGLE *Aquila wahlbergi* (wahlbergs örn/pygméörn)

4 ex mellan Punda Maria och Olifants 8/1, 4 ex Krüger 9/1, 4 ex Mkuzi 12/1.

VERREAUX'S (BLACK) EAGLE *Aquila verreauxii* (klippörn)

1 subad under en "bensträckare" vid Elands Waterfall 10/1, 2 ad sydväst Pofadder 21/1, 2 ad Akkerendam och 2 ad Kransvlei Poort 22/1.

MARTIAL EAGLE *Polemaetus bellicosus* (stridsörn)

1 ad Punda Maria 7/1, 1 ad Orpen Dam 9/1, 2 ad Mkuzi 12/1, 1 2k öster Pofadder 20/1, 1 2k sydväst Pofadder och 1 2k norr Calvinia 21/1.

CROWNED EAGLE *Stephanoaetus coronatus* (kronörn)

1 ad på bo med en dununge, Oribi Gorge 15/1.

LONG-CRESTED EAGLE *Lophaetus occipitalis* (tofsörn)

1 Oribi Gorge och 1 ex längs vägen 15/1, 2 ex Underberg 17/1.

AFRICAN HAWK-EAGLE *Hieraaetus fasciatus* (afrikansk hökörn)

2 ex mellan Olifants och Satara 9/1.

BOOTED EAGLE *Hieraaetus pennatus* (dvärgörn)

1 ljus norr Crocodile Bridge 10/1, 1 ljus norr Clanwilliam och 1 ljus öster Lamberts Bay 22/1.

JACKAL BUZZARD *Buteo rufofuscus* (sjakalvråk)
Totalt 24 ex under 11 observationsdagar 11-26/1.

FOREST BUZZARD *Buteo trizonatus*
1 ex Oribi Gorge 15/1. En inte helt lätt endem som vi hade lite tur med.

STEPPE BUZZARD *Buteo buteo vulpinus* (ormvråk/stäppvråk)
Ej sedd i Krüger eller 13-14/1, i övrigt dagligen. Ses ofta sitta längs vägarna, påminner i uppträdandet en hel del om ormvråkar en vinterdag i Skåne. De är sällan många tillsammans, men man ser i storleksordningen 10-25 ex under en dag. Tätare förekomster noterades längs väg N1 (den som går norrut från Johannesburg/Pretoria) 6/1 ("allmän") och öster om Kapstaden, 50 ex 24/1.

GYMNOGENE (HARRIER HAWK) *Polyboroides typus* (klätterhök)
1 ex öster Malalene 10/1, 1 ex Underberg och 1 ex sydväst Underberg 16/1.

LIZARD BUZZARD *Kaupifalco monogrammicus* (ödlevråk)
1 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 1 ex Mkuzi 11/1.

AFRICAN MARSH HARRIER *Circus ranivorus*
1 ex Mkuzi (Nsumo Pan) 12/1, 1 ex längs vägen 15/1, 2 ex längs vägen mellan Ladysmith och Suikerbosrand 18/1.

EUROPEAN MARSH HARRIER *Circus aeruginosus* (brun kärrhök)
1 2k Nylsvlei 6/1, 1 hona The Swamp 17/1. Subraritet i området.

BLACK HARRIER *Circus maurus*
1 2k Underberg 16/1, 1 2k väster Calvinia 22/1, 1 ad (en av resans absolut vackraste fåglar!) vid Geelbek, West Coast NP 23/1.

PALLID HARRIER *Circus macrourus* (stäpphök)
1 hona norr Letaba 8/1, 1 hona och 2 juv längs vägen i Krüger 9/1.

MONTAGU'S HARRIER *Circus pygargus* (ängshök)
1 hane Wakkerstroom 11/1.

BLACK-SHOULDERED KITE *Elanus caeruleus* (svartvingad glada)
"Papperssvalan" var en av de vanligaste rovfågarna på resan och noterades i varierande antal under 17 dagar 5-26/1. Oftast sedd i 3-5 ex per dag men allmän längs N1 (se Steppe Buzzard) 6/1.

YELLOW-BILLED (BLACK) KITE *Milvus (migrans) aegyptius* (brun glada)
Sedd under 15 dagar 5-24/1, ofta inte i några större antal (upp till 20 ex per dag), bortsett från 6/1 (se Steppe Buzzard och Black-Shouldered Kite) då den var allmän. I Krüger var den täml allmän i de öppnare centrala delarna av parken men i övrigt sågs där endast enstaka individer.

PALE CHANTING GOSHAWK *Melierax canorus*
1 ex Langberg 19/1, 10 ex längs vägen 20/1, 25 ex längs vägen i öknen 21/1, 1 ex längs vägen 22/1, 1 ex längs vägen 23/1.

CUCKOO HAWK *Aviceda cuculoides*
1 ex mellan Punda Maria och Pafuri 7/1.

GABAR GOSHAWK *Micronisus gabar* (gabarhök)
1 ex Langberg 19/1.

AFRICAN GOSHAWK *Accipiter tachiro*
1 ex på en Tv-antenn i S:t Lucia 13/1.

AFRICAN LITTLE SPARROWHAWK *Accipiter minullus*
2 ex Sandveld 19/1.

LITTLE BANDED GOSHAWK (SHIKRA) *Accipiter badius*
1 ex mellan Punda Maria och Pafuri 7/1, 1 ex mellan Satara och Lower Sabie 9/1.

BAT HAWK *Macheiramphus alcinus*

2 ex inne på Olifants Camp 8/1. Sågs jaga fladdermöss i skymningen och i lampsken en stund framåt. Mycket häftigt!

LANNER FALCON *Falco biarmicus* (slagfalk)

1 ex norr Franklin 15/1, 1 ex Underberg 17/1.

PEREGRINE FALCON *Falco peregrinus* (pilgrimsfalk)

1 ad väster Calvinia 22/1.

EASTERN RED-FOOTED (AMUR) FALCON *Falco amurensis* (amurfalk)

3 ex Nylsvlei 6/1, ca 250 ex längs vägen östra Transvaal 10/1, ca 200 ex, huvudsakligen kring Wakkerstroom 11/1, 1 hane Mkuzi 12/1, 1 hona mellan S:t Lucia och Cape Vidal 14/1, 100 ex söder Underberg 15/1, 300 ex Underberg 16/1, 150 ex Ladysmith 17/1, ca 100 ex under dagen 18/1, 30 ex längs vägen och 5 ex Kamfers Dam 19/1. Sitter ofta flockvis utmed vägarna och övernattar gemensamt, ibland i flockar på flera tusen individer! Enstaka aftonfalkar kan också finnas med i flockarna. Artens flyttning går från östra Asien via Indiska halvön till södra Afrika och de allra flesta övervintrar i östra Transvaal eller västra Natal! De stora flockarna med amurfalkar var en av resans verkliga höjdpunkter.

DICKINSON'S KESTREL *Falco dickensoni*

1 ex kretsade över Punda Maria camp på morgonen 8/1.

LESSER KESTREL *Falco naumanni* (rödfalk)

1 hona Wakkerstroom 11/1, 1 hane väster Calvinia 22/1, 1 2k hane Godahoppssudden 25/1.

ROCK KESTREL *Falco tinnunculus* (tornfalk)

1 ex norr Pietersburg 6/1 följdes av 10 dagar utan tornfalk. Därefter sågs ca 90 ex under dagliga observationer 17-25/1, med som mest 30 resp. 20 ex 22-23/1, d.v.s. de dagar vi körde runt i Karoo.

GREATER KESTREL *Falco rupicoloides*

2 ex längs vägen öster om Kimberley 19/1 och 2 ex mellan Pofadder och Brandvlei 21/1.

PYGMY FALCON *Polihierax semitorquatus*

12 ex längs vägen 20/1, samtliga mellan Griekwastad och Groblershoop. Dagen efter sågs 1 ex sydväst Pofadder och 5 ex sydost Pofadder. Andra reserapporter brukar rapportera i storleksordningen 2-4 ex totalt. Våra 18 ex beror nog på två saker. Dels att vi åkte senare än de flesta resor och ungarna var flygga. Dels var detta en av våra verkliga önskearter och för att inte missa den var det kommanderat räsplan på ledningar och i trädtoppar längs vägen den 20/1. Verkar vara en bra strategi!

SWAINSON'S FRANCOLIN *Francolinus swainsonii*

4 ex Olifants 8/1, enstaka söder Olifants 9/1, 1 ex Sandveld 19/1.

NATAL FRANCOLIN *Francolinus natalensis*

5 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Pafuri och 6 ex Punda Maria 7/1, ca 10 ex Mahonie Loop 8/1, ca 10 ex Krüger 9/1, 3 ex söder Skukuza 10/1. Således ej sedd i Natal!

CAPE FRANCOLIN *Francolinus capensis*

5 ex Akkerendam 22/1, 5 ex West Coast NP 23/1, totalt 10 ex 24/1, 10 ex Kirstenbosch 25/1.

GREYWING FRANCOLIN *Francolinus africanus*

3 sedda samt hörd Sani Pass 16/1, 7 ex Suikerbosrand 18/1.

REDWING FRANCOLIN *Francolinus levaillantii*

7 sedda samt hörd Sani Pass 16/1.

ORANGE RIVER FRANCOLIN *Francolinus levaillantoides*

3 ex Sandveld 19/1.

CRESTED FRANCOLIN *Francolinus sephaena*

1 ex Punda Maria 6/1, 6 ex Pafuri och 3 ex Punda Maria 7/1, 2 ex Mahonie Loop 8/1.

HELMETED GUINEAFOWL *Numida meleagris* (hjälpärhona)

Sedd under 13 dagar, bl.a. dagligen 17-24/1. Speciellt vanlig runt Kimberley (90 ex 19/1) samt i Karoo och öster om Kapstaden (allmän 22-24/1).

CRESTED GUINEAFOWL *Guttera pulcherani*

De flesta resor har denna i Mkuzi, men vi lyckades missa den där. Tack vare lite flyt hade vi i stället 7 ex på vägen strax söder om Cape Vidal 14/1.

COMMON QUAIL *Coturnix coturnix* (vaktel)

Allmänt spelande i gräsländet kring Wakkerstroom 10-11/1 samt flera spelande sydväst Underberg 16/1. 1 ex sågs 11/1, i övrigt endast hörd.

REDKNOBBED COOT *Fulica cristata* (kamsöthöna)

Allmän vid de flesta våtmarker vi besökte, dock ej observerad i Nylsvlei, Krüger eller Mkuzi. Sedd under 13 dagar, bl.a. dagligen 15-24/1. Allmän i t.ex. Kwa-Zanele, Franklin Marsh, Underberg och i samtliga våtmarker vi besökte i sydvästra Kap.

COMMON MOORHEN *Gallinula chloropus* (rörhöna)

20 ex Nylsvlei 6/1, enstaka ex Kwa-Zanele och Wakkerstroom 10/1, 4 ex Franklin Marsh 15/1, 4 ex Underberg 16/1, 1 ex Augrabies Falls 20/1, 25 ex Paarl 23/1.

PURPLE GALLINULE *Porphyrio porphyrio* (purpurhöna)

3 ex Nylsvlei 6/1, 2 ex Kwa-Zanele 10/1, 1 ex Wakkerstroom 11/1, 1 ex Franklin Marsh 15/1, 2 ex Paarl 23/1.

BLACK CRAKE *Amaurornis flavirostris* (korprall)

1 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex mellan Shingwedzi och Letaba 8/1, 2 ex mellan Olifants och Lower Sabie 9/1, 1 Underberg 16/1.

AFRICAN RAIL *Rallus caerulescens*

3 ex Franklin Marsh 15/1.

RED-CHESTED FLUFFTAIL *Sarothura rufa*

2 spelande Wakkerstroom 10/1.

GREY CROWNED CRANE *Balearica regolorum* (grå krontrana)

1 ex Wakkerstroom 10/1, 1 ex Franklin Marsh 15/1, 1 ex norr Underberg och 2 ex Ladysmith 17/1.

WATTLED CRANE *Grus carunculatus*

2 ex sydväst Underberg 16/1. Arten häckar i området men flyttar normalt iväg i december. Rob Guy hade dock koll på att detta par hade stannat kvar, till vår stora glädje.

BLUE CRANE *Anthropoides paradiseus* (blåtrana)

2 ad och 2 juv Wakkerstroom 11/1, 4 ex Ladysmith 17/1, totalt 30 ex i området Cape Agulhas - De Hoop 24/1.

KORI BUSTARD *Ardeotis kori* (koritrapp)

1 ex rastande öster om Kimberley 19/1, 1 ex flygande väster om Kimberley 20/1.

STANLEY'S (DENHAM'S) BUSTARD *Neotis denhami* (denhamtrapp)

2 ex sydväst Underberg 16/1, 4 ex i området Cape Agulhas - De Hoop 24/1.

LUDWIG'S BUSTARD *Neotis ludwigii*

2 ex norr Calvinia 21/1.

KAROO KORHAAN *Eupodotis vigorsii*

9 ex öster Pofadder 20/1, 2 ex sydväst Pofadder 21/1, 4 ex norr Calvinia 21/1.

BLUE KORHAAN *Eupodotis caerulescens*

2 ex Wakkerstroom 10/1, 7 ex i två grupper (2+5) Wakkerstroom 11/1.

RED-CRESTED KORHAAN *Eupodotis ruficrista*

1 ex söder om Skukuza 10/1.

NORTHERN BLACK KORHAAN *Eupodotis afroaoides*

2 ex öster Bloemhof 18/1, 2 ex Sandveld och 7 ex längs vägen 19/1, 1 ex öster Pofadder 20/1.

SOUTHERN BLACK KORHAAN *Eupodotis afra*

1 hane öster Lamberts Bay 22/1, 1 hona norr De Hoop 24/1.

AFRICAN JACANA *Actophilornis africanus* (afrikansk jacana)

25 ex Nylsvlei 6/1, enstaka i Krüger 8-10/1, 2 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1.

AFRICAN BLACK OYSTERCATCHER *Haematopus moquini* (svart strandskata)

3 ex Kommetjie 25/1, 2 ex Godahoppsudden och 1 ex Glencairn 26/1, 4 ex Kommetjie 27/1. Världspopulationen beräknas understiga 5000 individer.

BLACK-WINGED STILT *Himantopus himantopus* (styllöpare)

2 ex Shingwedzi 8/1, 1 ex mellan Olifants och Satara 9/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 20 ex Kamfers Dam 19/1, 2 ex norr Calvinia 21/1, 100 ex Velddrif 22-23/1, 75 ex De Hoop 24/1.

AVOCET *Avocetta curvirostra* (skärfläcka)

1 ex Kamfers Dam 19/1, 15 ex norr Calvinia 21/1, 50 ex Velddrif 22-23/1.

BLACK-WINGED PRATINCOLE *Glareola nordmanni* (svartvingad vadarsvala)

1 ex Nylsvlei 6/1.

RINGED PLOVER *Charadrius hiaticula* (större strandpipare)

15 ex Mtunzini 14/1, 10 ex Velddrif 22/1, 20 ex West Coast NP 23/1.

THREE-BANDED PLOVER *Charadrius tricollaris* (trebandad pipare)

4 ex mellan Shingwedzi och Olifants 8/1, totalt ca 10 ex 9/1, 2 ex Sandveld och 1 ex Kamfers Dam 19/1.

KITTLITZ'S PLOVER *Charadrius pecuarius* (kittlitzstrandpipare)

1 ex Shingwedzi och 1 ex Letaba 8/1, 10 ex Marrick Game Farm 19/1, 10 ex West Coast NP och 10 ex Paarl 23/1.

CHESTNUT-BANDED PLOVER *Charadrius pallidus* (sodasjöpipare)

3 ex Velddrif 22/1, 3 ex Geelbek, West Coast NP 23/1.

WHITE-FRONTED PLOVER *Charadrius marginatus* (kuststrandpipare)

2 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex Lamberts Bay 22/1, 2 ex West Coast NP 23/1.

CROWNED PLOVER *Vanellus coronatus*

Ca 60 ex under 10 obsdagar 5-24/1. Inga stora ansamlingar men möjligen något vanligare på sträckan Johannesburg - Kimberley än annorstädes.

WHITE-CROWNED PLOVER *Vanellus albiceps*

2 ex Pafuri 7/1, 2 ex Engelhard Dam och 1 ex Olifants 8/1. Flodlevande art, som i Sydafrika endast förekommer längst upp i nordost.

WATTLED PLOVER *Vanellus senegallus* (senegalvipa)

2 ex Borakalolo 5/1, 1 ex väster Elands Waterfall 10/1, 2 ex Wakkerstroom 11/1.

BLACKSMITH PLOVER *Vanellus armatus* (smedvipa)

Noterad i växlande antal under 17 dagar 6-26/1. Som mest räknades 50 ex längs vägen 10/1 och 50 ex Underberg 16/1.

GREY PLOVER *Pluvialis squatarola* (kustpipare)

10 ex Velddrif 22/1, 40 ex West Coast NP 23/1, 20 ex De Mond 24/1.

KNOT *Calidris canutus* (kustsnäppa)

150 ex West Coast NP 23/1.

SANDERLING *Calidris alba* (sandlöpare)

20 ex Lamberts Bay 22/1, 50 ex West Coast NP 23/1.

LITTLE STINT *Calidris minuta* (småsnäppa)

10 ex Kamfers Dam 19/1, 10 ex Velddrif 22/1, 200 ex West Coast NP och 20 ex Paarl 23/1, 30 ex De Mond 24/1.

CURLEW SANDPIPER *Calidris ferruginea* (spovsnäppa)

10 ex Mtunzini 14/1, 20 ex Velddrif och 500 ex West Coast NP 23/1, 10 ex De Mond 24/1.

RUFF *Philomachus pugnax* (brushane)

1 ex mellan Satara och Lower Sabie 9/1, 40 ex Mkuzi 13/1, 5 ex Kamfers Dam 19/1, 10 ex Velddrif 22/1, 4 ex West Coast NP 23/1.

PAINTED SNIPE *Rostratula benghalensis* (rallbeckasin)

1 hona norr Letaba 8/1.

ETHIOPIAN SNIPE *Gallinago nigripennis*

1 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex Underberg 16/1.

BAR-TAILED GODWIT *Limosa lapponica* (myrspov)

20 ex West Coast NP 23/1.

WHIMBREL *Numenius phaeopus* (småspov)

20 ex Velddif 22/1, 30 ex West Coast NP 23/1, 10 ex De Mond 24/1, 1 ex Kommetjie 27/1.

CURLEW *Numenius arquata* (storspov)

1 ex Velddrif 22/1, 15 ex West Coast NP 23/1.

GREENSHANK *Tringa nebularia* (gluttsnäppa)

1 ex Pafuri 7/1, 3 ex mellan Punda Maria och Olifants 8/1, 2 ex St Lucia och 4 ex Mtunzini 14/1, enstaka ex vid Velddrif 22/1 och West Coast NP 23/1.

MARSH SANDPIPER *Tringa stagnatilis* (dammsnäppa)

2 ex Mtunzini 14/1, 4 ex Kamfers Dam 19/1, 10 ex West Coast NP 23/1.

WOOD SANDPIPER *Tringa glareola* (grönben)

Sedd under 11 dagar 6-23/1, som mest 30 ex längs vägen i Krüger 9/1 och totalt ca 50 ex 23/1.

COMMON SANDPIPER *Actitis hypoleucos* (drillsnäppa)

1 ex Pafuri 7/1, 3 ex mellan Punda Maria och Olifants 8/1, totalt 10 ex i Krüger 9/1, totalt ca 5 ex i Krüger 10/1, enstaka ex vid Velddrif 22/1, enstaka ex West Coast NP och Paarl 23/1.

TEREK SANDPIPER *Xenus cinereus* (tereksnäppa)

1 ex Geelbek, West Coast NP 23/1. Arten är en regelbunden, men fåtalig övervintrare i Kap.

TURNSTONE *Arenaria interpres* (roskarl)

1 ex Lamberts Bay 22/1, 15 ex West Coast NP 23/1.

DOUBLE-BANDED COURSER *Smithornis africanus*

1 ex öster Bloemhof 18/1, 4 ex Marrick Game Farm 19/1, 1 ex öster Pofadder 20/1.

BRONZE-WINGED COURSER *Rhinoptilus chalcopterus*

1 ex väster Borakalolo 5/1, 7 ex (alla ensamma) på "night-drive" längs Mahonie Loop 7/1, 1 ex Mkuzi 12/1. Samtliga observerade ex sågs på kvällen när det var helt mörkt och samtliga stod på vägen framför bilen, helt orädda.

SPOTTED DIKKOP (THICK-KNEE) *Burhinus capensis*

2 ex Velddrif 23/1, 2 ex Kirstenhof 26/1. De sistnämnda spelade på kvällen och hördes från huset vi bodde i. Ordet Dikkop härstammar från Afrikaan och betyder något i stil med "tjockskalle" eller "idiot".

WATER DIKKOP (THICK-KNEE) *Burhinus vermiculatus*

1 ex Shingwedzi 8/1, 3 ex söder Satara och 1 ex öster Skukuza 9/1, 3 ex öster Skukuza 10/1.

SUBANTARCTIC SKUA *Catharacta antarctica*

2 ex Kommetjie 27/1.

POMARINE SKUA *Stercorarius pomarinus* (bredstjärtad labb)
3 ex Godahoppsudden 26/1.

ARCTIC SKUA *Stercorarius parasiticus* (labb)
10 ex Godahoppsudden 26/1, 25 ex Kommetjie 27/1.

KELP GULL *Larus dominicanus* (kelptrut)
Allmän vid Kapkusten 22-27/1. Ej sedd i övrigt under resan.

SABINE'S GULL *Larus sabini* (tärnmås)
2 ex Kommetjie 27/1.

HARTLAUB'S GULL *Larus hartlaubii*
Allmän och talrik vid Kapkusten 22-27/1, men ej sedd i övrigt under resan.

GREY-HEADED GULL *Larus cirrocephalus* (gråhuvad mås)
20 ex S:t Lucia 13/1, 100 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex längs vägen 18/1, 50 ex Sandveld 19/1.

CASPIAN TERN *Sterna caspia* (skrântärna)
8 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex De Mond 24/1.

LESSER CRESTED TERN *Sterna bengalensis* (iltärna)
5 ex S:t Lucia 14/1.

SWIFT (GREATER CRESTED) TERN *Sterna bergii* (tofstärna)
5 ex S:t Lucia 13/1, 50 ex S:t Lucia 14/1, allmän Lamberts Bay 22/1 samt på Kaphalvön 25-27/1, enstaka sedda vid kusten även 23-24/1.

SANDWICH TERN *Sterna sandwichensis* (kentsk tärna)
100 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex Lamberts Bay 22/1, upp till 15 ex dagligen vid Kapkusten 24-27/1.

COMMON TERN *Sterna hirundo* (fisktärna)
30 ex S:t Lucia 14/1, 150 ex Lamberts Bay 22/1, allmän vid Kapkusten 24-27/1 med bl.a. 300 ex De Mond 24/1.

LITTLE TERN *Sterna albifrons* (smätärna)
150 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex De Mond 24/1.

DAMARA TERN *Sterna balaenarum*
2 ex De Mond 24/1. Arten häckar längs stranden mellan De Mond och Cape Agulhas men att se dem längs denna sträcka är mycket arbetsamt, då det är rejåla sanddyner och det kan vara långt till tärnorna. Flodmynningen vid De Mond är således ett bra alternativ.

WHITE-WINGED BLACK TERN *Chlidonias leucopterus* (vitvingad tärna)
3 ex Kwa-Zanele 10/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 10 ex Sandveld 18/1, 300 ex Sandveld och 200 ex Kamfers Dam 19/1, 1000 ex Paarl 23/1, 300 ex De Hoop 24/1.

WHISKERED TERN *Chlidonias hybridus* (skäggtärna)
50 ex Kwa-Zanele 10/1, 10 ex Mkuzi 12/1, 1 ex i en liten damm utanför entrén till Suikerbosrand 18/1.

NAMAQUA SANDGROUSE *Pterodes namaqua*
15 ex öster Pofadder 20/1, 80 ex sydväst Pofadder (de flesta vid Aggenys Red Dunes) 21/1.

ROCK (SPECKLED) PIGEON *Columba guinea* (guineaduva)
1 ex Nylstroom 6/1, 2 ex Sani Pass 16/1, 1 ex Ladysmith 17/1, 10 ex Kimberley 19/1, 10 ex Augrabies Falls 20/1, enstaka i Karoo 22/1.

RAMERON (OLIVE) PIGEON *Columba arquatrix*
2 ex Oribo Gorge 15/1, 5 ex Xumeni Forest 17/1, 2 ex Kirstenbosch 25/1.

FERAL PIGEON *Columba livia* (tamduva)
Noterad 17 dagar 5-27/1. Saknades i Krüger och Mkuzi.

CINNAMON (LEMON) DOVE *Aplopelia larvata*

2 ex Oribi Gorge 15/1.

AFRICAN MOURNING DOVE *Streptopelia decipiens*

7 ex Letaba 8/1, 5 ex Satara 9/1. Arten har nyligen etablerat sig i Sydafrika, och dessa två camper i Krüger är de bästa lokalerna.

RED-EYED DOVE *Streptopelia semitorquata* (rödögd duva)

Noterad under 11 dagar 5-26/1, vanligast i nordost.

CAPE TURTLE DOVE *Streptopelia capicola*

Noterad alla dagar utom i öknen 21/1. Allmän i hela landet.

LAUGHING DOVE *Streptopelia senegalensis* (palmduva)

Allmän i större delen av landet, observerad under 17 dagar 5-27/1, bl.a. dagligen från 16/1.

AFRICAN GREEN PIGEON *Treeron calva*

4 ex Pafuri 7/1, 50 ex Skukuza 10/1, 2 ex Mkuzi 13/1.

GREEN- (EMERALD-)SPOTTED DOVE *Turtur calchospilos*

Allmän i Krüger och Mkuzi, i övrigt inte observerad.

TAMBOURINE DOVE *Turtur tympanistris*

4 ex Mkuzi 13/1, 1 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1, 4 ex Oribi Gorge 15/1.

NAMAQUA DOVE *Oena capensis* (långstjärtduva/kapduva)

3 ex längs vägen 18/1, 2 ex Sandveld och 5 ex Kimberley 19/1, totalt ca 50 ex 20/1, totalt ca 10 ex 21/1.

BROWN-NECKED (CAPE) PARROT *Poicephalus robustus*

1 ex Mahonie Loop 8/1. Arten förekommer i Sydafrika i två distinkta raser, varav den av oss observerade finns i stora delar av Afrika. En annan ras (som ibland anses vara en fullgod art), har sin huvudsakliga utbredning i Natal. Den är sällsynt, men vi försökte på den utanför Underberg 17/1, dock utan framgång.

BROWN-HEADED PARROT *Poicephalus cryptoxanthus*

3 ex Mahonie Loop 8/1.

GREY LOURIE (GO-AWAY-BIRD) *Corythaixoides concolor*

3 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Warmbad och 2 ex längs vägen 6/1, 3 ex Punda Maria 7/1, 2 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 2 ex öster Skukuza 9/1, 1 ex öster Skukuza och 1 ex söder Skukuza 10/1. Alternativnamnet är uppkallat efter artens karakteristiska läte "ke-waay" (eller Go Away!).

KNYSNA LOURIE *Tauraco corythaix*

5 ex Oribi Gorge 15/1, 1 ex Xumeni Forest och 1 ex Hella Hella 17/1.

LIVINGSTONE'S LOURIE *Tauraco livingstonii*

5 ex Cape Vidal 14/1.

PURPLE-CRESTED LOURIE *Tauraco porphyreolophus*

2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 1 ex Mtunzini 14/1.

AFRICAN CUCKOO *Cuculus gularis*

6 ex Mkuzi 12/1. Arten är en intra-afrikansk flyttare och vanligast på sommaren.

RED-CHESTED CUCKOO *Cuculus solitarius*

1 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Pafuri 7/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1. Arten är allmän i större delen av landet, men dels är den svärsedd och dels lägger den av att ropa tidigare på säsongen. Det förklarar vår låga summa, både av denna art och en del andra gökar.

JACOBIN CUCKOO *Cuculus jacobinus*

1 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 1 ex mellan Skukuza och Crocodile Bridge 10/1, 4 ex Mkuzi 12/1.

DIEDERIK CUCKOO *Chrysococcyx caprius* (större guldgök)
1 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Nylsvlei 6/1, 4 ex Suikerbosrand 18/1, 1 ex Sandveld och 1 ex Langberg 19/1, 1 ex Augrabies Falls 20/1.

KLAAS'S CUCKOO *Chrysococcyx klaas* (mindre guldgök)
1 ropande Mkuzi 13/1.

EMERALD CUCKOO *Chrysococcyx cupreus* (smaragdök)
1 ex Oribi Gorge 15/1.

BURCHELL'S COUCAL *Centropus burchelli*
1 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Nylsvlei 6/1, 2 ex Pafuri 7/1, 1 ex läns vägen 8/1, 1 ex söder Satara 9/1, 1 ex Mkuzi 12/1.

AFRICAN SCOPS OWL *Otus senegalensis* (afrikansk dvärgöv)
1 ex på dagkvist, Satara 9/1.

SOUTHERN WHITE-FACED OWL *Ptilopsis granti*
1 ex på "night-drive", Mahonie Loop 7/1. Underarten från södra Afrika har nyligen brutits ut till en egen art och skiljts från Northern White-faced Owl *P.leucotis*. Båda arterna har vidare förts till ett eget släkte (tidigare *Otus*).

SPOTTED EAGLE-OWL *Bubo africanus*
1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Sandveld 18/1. Därtill noterades två obestämda Eagle-Owls i gryningen 21/1, några mil väster om Pofadder. Dessa var antingen Spotted eller Cape Eagle-Owl *B.capensis*.

MARSH OWL *Asio capensis* (kapuggla)
2 ex Ladysmith 17/1.

PEARL-SPOTTED OWL (OWLET) *Glaucidium perlatum*
1 ex Mkuzi 13/1.

FRECKLED NIGHTJAR *Caprimulgus tristigma*
2 ex på "night-drive", Mahonie Loop 7/1. Dessutom ett antal obestämda nattskärnor vid samma tillfälle.

MOZAMBIQUE NIGHTJAR *Caprimulgus fossii*
Ca 10 ex på "night-drive", Mahonie Loop 7/1. Nattskärnorna satt oftast på vägen framför jeepen och lät sig belysas med lampa.

FIERY-NECKED NIGHTJAR *Caprimulgus pectoralis*
1 ex på "night-drive", Mkuzi 12/1. Dessutom några obestämda nattskärnor vid samma tillfälle.

ALPINE SWIFT *Apus melba* (alpsglare)
1 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 20 ex Elands Waterfall 10/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1, 5 ex Sani Pass 16/1, 2 ex längs vägen 18/1, 20 ex Big Hole 19/1, 10 ex Augrabies Falls 20/1, 5 ex längs vägen 21/1.

BRADFIELD'S SWIFT *Apus bradfieldi*
20 ex Big Hole, Kimberley 19/1.

AFRICAN BLACK SWIFT *Apus barbatus*
30 ex Elands Waterfall 10/1, allmän Wakkerstroom 11/1, 50 ex Sani Pass 16/1.

EUROPEAN SWIFT *Apus apus* (tornseglare)
20 ex Sani Pass 16/1, 10 ex Marrick Game Farm 19/1, 15 ex Augrabies Falls 20/1.

LITTLE SWIFT *Apus affinis* (stubbstjärtseglare)
Allmän i hela landet. Noterad under samtliga dagar 5-27/1.

HORUS SWIFT *Apus horus*
15 ex Sani Pass 16/1. I Sani Pass kan man samtidigt se tre arter vitgumpade seglare!

WHITE-RUMPED SWIFT *Apus caffer* (kafferseglare)
10 ex Wakkerstroom 10/1, 10 ex Wakkerstroom och 5 ex Mkuzi 11/1, 50 ex Mkuzi 12/1, 10 ex Underberg 15/1, enstaka Sani Pass 16/1 samt enstaka ex noterade 19, 22 och 23/1.

PALM SWIFT *Cypsiurus parvus* (afrikansk palmseglare)
Sedd dagligen i små antal 5-9/1, 20 ex Bonamanzi 13/1, 20 ex S:t Lucia 14/1.

NARINA TROGON *Apaloderma trogon*
1 ad med 1 juv, Xumeni Forest 17/1.

RED-FACED MOUSEBIRD *Urocolius indicus*
4 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex Pafuri 7/1, enstaka längs vägen 8/1, 8 ex Mkuzi 11/1, 6 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Augrabies Falls 20/1.

SPECKLED MOUSEBIRD *Colius striatus*
1 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 1 ex Olifants 9/1, 1 ex Skukuza 10/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1.

WHITE-BACKED MOUSEBIRD *Colius colius*
4 ex Sandveld 18/1, 30 ex Sandveld och 25 ex Langberg 19/1, 10 ex Augrabies Falls 20/1, 10 ex Akkerendam 22/1, enstaka sedda 23/1.

GIANT KINGFISHER *Ceryle maxima* (jättekungsfiskare)
1 ex Pafuri 7/1, 1 ex Engelhard Dam 8/1, 1 ex Mtunzini 14/1, 1 ex söder Upington 20/1.

PIED KINGFISHER *Ceryle rudis* (gråfiskare)
Flera ex Borakalolo 5/1, flera ex Nylsvlei 6/1, täml allmän Krüger 7-10/1, 2 ex Wakkerstroom 11/1, totalt 5 ex på olika lokaler 14/1, 10 ex Underberg 16/1, 2 ex Lamberts Bay 22/1, 1 ex Kommetjie 25/1.

HALF-COLLARED KINGFISHER *Alcedo semitorquata*
1 ex Underberg 16/1.

MALACHITE KINGFISHER *Alcedo cristata*
1 ex Shingwedzi 8/1, 1 ex öster Skukuza 9/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Underberg 16/1, 4 ex Paarl 23/1.

PYGMY KINGFISHER *Ispidina picta*
1 ex Oribi Gorge 15/1.

WOODLAND KINGFISHER *Halcyon senegalensis*
3 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Warmbad och 1 ex längs vägen 6/1, allmän i norra och mellersta Krüger 7-9/1, enstaka i södra Krüger 10/1, 1 ex väster Elands Waterfall 10/1.

BROWN-HOODED KINGFISHER *Halcyon albiventris*
1 ex Borakalolo 5/1, 1 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 2 ex Mkuzi 11/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi och 1 ex Bonamanzi 13/1, 3 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1.

GREY-HOODED (-HEADED) KINGFISHER *Halcyon leucocephala*
1 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1.

STRIPED KINGFISHER *Halcyon chelicuti*
3 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Mkuzi 13/1.

SOUTHERN CARMINE BEE-EATER *Merops nubicooides* (sydlig karminbiätare)
5 ex Borakalolo 5/1, totalt ca 10 ex i Krüger 7-9/1.

EUROPEAN BEE-EATER *Merops apiaster* (biätare)
20 ex Borakalolo 5/1, enstaka Nylsvlei 6/1, allmän i norra Krüger 7-8/1, 10 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Mkuzi 13/1, 1 ex längs vägen 15/1, 2 ex längs vägen 20/1.

BLUE-CHEEKED BEE-EATER *Merops persicus* (grön biätare)
5 ex Mkuzi 13/1, 4 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia och 1 ex S:t Lucia 14/1.

WHITE-FRONTED BEE-EATER *Merops bullockoides*
Allmän i norra Krüger (Pafuri - Punda Maria) 7/1, enstaka i mellersta Krüger 8-9/1.

LITTLE BEE-EATER *Merops pusillus* (fältbiätare)

2 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1.

EUROPEAN ROLLER *Coracias garrulus* (blåkråka)

13 ex längs vägen Pietersburg - Punda Maria 6/1, 15 ex längs vägen Pafuri - Punda Maria 7/1, allmän i norra och mellersta Krüger 8-9/1 (en av de verkliga karaktärsarterna längs vägen), ca 10 ex längs vägen Skukuza - Crocodile Bridge och 2 ex söder Crocodile Bridge 10/1, 1 ex Piet Retief och 2 ex Mkuzi 11/1, 4 ex Mkuzi 12/1, 10 ex längs vägen Mkuzi - S:t Lucia 13/1, 2 ex väster S:t Lucia 14/1, 1 ex Ladysmith 17/1, 2 ex Sandveld 19/1.

PURPLE (RUFIOUS-CROWNED) ROLLER *Coracias naevia* (blek blåkråka)

10 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 2 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1.

LILAC-BREASTED ROLLER *Coracias caudata*

4 ex Borakalolo 5/1, 3 ex längs vägen Pafuri - Punda Maria 7/1, täml allmän i norra och mellersta Krüger 8-9/1 (också en av karaktärsarterna längs vägen, dock i något mindre antal än vanlig blåkråka), ca 10 ex i södra Krüger och 5 ex söder Crocodile Bridge 10/1, 1 ex Mkuzi 11/1, 2 ex Mkuzi 12/1.

BROAD-BILLED ROLLER *Eurystomus glaucurus*

10 ex Pafuri och 2 ex Punda Maria 7/1, 5 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 1 Mkuzi 12/1, 1 ex längs vägen Mkuzi - S:t Lucia 13/1.

RED-BILLED WOOD-HOOPOE *Phoeniculus purpureus*

2 ex mellan Punda Maria och Pafuri 7/1, 4 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1.

GREATER SCIMITARBILL *Rhinopomastus cyanomelas*

4 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Sandveld 19/1.

AFRICAN HOOPOE *Upupa africana* (afrikansk härfågel)

1 ex Satara 9/1, 1 ex söder Skukuza 10/1, 2 ex Oribi Gorge och 1 ex längs vägen 15/1, 1 ex Augrabies Falls 20/1, 1 ex Velddrif och 1 ex Paarl 23/1.

GREATER (BLACK-THROATED) HONEYGUIDE *Indicator indicator*

1 hona Mkuzi 12/1.

LESSER HONEYGUIDE *Indicator minor*

1 ex Xumeni Forest och 1 ex Hella Hella 17/1.

SCALY-THROATED HONEYGUIDE *Indicator variegatus*

1 ex Cape Vidal 14/1.

SOUTHERN GROUND HORNBILL *Bucorvus leadbeateri* (sydlig hornkorp)

3 ex öster Skukuza 9/1, 4 ex längs vägen Skukuza - Crocodile Bridge 10/1.

TRUMPETER HORNBILL *Bucanistes bucinator*

3 ex Pafuri 7/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 5 ex Oribi Gorge 15/1.

CROWNED HORNBILL *Tockus alboterminatus*

2 ex Punda Maria och 4 ex Pafuri 7/1, 1 ex Mahonie Loop 8/1, 1 ex söder Skukuza 10/1, 2 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1, 3 ex Oribi Gorge 15/1.

AFRICAN GREY HORNBILL *Tockus nasutus* (grå hornskata)

2 ex mellan Punda Maria och Pafuri och 4 ex Punda Maria 7/1, ca 10 ex längs vägen 8/1, enstaka längs vägen 9/1.

SOUTHERN YELLOW-BILLED HORNBILL *Tockus leucomelas*

3 ex Borakalolo 5/1, 2 ex mellan Punda Maria och Pafuri och 2 ex Punda Maria 7/1, ca 10 ex längs vägen 8/1, täml allmän mellan Olifants och Skukuza 9/1, ca 10 ex mellan Skukuza och Crocodile Bridge 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 3 ex Sandveld 19/1.

RED-BILLED HORNBILL *Phoeniculus purpureus* (rödnäbbad hornskata)

3 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Punda Maria 7/1, ca 10 ex längs vägen 8/1, enstaka längs vägen 9/1, 1 ex söder Skukuza 10/1.

BLACK-COLLARED BARBET *Lybius torquatus*

2 ex Skukuza 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1, 1 ex Hella Hella 17/1.

WHITE-EARED BARBET *Stactolaema leucotis*

5 ex Mtunzini 14/1.

CRESTED BARBET *Trachyponus vaillantii*

1 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 4 ex mellan Punda Maria och Letaba 8/1, 1 ex Olifants 9/1.

ACACIA PIED BARBET *Tricholaema leucomelas*

1 ex söder Olifants 9/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1, 2 ex Sandveld 19/1, 2 ex Augrabies Falls 20/1, 2 ex Akkerendam och 1 ex Clanwilliam 22/1, 1 ex Velddrif 23/1.

RED-FRONTED TINKER-BARBET *Poganiulus pusillas*

1 ex S:t Lucia 13/1, 1 ex S:t Lucia och 3 ex Mtunzini 14/1. Svår att se, så det gäller att kunna låtet. Detta visas av att arten hörs på en videoinspelning från Mkuzi 12/1, d.v.s. innan vi "fått grepp" på arten.

GOLDEN-RUMPED TINKER-BARBET *Poganiulus bilineatus*

1 ex Bonamanzi 13/1, 1 ex Cape Vidal 14/1.

GROUND WOODPECKER *Geocolaptes olivaceus*

12 ex Sani Pass 16/1, 2 ex Sir Lowry's Pass 24/1.

BEARDED WOODPECKER *Thripias namaquus*

1 ex söder Satara 9/1.

OLIVE WOODPECKER *Mesopicos griseocephalus*

4 ex Oribi Gorge 15/1.

CARDINAL WOODPECKER *Dendropicos fuscescens*

1 ex Pafuri 7/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex S:t Lucia 14/1.

GOLDEN-TAILED WOODPECKER *Campethera abingoni*

1 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 1 ex S:t Lucia 14/1

RED-THROATED WRYNECK *Jynx ruficollis*

1 ex i Rob Guy's trädgård, Underberg 15-17/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1.

FLAPPET LARK *Mirafra rufocinnamomea*

1 ex norr Lower Sabie 9/1, 2 ex Mkuzi 11/1, 4 ex Mkuzi 12/1.

CLAPPER LARK *Mirafra apiata*

1 ex mellan Upington och Pofadder 20/1.

MELODIOUS LARK *Mirafra cheniana*

2 ex Ladysmith 17/1.

BRADFIELD'S LARK *Mirafra naevia*

3 ex Marrick Game Farm 19/1, 1 ex söder Brandvlei 21/1. Beträktades tidigare som en underart av Sabota Lark.

SABOTA LARK *Mirafra sabota*

Enstaka i norra Krüger 7-8/1, allmän i mellersta och södra Krüger 9-10/1, ca 10 ex Mkuzi 12/1.

FAWN-COLOURED LARK *Mirafra africanoides*

1 ex Sandveld 19/1, 1 ex längs vägen mellan Kimberley och Griekwastad 20/1.

RUFOUS-NAPED LARK *Mirafra africana*

2 ex längs vägen 6/1, ca 10 ex längs vägen i östra Transvaal 10/1, 1 ex Hella Hella och 2 ex Ladysmith 17/1, allmän Suikerbosrand 18/1.

KAROO LARK *Certhilauda albescens*

2 ex Eierkop 23/1.

RED LARK *Certhilauda burra*

5 ex Aggenys Red Dunes, sydväst Pofadder 21/1.

KAROO LONG-BILLED LARK *Certhilauda subcoronata*

3 ex sydväst Pofadder och 1 ex mellan Pofadder och Brandvlei 21/1.

AGULHAS LONG-BILLED LARK *Certhilauda brevirostris*

2 ex längs vägen mellan Cape Agulhas och De Hoop 24/1.

EASTERN LONG-BILLED LARK *Certhilauda semitorquata*

4 ex norr Amersfoort 10/1.

SOUTHERN THICK-BILLED (LARGE-BILLED) LARK *Galerida magnirostris*

1 ex Sani Pass 16/1, 7 ex längs vägen mellan Cape Agulhas och De Hoop 24/1.

RED-CAPPED LARK *Calandrella cinerea*

Täml allmän mellan Amersfoort och Wakkerstroom 10/1, 20 ex Wakkerstroom 11/1, 5 ex Ladysmith 17/1, 20 ex Sandveld 19/1, 25 ex Velddrif 23/1.

RUDD'S LARK *Heteromirafra ruddi*

1 ex Wakkerstroom 11/1, efter hårt slit tillsammans med John McAllister. Världens sällsyntaste och mest hotade lärka. Den totala populationen beräknas numera till ca 2000 individer.

BOTHA'S LARK *Spizocorys fringillaris*

3 ex Wakkerstroom 11/1.

PINK-BILLED LARK *Spizocorys conirostris*

3 ex mellan Upington och Pofadder 20/1.

STARK'S LARK *Spizocorys starki*

4 ex öster Pofadder 20/1, 1 ex sydväst Pofadder 21/1.

SPIKE-HEELED LARK *Chersomanes albofasciata*

5 ex Wakkerstroom 11/1, 3 ex Marrick Game Farm 19/1, 15 ex öster Pofadder 20/1, totalt ca 25 ex 21/1.

GREY-BACKED FINCH-LARK *Eremopterix verticalis*

Ca 2000 ex (samt en del småflockar) i ett massivt uppflog (skrämda av en stridsörn) öster Pofadder 20/1, ca 300 ex sydväst Pofadder 21/1.

BLACK-EARED FINCH-LARK *Eremopterix australis*

3 ex sydväst Pofadder 21/1.

RED-BREASTED SWALLOW *Hirundo semirufa*

Enstaka ex norr Brits 5/1, upp till 10 ex dagligen i Krüger 7-10/1.

MOSQUE SWALLOW *Hirundo senegalensis*

10 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 6 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1.

GREATER STRIPED SWALLOW *Hirundo cucullata*

Allmän i större delen av landet, dock inte noterad i Krüger och Mkuzi. Observerad 15 dagar, bl.a. dagligen 16-27/1.

LESSER STRIPED SWALLOW *Hirundo abyssinica*

Observerad dagligen 7-15/1, men ej därefter. Allmän i Krüger, Mkuzi och längs Natalkusten.

SOUTH AFRICAN CLIFF SWALLOW *Hirundo spilodera*

250 ex i två kolonier längs vägen i östra Transvaal 10/1, ca 50 ex Wakkerstroom 11/1, 50 ex Ladysmith 17/1, 50 ex norr Calvinia 21/1.

EUROPEAN (BARN) SWALLOW *Hirundo rustica* (ladusvala)

Allmän i hela landet, noterad dagligen. Vid infarten till Sandveld noterades 10000-tals ladusvalor på ledningar och i luften, strax innan skymningen 18/1.

PEARL-BREASTED SWALLOW *Hirundo dimidiata*

6 ex De Hoop 24/1.

WHITE-THROATED SWALLOW *Hirundo albigularis*

20 ex Underberg 16/1, ca 10 ex öster Calvinia 21/1, 10 ex längs vägen 22/1, 25 ex West Coast NP och 10 ex Paarl 23/1, enstaka i Agulhas-området 24/1.

BLUE SWALLOW *Hirundo atrocaerulea*

3 ex, varav 1 magnifik hane med stjärtspröt, Hella Hella 17/1. Totalt finns ca 50 par i Sydafrika och Swaziland.

BLACK SAW-WING SWALLOW *Psalidoprocne holomelas*

15 ex Oribi Gorge 15/1.

BANDED MARTIN *Riparia cincta*

30 ex norr Wakkerstroom 10/1, ca 100 ex Wakkerstroom 11/1, 10 ex Underberg 16/1.

BROWN-THROATED MARTIN *Riparia paludicola* (brunstrupig backsvala)

20 ex Kwa-Zanele 10/1, 5 ex Underberg 16/1, 10 ex The Swamp 17/1, 20 ex Sandveld 19/1, 25 ex Paarl 23/1.

SAND MARTIN *Riparia riparia* (backsvala)

5 ex Kwa-Zanele 10/1, 3 ex Sandveld 18/1, 50 ex Sandveld 19/1.

ROCK MARTIN *Ptyonoprogne fuligula* (blek klippsvala/afrikansk klippsvala)

Täml allmän, noterad i varierande antal under 12 dagar 7-26/1.

FORK-TAILED DRONGO *Dicrurus adsimilis*

Sedd dagligen 5-17/1, därefter endast 3 ex Sandveld 19/1. Allmän och en av karaktärsfågeln i Krüger och Mkuzi. Vanlig även längs Natalkusten.

SQUARE-TAILED DRONGO *Dicrurus ludwigi*

1 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 4 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Mkuzi 13/1, 2 ex Cape Vidal och 1 ex S:t Lucia 14/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1.

BLACK CUCKOO-SHRIKE *Campephaga flava*

1 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1.

GREY CUCKOO-SHRIKE *Campephaga caesia*

3 ex Oribi Gorge 15/1.

EUROPEAN GOLDEN ORIOLE *Oriolus oriolus* (sommargylling)

2 ex söder Olifants 9/1, 1 ex söder Skukuza 10/1, 1 ex Mkuzi 13/1.

BLACK-HEADED ORIOLE *Oriolus larvatus*

1 ex Punda Maria 7/1, 1 ex öster Elands Waterfall 10/1, 2 ex Mkuzi 13/1, 3 ex Oribi Gorge 15/1.

WHITE-NECKED RAVEN *Corvus albicollis*

7 ex väster Oribi Gorge 15/1, 25 ex väster Calvinia 22/1, 1 ex norr De Hoop 24/1.

PIED CROW *Corvus albus* (svartvit kråka)

2 ex Pretoria och 1 ex Brits 5/1, 50 ex Mtunzini 14/1, därefter sedd dagligen 17-27/1, vissa dagar i ganska goda antal (100 ex 20/1, täml allmän 22-24/1).

BLACK CROW (CAPE ROOK) *Corvus capensis*

5 ex Wakkerstroom 10/1, 1 ex Wakkerstroom 11/1, därefter noterad under 10 dagar 15-26/1, flest kring Underberg 16/1 och längs vägen 22/1 (täml allmän).

HOUSE CROW *Corvus splendens* (huskråka)

Resans sista nya resart, 8 ex Cape Town International Airport 27/1. Arten har likt i Eilat vandrat in från Indiska halvön, sannolikt med hjälp av båttransporter. Den har nu etablerat populationer i Durban och Kapstaden.

ASHY TIT *Parus cinarascens*

3 ex Augrabies Falls 20/1.

SOUTHERN GREY TIT *Parus afer*

2 ex Sani Pass 16/1.

SOUTHERN BLACK TIT *Parus niger*

1 ex Mahonie Loop och 1 ex längs vägen mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 3 ex Mkuzi 12/1, 4 ex Bonamanzi 13/1.

GREY PENDULINE TIT *Anthoscopus caroli*

6 ex Mahonie Loop 8/1. Sågs i en blandflock med Yellow-bellied Eremomela.

CAPE PENDULINE TIT *Anthoscopus minutus*

1 ex Akkerendam 22/1.

ARROW-MARKED BABBLER *Turdoides jardeneii*

5 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 8 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi, 1 ex Shingwedzi och 10 ex Olifants 8/1, enstaka ex Olifants 9/1.

CAPE BULBUL *Pycnonotus capensis*

Täml allmän i sydvästra Kap, noterad dagligen 22-27/1.

RED-EYED BULBUL *Pycnonotus nigricans*

15 ex Suikerbosrand 18/1, totalt ca 10 ex 19/1, allmän Augrabies Falls 20/1.

BLACKEYED (COMMON) BULBUL *Pycnonotus barbatus* (trädgårdsbulbyl)

Sedd dagligen 5-17/1 och då allmän i de flesta besökta biotoper. Denna och de två föregående arterna, som utseendemässigt är ganska lika, har på ett snyggt sätt delat upp Sydafrika mellan sig. Deras utbredningsområden överlappar knappt, men däremot täcker de tillsammans upp hela landets yta.

TERRESTRIAL BULBUL *Phyllastrephus terrestris*

6 ex Mkuzi 12/1, 4 ex Mkuzi 13/1, 2 ex Cape Vidal, 2 ex S:t Lucia och 1 ex Mtunzini 14/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1.

BUSH BLACKCAP *Lioptilus nigricapillus*

4 ex Sani Pass 16/1, 1 ex Xumeni Forest 17/1.

SOMBRE BULBUL *Andropadus importunus*

Täml allmän Mkuzi 12-13/1, enstaka ex Bonamanzi 13/1, totalt ca 10 ex 14/1, 5 ex Oribi Gorge 15/1, 10 ex Xumeni Forest 17/1, 1 ex Die Hel och 10 ex Kirstenbosch 25/1.

YELLOW-BELLIED BULBUL *Chlorocichla flaviventris*

1 ex Pafuri och 1 ex Punda Maria 7/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Mkuzi 13/1, 1 ex Cape Vidal och 3 ex S:t Lucia 14/1.

YELLOW-SPOTTED NICATOR *Nicator gularis*

2 ex Mkuzi 13/1.

ORANGE GROUND-THRUSH *Zoothera gurneyi*

1 ex Xumeni Forest 17/1.

(SOUTHERN) OLIVE THRUSH *Turdus olivaceus*

Sedd i små antal under 11 dagar 6-25/1.

KURRICHANE THRUSH *Turdus libonyana*

1 ex Punda Maria 6/1, 1 ex Skukuza 10/1.

GROUNDSCRAPER THRUSH *Turdus litsitsirupa*
2 ex Warmbad 6/1, 2 ex Sandveld 18/1, 3 ex Sandveld 19/1.

SHORT-TOED ROCK THRUSH *Monticola brevipes*
1 hane Langberg 20/1.

CAPE ROCK THRUSH *Monticola rupestris*
5 ex Sani Pass 16/1.

SENTINEL ROCK THRUSH *Monticola explorator*
1 par Wakkerstroom 11/1, 15 ex Sani Pass 16/1.

CAPE ROCKJUMPER *Chaetops frenatus*
4 ex Sir Lowry's Pass 24/1.

ORANGE-BREASTED ROCKJUMPER *Chaetops aurantius*
10 ex Sani Pass 16/1.

FAMILIAR CHAT *Cercomela familiaris*
4 ex Sani Pass 16/1, 1 ex Hella Hella 17/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1, 4 ex Augrabies Falls och 2 ex öster Pofadder 20/1, 5 ex mellan Pofadder och Brandvlei 21/1.

SICKLE-WINGED CHAT *Cercomela sinuata*
10 ex Sani Pass 16/1, 2 ex öster Pofadder 20/1.

TRACTRAC CHAT *Cercomela tractrac*
6 ex Pofadder - Brandvlei - Calvinia 21/1.

KAROO CHAT *Cercomela schlegelii*
3 ex Pofadder - Brandvlei - Calvinia 21/1.

MOUNTAIN CHAT (WHEATEAR) *Oenanthe monticola*
2 ex sydväst Underberg och 6 ex Sani Pass 16/1, 10 ex Suikerbosrand 18/1, 2 ex Langberg och ca 10 ex längs vägen 20/1, ca 15 ex Pofadder - Brandvlei - Calvinia 21/1, enstaka i Karoo 22/1.

CAPPED WHEATEAR *Oenanthe pileata*
5 ex Marrick Game Farm 19/1, 4 ex längs vägen 23/1, 10 ex norr De Hoop 24/1.

BUFF-STREAKED CHAT *Oenanthe bifasciata*
1 ex Wakkerstroom 11/1.

STONECHAT *Saxicola torquata* (svarthakad buskskvätta)
Täml allmän i öppna, frodiga biotoper. Observerad under 11 dagar 5-24/1, saknades i Krüger och Mkuzi.

SOUTHERN ANT-EATING CHAT *Myrmecocichla formicivora*
Allmän i östra Transvaal 10-11/1 och även i norr och nordväst 18-21/1.

MOCKING (CLIFF-)CHAT *Thamnolaea cinnamomeiventris*
1 par vid rastplatsen, Suikerbosrand 18/1.

CHORISTER ROBIN *Cossypha dichroa*
2 ex Oribi Gorge 15/1.

NATAL ROBIN *Cossypha natalensis*
2 ex Mkuzi 13/1, 1 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1.

HEUGLIN'S ROBIN *Cossypha heuglini*
1 ex Pafuri 7/1, 1 ex Mkuzi 13/1.

CAPE ROBIN *Cossypha caffra*
Lokalt täml allmän, sedd i växlande antal 15-17/1 samt 23-26/1, därtill 2 ex Augrabies Falls 20/1.

AFRICAN WHITE-THROATED ROBIN *Cossypha humeralis*

1 ex Punda Maria 7/1.

BROWN ROBIN *Erythropygia signata*

3 ex Cape Vidal 14/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1.

EASTERN BEARDED ROBIN *Erythropygia quadrivirgata*

1 ex Punda Maria 6/1, 1 ex Punda Maria 7/1.

WHITE-BROWED ROBIN *Erythropygia leucophrys*

1 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Olifants 9/1.

KALAHARI ROBIN *Erythropygia paena*

3 ex Suikerbosrand 18/1, 5 ex Sandveld, 2 ex Marrick Game Farm och 2 ex Langberg 19/1, 2 ex längs vägen 20/1.

KAROO ROBIN *Erythropygia coryphoeus*

1 ex Augrabies Falls 20/1, 1 ex norr Calvinia 21/1, totalt 10 ex 22/1, 2 ex längs vägen 23/1.

STARRED ROBIN *Pogonochla stellata*

2 ex Oribi Gorge 15/1.

ICTERINE WARBLER *Hippolais icterina* (härmsångare)

1 ex Punda Maria 7/1.

GARDEN WARBLER *Sylvia borin* (trädgårdssångare)

1 ex söder Skukuza 10/1.

YELLOW-THROATED WARBLER *Phylloscopus ruficapillus*

4 ex Xumeni Forest 17/1.

WILLOW WARBLER *Phylloscopus trochilus* (lövsångare)

Observerad under 11 dagar 5-20/1, talrikast i Krüger och Mkuzi.

GREEN-CAPPED EREMOMELA *Eremomela scotops*

1 ex Skukuza 10/1.

BURNT-NECKED EREMOMELA *Eremomela usticollis*

1 ex Borakalolo 5/1.

YELLOW-BELLIED EREMOMELA *Eremomela icteropygialis*

2 ex Mahonie Loop 8/1 tillsammans med en mindre flock Grey Penduline Tit. Arten finns också i öknen i väster, men vi såg inga där.

KAROO EREMOMELA *Eremomela gregalis*

10 ex Eierkop 23/1.

KNYSNA WARBLER *Bradypterus sylvaticus*

2 ex Die Hel 25/1. Svårt skulkande art som vi lyckades få se fint på marken.

VICTORIN´S WARBLER *Bradypterus victorini*

1 ex Sir Lowry´s Pass 24/1.

BARRATT´S WARBLER *Bradypterus barratti*

3 ex Sani Pass 16/1, 2 ex Xumeni Forest 17/1.

AFRICAN SEDGE WARBLER *Bradypterus baboecala*

2 ex Wakkerstroom 11/1, 1 ex Franklin Marsh 15/1, 1 ex Underberg 16/1, 4 ex The Swamp 17/1, 1 ex West Coast NP och 3 ex Paarl 23/1.

BROAD-TAILED WARBLER *Schoenicola brevirostris*

1 ex The Swamp 17/1.

CAPE REED WARBLER *Acrocephalus gracilirostris*
2 ex Franklin Marsh 15/1, 2 ex Underberg 16/1, 5 ex Paarl 23/1.

AFRICAN MARSH WARBLER *Acrocephalus baeticatus*
2 ex Nylsvlei 6/1, 4 ex Wakkerstroom 11/1, 2 ex Franklin Marsh 16/1.

AFRICAN YELLOW WARBLER *Chloropeta natalensis*
1 ex Underberg 16/1, 1 ex The Swamp 17/1.

GRASSBIRD *Sphenoeacus afer*
5 ex Sani Pass 16/1, 1 ex längs vägen 22/1, 3 ex längs vägen 23/1, 2 ex Sir Lowry's Pass 24/1, 1 ex Kirstenbosch och 2 ex Simonstown 25/1.

CINNAMON-BREASTED WARBLER *Euryptila subcinnamomea*
1 ex Akkerendam 22/1.

AFRICAN BARRED WARBLER *Calamonastes fasciolata*
1 ex Nylsvlei 6/1.

GREY-BACKED BLEATING WARBLER (CAMAROPTERA) *Camaroptera brevicaudata*
5 ex Borakalolo 5/1, 20 ex Pafuri 7/1.

GREEN-BACKED BLEATING WARBLER (CAMAROPTERA) *Camaroptera brachyura*
Allmän Mkuzi 12-13/1, allmän vid Natalkusten 14/1.

LAYARD'S TITBABBLER *Parisoma layardi*
3 ex Sani Pass 16/1, 2 ex Akkerendam 22/1.

COMMON (CHESTNUT-VENTED) TITBABBLER *Parisoma subcaeruleum*
3 ex Borakalolo 5/1, 1 ex norr Pietersburg 6/1, 2 ex Suikerbosrand 18/1, totalt 20 ex på olika lokaler 19/1, 5 ex längs vägen och 10 ex Augrabies Falls 20/1.

LONG-BILLED CROMBEC *Sylvietta rufescens*
1 ex Nylsvlei och 1 ex norr Pietersburg 6/1, 2 ex Pafuri 7/1, 2 ex Orpen Dam 9/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1.

YELLOW-BREASTED APALIS *Apalis flavida*
1 ex Pafuri 7/1, 1 ex mellan Lower Sabie och Skukuza 9/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 3 ex S:t Lucia 14/1.

RUDD'S APALIS *Apalis ruddi*
10 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Mkuzi 13/1.

BAR-THROATED APALIS *Apalis thoracica*
1 ex Pafuri 7/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 2 ex S:t Lucia 14/1, 10 ex Oribi Gorge 15/1, 2 ex Xumeni Forest 17/1.

FAN-TAILED CISTICOLA *Cisticola juncidis* (grässångare)
Flera ex längs vägen 5/1, täml allmän Nylsvlei 6/1, 10 ex Ladysmith 17/1, allmän Suikerbosrand 18/1.

DESERT CISTICOLA *Cisticola aridulus*
5 ex Sandveld och 1 ex Marrick Game Farm 19/1.

CLOUD CISTICOLA *Cisticola textrix*
3 ex Ladysmith 17/1 och 5 ex Suikerbosrand 18/1.

AYRES' (WING-SNAPPING) CISTICOLA *Cisticola ayresii*
Allmän Wakkerstroom 11/1, 10 ex Suikerbosrand 18/1.

PALE-CROWNED CISTICOLA *Cisticola brunnescens*
2 ex Wakkerstroom 10/1.

NEDDICKY (CISTICOLA) *Cisticola fulvicapillus*

1 ex Pafuri 7/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1, 1 ex Xumeni Forest 17/1, 5 ex Karooport 23/1.

GREY-BACKED CISTICOLA *Cisticola subruficapillus*

20 ex Akkerendam 22/1, 5 ex West Coast NP och 2 ex Eierkop 23/1.

WAILING CISTICOLA *Cisticola lais*

4 ex Sani Pass 16/1.

TINKLING CISTICOLA *Cisticola rufilatus*

1 ex Suikerbosrand 18/1.

CROAKING CISTICOLA *Cisticola natalensis*

1 ex Hella Hella 17/1.

RATTLING CISTICOLA *Cisticola chiniana*

Allmän i Krüger 7-10/1 och i Mkuzi 12-13/1, 5 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1, 15 ex Sandveld 19/1.

LAZY CISTICOLA *Cisticola aberrans*

1 ex Mahonie Loop 7/1.

BLACK-BACKED (WINDING) CISTICOLA *Cisticola galactotes*

1 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1.

LEVAILLANT'S CISTICOLA *Cisticola tinniens*

Täml allmän östra Transvaal 10/1, 10 ex Wakkerstroom 11/1, 10 ex Underberg 16/1, 10 ex The Swamp 17/1, allmän Suikerbosrand 18/1.

REDFACED CISTICOLA *Cisticola erythrops*

2 ex i vassen nedanför restaurangen, Skukuza 10/1.

RUFOUS-EARED WARBLER *Malcorus pectoralis*

7 ex öster Pofadder 20/1, 5 ex Pofadder - Brandvlei 21/1.

NAMAQUA WARBLER *Phragmacia substriata*

2 ex Augrabies Falls 20/1.

DRAKENSBERG PRINIA *Prinia hypoxantha*

15 ex Sani Pass 16/1.

KAROO (SPOTTED) PRINIA *Prinia maculosa*

10 ex Akkerendam 22/1, små antal dagligen 23-25/1.

TAWNY-FLANKED PRINIA *Prinia subflava*

Allmän i Borakalolo 5/1 och Krüger 7-10/1, 10 ex Mkuzi 12/1, 5 ex Mkuzi och 4 ex Bonamanzi 13/1, enstaka vid Natalkusten 14/1, 2 ex Hella Hella 17/1, 3 ex Suikerbosrand 18/1, 4 ex Sandveld 19/1.

BLACK-CHESTED PRINIA *Prinia flavicans*

5 ex Suikerbosrand 18/1, 10 ex Sandveld och även observerad vid Marrick Game Farm och Langberg 19/1, 3 ex Augrabies Falls och 5 ex längs vägen 20/1.

FAN-TAILED (LEAD-COLOURED) FLYCATCHER *Myioparus plumbeus*

1 ex Olifants 9/1.

FAIRY FLYCATCHER *Stenostira scita*

5 ex Sani Pass 16/1, 4 ex Akkerendam 22/1.

FISCAL FLYCATCHER *Sigelus silens*

5 ex Suikerbosrand och 1 ex Sandveld 18/1, 4 ex Sandveld och 2 ex Langberg 19/1.

DUSKY FLYCATCHER *Muscicapa adusta*

5 ex Pafuri 7/1, 5 ex öster Skukuza 9/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 4 ex Oribi Gorge 15/1.

BLUE-GREY (ASHY) FLYCATCHER *Muscicapa caerulescens*

2 ex Pafuri 7/1, 3 ex Mtunzini 14/1.

SPOTTED FLYCATCHER *Muscicapa striata* (grå flugsnappare)

Upp till 10 ex dagligen 5-9/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Mkuzi och 1 ex Bonamanzi 13/1, 2 ex Sandveld 19/1.

SOUTHERN BLACK FLYCATCHER *Melaenornis pammelaina*

5 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Punda Maria 7/1, 2 ex Crocodile Bridge 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1.

CHAT FLYCATCHER *Melaenornis infuscatus*

5 ex öster Pofadder 20/1, ca 25 ex Pofadder - Brandvlei - Calvinia 21/1.

MARICO FLYCATCHER *Melaenornis mariquensis*

3 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Warmbad 6/1, 2 ex Sandveld 19/1.

MOUSE-COLOURED (PALE) FLYCATCHER *Melaenornis pallidus*

5 ex Mkuzi 12/1.

AFRICAN PARADISE FLYCATCHER *Terpsiphone viridis* (afrikansk paradisflugsnappare)

1 ex norr Brits 5/1, 3 ex Punda Maria 7/1, 4 ex Punda Maria 8/1, 4 ex Olifants 9/1, 2 ex Bonamanzi 13/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1, 2 ex Sani Pass 16/1.

PRIRIT BATIS *Batis pririt*

4 ex Sandveld, 1 ex Marrick Game Farm och 2 ex Langberg 19/1, 2 ex söder Upington och 2 ex Augrabies Falls 20/1.

CAPE BATIS *Batis capensis*

1 ex Oribi Gorge 15/1, 4 ex Xumeni Forest 17/1.

WOODWARD'S BATIS *Batis fratrum*

5 ex Cape Vidal 14/1.

CHINSPOT BATIS *Batis molitor*

Totalt 18 ex i Krüger 7-10/1, 4 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Bonamanzi 13/1.

WATTLE-EYED FLYCATCHER *Platysteira peltata*

5 ex Pafuri 7/1.

CAPE WAGTAIL *Motacilla capensis*

Saknades i viltreservaten i nordost och därför bara 4 observationsdagar 5-15/1. Allmän och dagligen observerad fr.o.m. 16/1.

AFRICAN PIED WAGTAIL *Motacilla aguimp*

4 ex Pafuri 7/1, 4 ex Engelhard Dam 8/1, 2 ex söder Olifants, 1 ex Sunset Dam och 1 ex öster Skukuza 9/1, 2 ex öster Elands Waterfall 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 2 ex S:t Lucia 13/1, 3 ex S:t Lucia 14/1.

LONG-TAILED (MOUNTAIN) WAGTAIL *Motacilla dara*

3 ex Oribi Gorge 15/1.

MOUNTAIN PIPIT *Anthus hoeschi*

2 ex på ca 3200 meters höjd, Sani Pass 16/1.

LONG-BILLED PIPIT *Anthus similis* (långnäbbad piplärka)

1 ex Langberg 19/1, 2 ex Langberg 20/1.

BUFFY PIPIT *Anthus vaalensis*

1 ex Marrick Game Farm 19/1.

GRASSVELD PIPIT *Anthus cinnamomeus*

Observerad 9 dagar 9-24/1. Allmän i östra Transvaal 10-11/1 samt vid Ladysmith 17/1, i övrigt smärre antal. Obsarna väl spridda från Krüger till sydvästra Kap.

AFRICAN ROCK PIPIT *Anthus crenatus*

2 ex Sani Pass 16/1.

YELLOW-BREASTED PIPIT *Hemimacronyx chloris*

3 ex Wakkerstroom 11/1.

YELLOW-THROATED LONGCLAW *Macronyx croceus*

1 ex mellan Satara och Lower Sabie 9/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex S:t Lucia 13/1, 2 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1.

ORANGE-THROATED LONGCLAW *Macronyx capensis*

10 ex längs vägen i östra Transvaal 10/1, 10 ex Wakkerstroom 11/1, 2 ex Ladysmith 17/1, 5 ex Suikerbosrand 18/1.

RED-BACKED SHRIKE *Lanius collurio* (törnskata)

4 ex Borakalolo 5/1, 4 ex Nylsvlei 6/1, allmän i Krüger 7-10/1 och Mkuzi 12-13/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1. En karaktärsart längs vägarna i Krüger.

FISCAL SHRIKE (COMMON FISCAL) *Lanius collaris*

Allmän. Observerad 19 dagar 5-27/1. Saknades i Krüger och Mkuzi men i övrigt sågs den nästan överallt. Föredrar öppnare marker och ses huvudsakligen längs vägen. Telefonträdarnas härskare.

LESSER GREY SHRIKE *Lanius minor* (svartpannad törnskata)

1 ex norr Pietersburg 6/1, 2 ex öster Kimberley och 1 2k Marrick Game Farm 19/1.

CRIMSON-BREASTED SHRIKE *Laniarius atrococcineus*

1 ex Borakalolo 5/1, 5 ex Sandveld och 1 ex Marrick Game Farm 19/1.

SOUTHERN BOUBOU *Laniarius ferrugineus*

1 ex öster Brits 5/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 1 ex Cape Vidal och 1 ex S:t Lucia 14/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1, 2 ex Xumeni Forest 17/1, 2 ex De Mond 24/1. Skulkare!

TROPICAL BOUBOU *Laniarius aethiopicus*

3 ex Pafuri 7/1.

MAGPIE (LONG-TAILED) SHRIKE *Corvinella melanoleuca*

2 ex norr Brits och 15 ex Borakalolo 5/1, 5 ex Nylsvlei 6/1, totalt 26 ex i Krüger 7-10/1.

SOUTHERN WHITE-CROWNED SHRIKE *Eurocephalus anguitimens*

1 ex norr Pietersburg 6/1, 2 ex söder Olifants 9/1, 2 ex mellan Skukuza och Crocodile Bridge 10/1.

BLACK-CROWNED TCHAGRA *Tchagra senegala* (svartkronad busktörnskata)

1 ex Nylsvlei 6/1, 2 ex Mahonie Loop 8/1.

THREE-STREAKED TCHAGRA *Tchagra australis*

5 ex Mahonie Loop och 2 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 2 ex söder Olifants 9/1, 2 ex söder Skukuza 10/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 2 ex Sandveld 19/1.

SOUTHERN TCHAGRA *Tchagra tchagra*

1 ex De Hoop 24/1.

GREY-HEADED BUSH-SHRIKE *Malaconotus blanchoti*

3 ex Pafuri 7/1, 1 ex öster Skukuza 9/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Cape Vidal och 1 ex S:t Lucia 14/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1.

BOKMAKIERIE (BUSH-SHRIKE) *Telephorus zeylonus*

5 ex Wakkerstroom 11/1, därefter observerad i smärre antal under 10 dagar 15-27/1.

GORGEOUS BUSH-SHRIKE *Telephorus quadricolor*

5 ex Mkuzi 12/1, 6 ex Mkuzi 13/1, 1 ex S:t Lucia 14/1.

OLIVE BUSH-SHRIKE *Telephorus olivaceus*

1 ex Xumeni Forest 17/1.

ORANGE-BREASTED BUSH-SHRIKE *Telephorus sulfureopectus*

1 ex Shingwedzi 8/1, 1 ex Crocodile Bridge 10/1, 1 ex Mkuzi 12/1.

BLACK-BACKED PUFFBACK *Dryoscopus cubla*

4 ex Pafuri och 1 ex Punda Maria 7/1, 10 ex Mahonie Loop 8/1, 4 ex Mkuzi 12/1, 3 ex Mkuzi 13/1, 1 ex Cape Vidal och 2 ex S:t Lucia 14/1, 5 ex Oribi Gorge 15/1, 2 ex Xumeni Forest 17/1.

BRUBRU *Nilaus afer*

1 ex Pafuri 7/1, 1 ex mellan Shingwedzi och Letaba 8/1.

WHITE HELMET-SHRIKE *Prionops plumatus*

6 ex Pafuri och 3 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 5 ex söder Skukuza 10/1, 4 ex Mkuzi 12/1.

GREATER BLUE-EARED (GLOSSY) STARLING *Lamprotornis chalybaeus*

Täml allmän i Krüger 7-9/1, ej observerad därefter.

(CAPE) GLOSSY STARLING *Lamprotornis nitens*

Tämligen allmän. Observerad 17 dagar 5-24/1. Trots sitt namn klart ovanligast i sydvästra Kap med endast enstaka ex 23-24/1.

BURCHELL'S STARLING *Lamprotornis australis*

30 ex Borakalolo 5/1, lokalt täml allmän i mellersta Krüger, framför allt kring Satara 9/1.

MEVES' LONG-TAILED STARLING *Lamprotornis mevesii*

10 ex Pafuri 7/1. Knuten till "riverine forest", finns i Sydafrika bara allra längst upp i nordost.

BLACK-BELLIED STARLING *Lamprotornis corruscus*

6 ex Mkuzi 12/1, 15 ex Mkuzi 13/1 (bl.a. en häckning vid stranden nedanför rastplatsen, Nsumo Pan), 2 ex Oribi Gorge 15/1.

PLUM-COLOURED (AMETHYST) STARLING *Cinnyricinclus leucogaster*

I Krüger noterad enligt följande: 14 ex 7/1, allmän 8/1, 10 ex 9/1 och 10 ex 10/1. Därefter 10 ex Mkuzi 11/1, 20 ex Mkuzi 12/1 och 10 ex Mkuzi 13/1.

PALE-WINGED STARLING *Onychognathus nabaouroup*

10 ex Augrabies Falls 20/1, 10 ex Akkerendam 22/1.

RED-WINGED STARLING *Onychognathus morio*

Ca 10 ex mellan Punda Maria och Olifants 8/1, enstaka ex Olifants 9/1, enstaka ex Skukuza 10/1, allmän Wakkerstroom 10-11/1, 2 ex längs vägen 13/1, 25 ex Underberg - Sani Pass 16/1, 10 ex Underberg 17/1, täml allmän i sydväst 23-27/1.

INDIAN (COMMON) MYNAH *Acridotheres tristis* (brun majna)

Allmän Johannesburg - Pretoria 5/1, 10 ex Wakkerstroom 11/1, totalt 65 ex under 4 dagar 14-18/1. Har vandrat in från Indiska subkontinenten, troligtvis på samma sätt som House Crow. Verkar sprida sig snabbt.

EUROPEAN STARLING *Sturnus vulgaris* (stare)

Täml allmän i sydvästra Kap 23-27/1. Ursprungligen inplanterad från Europa.

WATTLED STARLING *Creatophora cinerea*

100 ex mellan Olifants och Satara 9/1, 3 ex söder Skukuza 10/1, 50 ex Sandveld 19/1, 30 ex längs vägen 20/1, 40 ex De Hoop 24/1.

PIED STARLING *Spreo bicolor*

Allmän Wakkerstroom 11/1. Täml allmän, sedd i hyggliga antal främst längs vägen 15-18/1 och åter 22-24/1.

RED-BILLED OXPECKER *Buphagus erythrorhynchus*

5 ex Borakalolo 5/1 (bl.a. på giraff), 2 ex Pafuri 7/1, 1 ex norr Olifants 8/1, 1 ex söder Skukuza 10/1, 3 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1.

CAPE SUGARBIRD *Promerops cafer*

2 ex Sir Lowry's Pass 24/1, 10 ex Kirstenbosch och 3 ex Simonstown 25/1.

GURNEY'S SUGARBIRD *Promerops gurneyi*

4 ex Sani Pass 16/1.

MALACHITE SUNBIRD *Nectarinia famosa*

1 ex Wakkerstroom (i John McAllisters trädgård) 11/1, 7 ex Sani Pass och 2 ex Underberg 16/1, 2 ex Underberg 17/1, 1 ex De Mond 24/1.

ORANGE-BREASTED SUNBIRD *Nectarinia violacea*

7 ex Sir Lowry's Pass 24/1, 10 ex Kirstenbosch 25/1.

SCARLET-CHESTED SUNBIRD *Nectarinia senegalensis*

1 ex Bonamanzi 13/1, 1 ex Oribi Gorge 15/1.

BLACK (AMETHYST) SUNBIRD *Nectarinia amethystina*

4 ex Oribi Gorge 15/1, 5 ex Underberg och 2 ex Sani Pass 16/1, 5 ex Underberg 17/1. Rob Guy har en foderautomat för solfåglar i trädgården och detta var arten som dominerade där.

WHITE-BELLIED SUNBIRD *Nectarinia talatala*

10 ex Mkuzi 12/1, 5 ex Mkuzi 13/1.

GREY SUNBIRD *Nectarinia veroxii*

3 ex Oribi Gorge 15/1.

(EASTERN) OLIVE SUNBIRD *Nectarinia olivacea*

2 ex S:t Lucia 14/1.

DUSKY SUNBIRD *Nectarinia fusca*

2 ex söder Upington och 10 ex Augrabies Falls 20/1.

GREATER DOUBLE-COLLARED SUNBIRD *Nectarinia afra*

1 hona Underberg 16/1, 1 hane och 1 hona Underberg 17/1. Även dessa sågs på Rob Guys foderautomat (se Black Sunbird).

LESSER DOUBLE-COLLARED SUNBIRD *Nectarinia chalybea*

1 hane Xumeni Forest 17/1, 2 ex Velddrif och 2 ex längs vägen 23/1, 1 ex De Mond 24/1, 4 ex Kirstenbosch 24/1, 2 ex Kaphalvön 25/1.

MARICO SUNBIRD *Nectarinia mariquensis*

1 ex Olifants 9/1, 1 ex Crocodile Bridge 10/1.

NEERGAARD'S SUNBIRD *Nectarinia neergaardi*

2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1. En endem med mycket begränsat urbredningsområde. Samtliga våra obsar var vid parkeringen till Kubube Hide.

PURPLE-BANDED SUNBIRD *Nectarinia bifasciata*

2 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Bonamanzi 13/1.

COLLARED SUNBIRD *Anthreptes collaris*

1 ex norr Pietersburg 6/1, 2 ex Pafuri och 5 ex Punda Maria 7/1, 1 ex Mkuzi 13/1, 1 ex S:t Lucia, 1 ex Cape Vidal och 1 ex Mtunzini 14/1, 10 ex Oribi Gorge 15/1

CAPE WHITE-EYE *Zosterops pallidus*

Allmän utom i nordost, observerades ej i Krüger och Mkuzi. 4 ex Borakalolo 5/1, därefter observerad dagligen 14-27/1 utom 21/1, då vi var i öknen. Arten består av tre distinkta raser. "Eastern White-eye" som finns i östra

Sydafrika (obsad t.o.m. 17/1), "Pale White-eye" (18-20/1) i norra och nordvästra samt "Cape White-eye" (22-27/1) i sydväst. Den östliga rasen, som är gul på hela undersidan, kan förväxlas med Yellow White-eye (*Z.senegalensis*).

HOUSE SPARROW *Passer domesticus* (gråsparv)

Lokalt allmän. Observerad i varierande antal 15 dagar 5-24/1.

GREAT SPARROW *Passer motitensis*

1 ex Borakalolo 5/1.

CAPE SPARROW *Passer melanurus*

Observerades ej i Krüger (där det däremot huserade gråsparv på camperna) eller Mkuzi. I övrigt noterad 16 dagar 5-27/1, bl.a. dagligen från 15/1. Betydligt vanligare än gråsparv i väster.

SOUTHERN GREY-HEADED SPARROW *Passer diffusus*

1 ex Borakalolo 5/1, allmän i Krüger 7-10/1, 10 ex Underberg och 2 ex Sani Pass 16/1, 10 ex Underberg 17/1, 5 ex Sandveld 19/1.

YELLOW-THROATED SPARROW *Petronia superciliaris*

4 ex Punda Maria 7/1, 3 ex söder Skukuza 10/1, 10 ex Mkuzi 12/1.

RED-BILLED BUFFALO WEAVER *Bubalornis niger*

2 ex Satara och 5 ex Sunset Dam 9/1. Häckar i risbon (påminner om skatbon) på båda dessa platser.

WHITE-BROWED SPARROW-WEAVER *Plocepasser mahali*

2 ex Borakalolo 5/1, 4 ex Nylsvlei och 2 ex Pietersburg 6/1, 4 ex Suikerbosrand 18/1, 1 ex öster Kimberley 19/1.

THICK-BILLED WEAVER *Amblyospiza albifrons*

1 par Engelhard Dam 8/1, 1 hane Mkuzi (vid östra fågeltornet, Nsumo Pan) 12-13/1, 1 par Oribi Gorge 15/1.

SOCIABLE WEAVER *Philetairus socius*

500 ex Sandveld 19/1, allmän längs vägen 20-21/1. Häckar i kolonier i jättelika bon i träd, på telefonstolpar m.m. Ibland är bona för stora, och man ser en del stolpar som givit efter för boets tyngd. Pygmy Falcon är ibland hyresgäst hos socialvävarna.

FOREST WEAVER *Ploceus bicolor*

5 ex Mkuzi 12/1, 5 ex Mkuzi 13/1, 4 ex Cape Vidal, 2 ex S:t Lucia och 1 ex Mtunzini 14/1, 10 ex Oribi Gorge 15/1.

SPOTTED-BACKED (VILLAGE) WEAVER *Ploceus cucullatus* (byvävare)

Flera stora kolonier mellan Lower Sabie och Skukuza 9/1, kolonihäckare Skukuza 10/1, 2 ex Wakkerstroom 11/1.

SOUTHERN (VITELLINE) MASKED WEAVER *Ploceus velatus*

Allmän Borakalolo 5/1, kolonihäckare Skukuza och öster Elands Waterfall 10/1, allmän Wakkerstroom 11/1, tämligen allmän Mkuzi och Natalkusten 12-14/1, sedd dagligen i varierande antal 18-23/1.

LESSER MASKED WEAVER *Ploceus intermedius*

Observerad i varierande antal i Krüger 7-9/1, bl.a. häckande i stort antal vid restaurangen på Lower Sabie camp. Därefter 20 ex Mkuzi 12/1.

SPECTACLED WEAVER *Ploceus ocularis*

6 ex Pafuri 7/1, 25 ex Satara och 25 ex Lower Sabie 9/1, 5 ex söder Skukuza 10/1, 10 ex Oribi Gorge 15/1.

SOUTHERN BROWN-THROATED WEAVER *Ploceus xanthopterus*

40 ex vid häckningskoloni (tillsammans med Yellow Weaver) i vassområde väster om S:t Lucia 13-14/1.

CAPE WEAVER *Ploceus capensis*

20 ex Oribi Gorge 15/1, 10 ex Underberg och 2 ex Sani Pass 16/1, 10 ex Underberg 17/1, enstaka ex 23-24/1, 4 ex Kirstenbosch 25/1.

YELLOW (EASTERN GOLDEN) WEAVER *Ploceus subaureus*

20 ex vid häckningskoloni (tillsammans med Southern Brown-throated Weaver) i vassområde väster om S:t Lucia 13-14/1.

RED-HEADED WEAVER *Anaplectes rubriceps*
1 par Mahonie Loop 8/1, 2 ex söder Olifants 9/1.

(SOUTHERN) RED BISHOP *Euplectes orix*
Allmän i öppna gräsmarker i norra och östra Sydafrika. Observerad 11 dagar 5-20/1, ofta i stora antal.

GOLDEN BISHOP *Euplectes afer*
"Den stora gula humlan" ses ofta på samma lokaler som sin röda släkting, men vanligen i något mindre antal. Observerad under 7 dagar 5-17/1, i stora antal framför allt kring Wakkerstroom.

LONG-TAILED WIDOW *Euplectes progne*
3 ex Nylsvlei 6/1. Allmän i öppen gräsmark 10-11/1 och 15-18/1.

RED-COLLARED WIDOW *Euplectes ardens*
3 ex längs vägen 15/1, 15 ex Underberg 16/1, 35 ex Underberg 17/1, 100 ex Suikerbosrand 18/1.

WHITE-WINGED WIDOW *Euplectes albonotatus*
2 ex Borakalolo 5/1, allmän Nylsvlei 6/1, 2 ex Mkuzi 12/1, 2 ex mellan Mkuzi och Bonamanzi 13/1.

RED-SHOULDERED WIDOW *Euplectes axillaris*
5 ex längs vägen, östra Transvaal 10/1, 5 ex Wakkerstroom och 2 ex Piet Retief 11/1, 3 ex Mkuzi 12/1, 5 ex längs vägen 14/1, 1 ex Underberg 16/1, 2 ex Underberg 17/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1.

YELLOW-RUMPED WIDOW *Euplectes capensis*
3 ex Sani Pass 16/1, 10 ex Suikerbosrand 18/1.

RED-BILLED QUELEA *Quelea quelea* (blodnäbbvävare)
Allmän längs vägen 6/1 och i Krüger 7-10/1. Ofta i mycket stora flockar. Dessutom observerades 1 ex (!) söder Borakalolo 5/1 och 50 ex Mkuzi 12/1.

EASTERN PARADISE WHYDAH *Vidua paradisaea*
1 ex mellan Pietersburg och Louis Trichard samt 2 ex mellan Louis Trichard och Punda Maria 6/1, 1 hane mellan Pafuri och Punda Maria samt 1 hona Punda Maria 7/1, 1 hane norr Olifants 8/1, 3 hanar söder Olifants och 1 hane Skukuza 9/1, 2 hanar söder Skukuza 10/1, 1 hane Suikerbosrand 18/1. I samband med en störtskur på eftermiddagen sågs två flockar om 25 + 25 ex på telefontrådar längs vägen mellan Suikerbosrand och Kimberley 18/1.

PIN-TAILED WHYDAH *Vidua macrorua* (dominikaneränka)
1 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Nylsvlei 6/1, 1 ex Skukuza 9/1, ca 20 ex längs vägen 10/1, 7 ex Wakkerstroom 11/1, 1 ex längs vägen 13/1, 1 ex längs vägen 15/1, 2 ex Underberg 16/1, 1 ex Underberg och 2 ex Ladysmith 17/1, 4 ex Suikerbosrand 18/1.

STEELBLUE WIDOWFINCH *Vidua chalybeata*
1 hane mellan Pafuri och Punda Maria 7/1.

BLACK WIDOWFINCH *Vidua funerea*
1 hane Borakalolo 5/1.

RED-BILLED FIREFINCH *Lagonosticta senegala*
2 ex Crooks Corner, Pafuri 7/1.

JAMESON'S FIREFINCH *Lagonosticta rhodopareia*
2 ex Borakalolo 5/1, 2 ex Punda Maria 7/1.

BLUE-BILLED FIREFINCH *Lagonosticta rubricata*
2 ex Mkuzi 12/1, 4 ex Xumeni Forest 17/1.

SWEE WAXBILL *Estrilda melanotis*
1 ex Xumeni Forest och 1 ex Hella Hella 17/1.

COMMON WAXBILL *Estrilda astrild*

3 ex Mkuzi 13/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1, 5 ex Sani Pass 16/1, 50 ex The Swamp, 10 ex Xumeni Forest och 20 ex Hella Hella 17/1.

BLACK-CHEEKED (-FACED) WAXBILL *Estrilda erythronotus*

2 ex Suikerbosrand 18/1, 1 ex Langberg 20/1.

BLUE WAXBILL *Uraeginthus angolensis*

Allmän Borakalolo 5/1, täml allmän i Krüger 7-9/1 samt i Mkuzi 12-13/1, 4 ex Sandveld 19/1.

VIOLET-EARED WAXBILL *Uraeginthus granatinus*

1 hane på vägen mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1.

RED-HEADED FINCH *Amadina erythrocephala*

2 ex på gårdsplanen, Langberg Guest Farm 19/1.

SCALY-FEATHERED FINCH *Sporopipes squamifrons*

30 ex Sandveld 19/1, 20 ex sydväst Pofadder 21/1.

MELBA FINCH (GREEN-WINGED PYTILIA) *Pytilia melba*

1 ex söder Olifants 9/1, 4 ex Suikerbosrand 18/1.

ORANGE-BREASTED (ZEBRA) WAXBILL *Sporaeginthus subflavus*

50 ex The Swamp 17/1.

PINK-THROATED TWINSPOT *Hypargos margaritatus*

2 ex vid swimmingpoolen intill Mantuma camp, Mkuzi 12/1, 2 ex vid parkeringen till Kubube Hide, Mkuzi 13/1.

CHAFFINCH *Fringilla coelebs* (bofink)

4 ex Die Hel 25/1. Onekligen en skum känsla att stå på Kaphalvön och lyssna på bofink. Arten är ursprungligen inplanterad från Europa.

BLACK-HEADED CANARY *Serinus alario*

2 ex Akkerendam 22/1.

YELLOW CANARY *Serinus flaviventris*

Täml allmän i väster samt i Sani Pass. Sedd under 9 dagar 16-26/1.

LEMON-BREASTED CANARY *Serinus citrinpectus*

4 ex Bonamanzi 13/1. Lokalens målart framför andra. Den har ett begränsat utbredningsområde i norra Natal, Swaziland och Mozambique. Helt knuten till lalpalmer, och det är följaktligen i det stora lalpalmbeståndet intill swimmingpoolen på campen i Bonamanzi man bör söka den.

YELLOW-FRONTED (-EYED) CANARY *Serinus mozambicus*

2 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Punda Maria 7/1, 4 ex Mahonie Loop 8/1, 8 ex Mkuzi 12/1, 4 ex Oribi Gorge 15/1, 6 ex Hella Hella 17/1.

BLACK-THROATED CANARY *Serinus atrogularis*

2 ex Suikerbosrand 18/1, 5 ex Sandveld och 15 ex Beaconsfield Park, Kimberley 19/1, 15 ex längs vägen 20/1.

FOREST CANARY *Serinus scotops*

10 ex Xumeni Forest 17/1.

CAPE CANARY *Serinus canicollis*

10 ex Sani Pass 16/1, 30 ex Xumeni Forest 17/1, 10 ex Suikerbosrand 18/1, 10 ex Bainskloof 23/1, enstaka i sydvästra Kap 24-25/1.

WHITE-THROATED CANARY *Serinus albogularis*

5 ex Augrabies Falls 20/1, 15 ex sydväst Pofadder 21/1.

PROTEA CANARY *Serinus leucopterus*

4 ex Kransvlei Poort 22/1. En av de mest kända lokalerna för denna endem med väldigt begränsat utbredningsområde i sydvästra Kap.

CAPE SISKIN *Pseudochloroptila totta*

3 ex Die Hel, 3 ex Kirstenbosch och 1 ex Cape Point 25/1.

DRAKENSBERG SISKIN *Pseudochloroptila symonsi*

20 ex Sani Pass 16/1.

CINNAMON-BREASTED ROCK BUNTING *Emberiza tahapisi* (afrikansk klippsparv)

6 ex mellan Pafuri och Punda Maria 7/1, 4 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 1 hane Wakkerstroom 11/1, 1 ex Mkuzi 12/1, 1 ex Mkuzi 13/1.

GOLDEN-BREASTED BUNTING *Emberiza flaviventris*

4 ex Punda Maria 7/1, 4 ex Mahonie Loop och 2 ex mellan Punda Maria och Shingwedzi 8/1, 2 ex söder Olifants 9/1, 2 ex Mkuzi 12/1.

LARKLIKE BUNTING *Emberiza impetuani*

Allmän Pofadder - Brandvlei 21/1. Utpräglad ökenart.

CAPE BUNTING *Emberiza capensis*

Totalt 50 ex på 7 observationsdagar 16-25/1.

Däggdjur

CHACMA BABOON *Papio ursinus* (savannbabian)

Enstaka Borakalolo 5/1, täml allmän Krüger 7-10/1, 5 ex Sani Pass 16/1, 15 ex Suikerbosrand 18/1.

VERVET MONKEY *Cercopithecus aethiops* (grön markatta)

Täml allmän Borakalolo, Krüger, Mkuzi, Cape Vidal och Sandveld.

SAMANGO (BLUE) MONKEY *Cercopithecus mitis* (diademmarkatta)

10 ex Cape Vidal 14/1, 2 ex Oribi Gorge 15/1.

BUSHBABY *Galago senegalensis* (dvärggalago)

1 ex på "night-drive", Punda Maria 7/1.

GREATER BUSHBABY *Otolemur crassicaudatus* (jättegala)

2 ex Olifants 8/1.

CAPE HARE *Lepus capensis* (kaphare)

1 ex väster Borakalolo 5/1, 2 ex Sandveld 18/1, 5 ex Sandveld och 2 ex Langberg 19/1.

SCRUB HARE *Lepus saxatilis*

1 ex Punda Maria 7/1, 1 ex Mkuzi 12/1, båda observerade på "night-drive".

(AFRICAN BRUSH-TAILED PORCUPINE *Hystrix africaeustralis* (kvastpiggsvin))

1 ex funnen död norr Calvinia 21/1.

CAPE GROUND SQUIRREL *Xerus inauris*

Observerad i små antal i Borakalolo, Krüger, Mkuzi samt 10 ex Augrabies Falls 20/1.

RED SQUIRREL *Paraxerus palliatus*

1 ex Cape Vidal 14/1.

SLOGGETT'S ICE RAT *Otomys sloggetti* (isrätta)

5 ex Sani Pass 16/1. Charmig hamsterliknande varelse.

FOUR-STRIPED GRASS MOUSE *Rhabdomys pumilio*

Några ex i Rob Guys trädgård, Underberg 17/1.

CAPE FUR SEAL *Arctocephalus pusillus* (pälssäl)

50 ex Lamberts Bay 22/1.

BLACK-BACKED JACKAL *Canis mesomelas* (schabraksjaka)

1 ex Ladysmith 17/1, 1 ex Pofadder 21/1.

SMALL GREY MONGOOSE *Galerella pulverulenta*

1 ex Augrabies Falls 20/1, 3 ex sydväst Pofadder 21/1.

SLENDER MONGOOSE *Galerella sanguinea* (slank mangust)

1 ex Krüger 9/1, 1 ex Krüger 10/1, 1 ex Mkuzi 12/1.

YELLOW MONGOOSE *Cynictis penicillata*

5 ex Wakkerstroom 11/1, 5 ex Sandveld 18/1, 10 ex Sandveld och 5 ex Marrick Game Farm 19/1.

SURICATE *Suricata suricatta* (surikat)

7 ex Wakkerstroom 10/1, 3 ex Suikerbosrand 18/1, 9 ex (2+7) Sandveld 19/1, 1 ex Augrabies Falls 20/1. Vinnare av resans charmpris med sitt lustiga spanarbeteende.

SPOTTED HYAENA *Crocuta crocuta* (fläckig hyena)

1 ex Punda Maria 6/1, 2 ex Skukuza 9/1, 3 ex Skukuza 10/1.

LION *Panthera leo* (lejon)

7 ex mellan Punda Maria och Pafuri 7/1, 1 ex söder Olifants och 1 ex väster Lower Sabie 9/1.

LARGE-SPOTTED GENET *Genetta tigrina*

2 ex på "night-drive", Mkuzi 12/1.

CAPE ROCK DASSIE *Procavia capensis* (klippdass)

1 ex Wakkerstroom 11/1, 1 ex Langberg 19/1, 1 ex Langberg och 2 ex Augrabies Falls 20/1.

AFRICAN ELEPHANT *Loxodonta africana* (afrikansk elefant)

10 ex Krüger 8/1, 30 ex Krüger 9/1, 1 ex Krüger 10/1. Huvudsakligen ensamma individer, men en flock på 21 ex sågs mellan Lower Sabie och Skukuza 9/1.

BURCHELL'S ZEBRA *Equus burchelli* (zebra)

Täml allmän i Krüger och Mkuzi, 40 ex Suikerbosrand 18/1.

MOUNTAIN ZEBRA *Equus zebra* (bergszebra)

10 ex De Hoop 24/1.

WHITE RHINOCEROS *Ceratotherium simum* (trubbnoshörning)

2 ex Borakalolo 5/1, 3 ex Mkuzi 12/1, 10 ex Sandveld 19/1.

WARTHOG *Phacochoerus aethiopicus* (vårtsvin)

Mindre antal i Borakalolo, Krüger och Mkuzi.

COMMON HIPPOPOTAMUS *Hippopotamus amphibius* (flodhäst)

Täml allmän i mellersta och södra Krüger 8-10/1.

GIRAFFE *Giraffa camelopardalis* (giraff)

Enstaka ex Borakalolo 5/1, täml allmän Krüger och Mkuzi.

AFRICAN BUFFALO *Syncerus caffer* (afrikansk buffel)

1 ex Pafuri och en hjord om ca 50 ex Mahonie Loop 7/1.

ELAND *Taurotragus oryx* (älgantilop)

6 ex Suikerbosrand 18/1, 20 ex De Hoop 24/1.

GREATER KUDU *Tragelaphus strepsiceros* (större kudu)
Enstaka ex i Krüger 9/1 och Mkuzi 12/1.

BUSHBUCK *Tragelaphus scriptus* (buskbock)
1 ex Borakalolo 5/1, 1 ex Krüger 9/1.

SOUTHERN NYALA *Tragelaphus angasi* (nyala)
Allmän kring Pafuri 7/1 och i Mkuzi 11-13/1, observerad Hella Hella 17/1. I Mkuzi går relativt tama nyalor omkring inne på campen. Inte så dramatiskt i sig kanske, men parkens leoparder har tydligen kommit på att det är lättfångade byten och jagar tydligen inne på campen om natten.

SABLE ANTELOPE *Hippotragus niger* (sabelantilop)
20 ex Sandveld 19/1.

GEMSBOK (ORYX) *Oryx gazella* (oryxantilop)
30 ex Sandveld 19/1.

COMMON WATERBUCK *Kobus ellipsiprymnus* (vattenbock)
15 ex Nylsvlei 6/1, enstaka Olifants 8-9/1.

SOUTHERN (COMMON) REEDBUCK *Redunca arundinum* (stor rörbock)
2 ex mellan Cape Vidal och S:t Lucia 14/1.

GREY RHEBOK *Pelea capreolus*
4 ex Akkerendam 22/1.

BLACK WILDEBEEST *Connochaetus gnou* (vitsvangnu)
10 ex Hella Hella 17/1, 50 ex Suikerbosrand 18/1.

BLUE WILDEBEEST *Connochaetus taurinus* (strimmig gnu)
Täml allmän i södra och mellersta Krüger 9-10/1 samt i Mkuzi 11-13/1.

RED HARTEBEEST *Alcelaphus buselaphus* (koantilop)
25 ex Suikerbosrand och 4 ex Sandveld 18/1, 25 ex Sandveld och 4 ex Langberg 19/1, 1 ex Langberg 19/1.

BLESBOK/BONTEBOK *Damaliscus dorcas*
Smärre antal Wakkerstroom 11/1, Underberg 16/1 och Hella Hella 17/1, 100 ex Suikerbosrand 18/1, 30 ex De Hoop 24/1. De olika namnen står för olika underarter, som är väldigt lika till utseendet. Utbredningen av den vita bläsen skiljer dock raserna åt. Av utbredningen att döma är djuren i De Hoop Bontebok, de övriga Blesbok.

TSESSEBE *Damaliscus lunatus* (topi)
1 ex Borakalolo 5/1.

IMPALA *Aepyceros melampus* (impala)
Allmän i Borakalolo, Krüger och Mkuzi. Den absolut vanligaste antilopen i de stora reservaten. Senare sågs 3 ex Sandveld 19/1.

SPRINGBOK *Antidorcas marsupialis*
3 ex Sandveld 19/1, 2 ex Augrabies Falls 20/1, 4 ex sydväst Pofadder 21/1, 6 ex Akkerendam 22/1, 4 ex De Hoop 24/1. Ibland studsar de iväg på alla fyra, en meter upp i luften, vilket ser oerhört komiskt ut.

KLIPSPRINGER *Oreotragus oreotragus* (klippspringare)
4 ex Sir Lowry's Pass 24/1.

STEENBOK *Raphicerus campestris*
1 ex Krüger 9/1, 4 ex sydväst Pofadder och 1 ex norr Calvinia 21/1.

RED DUIKER *Cephalophus natalensis* (röddykare)
1 ex Cape Vidal och 1 ex Mtunzini 14/1.

COMMON (GREY) DUIKER *Sylvicapra grimmia* (grådykare)
1 ex Sandveld 18/1, 4 ex Sandveld och 2 ex Langberg 19/1.

HEAVISIDE'S DOLPHIN *Cephalorhynchus heavisidii*
5 ex Kommetjie 27/1.

Herptiler

NILE CROCODILE *Crocodylus niloticus* (nilkrokodil)
Observerad i de flesta större vattendrag i Krüger.

ROCK (SAVANNA) MONITOR *Varanus exanthematicus*
1 ex Shingwedzi 8/1.

WATER (NILE) MONITOR *Varanus niloticus* (nilvaran)
Enstaka ex observerade i Krüger.

CHAMELEON *Chamaeleo sp.* (kameleont)
1 ex norr Shingwedzi 8/1, 1 ex Suikerbosrand 18/1.

DRAKENSBERG CRAG LIZARD *Pseudocordylus melanotus*
2 ex Wakkerstroom 11/1.

CAPE FLAT LIZARD *Platysaurus capensis*
1 ex Augrabies Falls 20/1. Videofilmad av "misstag" (sprang in i bilden när Ola filmade Pale-winged Starling).

UNIDENTIFIED LIZARD ???
En hel del mindre ödlor sågs här och där. Våra kunskaper om dessa är dock minst sagt bristfälliga.

UNIDENTIFIED TORTOISE ??? (obestämd sköldpadda)
Smärre antal i Krüger och Mkuzi. Av andra reserapporter att döma ligger Leopard Tortoise nära till hands.

BLIND BURROWING ADDER ???
1 ex på "night-drive", Mkuzi 12/1. Guiden kallade arten som ovan, har ej fått namnet bekräftat genom litteratur. Troligtvis har den ett annat namn i litteraturen.

PUFF ADDER *Bitis ariens*
1 ex på "night-drive", Mkuzi 12/1.

Ej observerade arter

Vi hade bra utdelning på resan, men med begränsad tid på lokalerna och faktorer som väder, årstid m.m., så kan man ju inte se allt. Följande arter bör man kunna ha under en resa med ett upplägg likt vårt, men vi valde att spara dem till nästa gång. De följer här i någon slags kronologisk ordning.

MEYER'S PARROT *Poicephalus meyeri*

PIED BABBLER *Turdoides bicolor*

BUSHVELD PIPIT *Anthus caffer*

SHAFT-TAILED WHYDAH *Vidua regia*

Arter som ska finnas i Borakalolo NP, som vi besökte första dagen. Det är dock en tämligen stor park och en het eftermiddag mitt i sommaren är kanske inte bästa förutsättningen. Vi var där dessutom första dagen på resan, då ju alla andra arter slåss om uppmärksamheten. Detta är arter som är vanligare i de nordliga grannländerna och här befinner sig på randen av sina utbredningsområden.

AFRICAN FINFOOT *Podica senegalensis*

Även denna ska förekomma i Borakalolo, men vi hade tidsbrist när vi väl kom ner till floden. Vi letade också vid bron öster om Skukuza i Krüger, varifrån den rapporterats tidigare, men där var nog för högt vatten vid vårt besök.

LESSER (ALLEN'S) GALLINULE *Porphyrio alleni* (mindre sultanhöna)

LESSER MOORHEN *Gallinula angulata* (mindre rörhöna)

Båda arterna häckar i Nylsvlei. Bästa tiden i Nylsvlei infaller dock senare, i februari - maj, då det är avsevärt blötare där. Det är också stor variation mellan åren. Troligen såg vi en Lesser Moorhen som snabbt damp ner i vassen.

SHORT-CLAWED LARK *Certhilauda chuana*

En svår endem, där inga lokaler verkar säkra. De flesta lokaler ligger i området Upington - Kimberley, men Vaalbos, som tidigare lär ha varit säker, verkar numera sämre. Detta baserat på reserapporter från Birdquest (www.birdquest.co.uk) som brukar leta där. En disjunkt population finns runt Pietersburg, längs N1, men vi hade bråttom till Krüger när vi passerade och hade inte heller någon exakt lokal.

BÖHM'S SPINETAIL *Naefrapus boehmi*

MOTTLED SPINETAIL *Telecanthura ussheri*

Båda arterna lär förekomma vid Luvuvhu River i Pafuri i nordligaste Krüger. Trots intensivt span från flera platser längs floden kammade vi noll.

THICK-BILLED CUCKOO *Pachycoccyx audeberti*

Mycket svår i Sydafrika, men har rapporterats vid bron över Luvuvhu River i Pafuri. Vi körde bandspelare en stund, men utan resultat.

ARNOT'S CHAT *Thamnolaea arnoti*

STIERLING'S BARRED WARBLER *Calamonastes stierlingi*

Två arter som man ska kunna ha i norra delen av Krüger med lite tur. Vi hade inga exakta lokaler utan hoppades på att se åtminstone Arnot's Chat från bilen. Sångaren får man nog försöka spela fram.

MONOTONOUS LARK *Mirafraga passerina*

DUSKY LARK *Pinarocorys nigricans*

Två lärkor som man ska kunna se i Krüger. De är dock nomadiska och ses framför allt när det är blött. När vi var där var det snustorr. Är det blött i Krüger ska de dock vara ganska vanliga.

TAITA FALCON *Falco fasciinuca*

Det finns en lokal, benämnd Strydom tunnel, för denna mycket sällsynta art. Det är dock 5-6 timmars körning från Johannesburg och man bör tydligen vara där tidigt på morgonen. Om man lämnar Krüger västerut från Skukuza är det ca 2,5 timmars körning. I vilket fall som helst bedömde vi denna lokal ligga för avses för att passa in i vårt program.

Ugglor och nattskärror.

I januari är det skådarljus från 0500 till 1930. Denna tid la vi huvudsakligen på skådning och transporter. Sen ska man äta middag, ha artgenomgång m.m. Med detta sagt att vi prioriterade bort nattskådning av rena orkesskal. Arter vi kunde haft inkluderar bl.a. Giant Eagle Owl *Bubo lacteus*, Cape Eagle Owl *Bubo capensis*, Barn Owl *Tyto alba*, Wood Owl *Strix woodfordi*, African Barred Owl *Glaucidium capense* och Rufous-cheeked Nightjar *Caprimulgus rufigena*. För att se Grass Owl *Tyto capensis* och Pennant-winged Nightjar *Macrodipteryx vexillarius* räcker det nog inte med att skåda på natten, då krävs det enorm tur också. Wakkerstroom sägs vara ett av de bästa ställena för Grass Owl. John McAllister, som bor i Wakkerstroom och är heltidsskådare sedan många år, hade t.ex. bara sett arten ett fåtal gånger i hela sitt liv. Ytterligare en art nattskärre, Natal Nightjar *Caprimulgus natalensis*, hade vi hoppats att leta efter längs vägen mot Cape Vidal, men den vägen är stängd på natten så då måste man campa vid Cape Vidal för att kunna satsa på den.

Frankoliner

Vi såg sju arter frankolin, inklusive bl.a. den ganska svåra Orange River Francolin samt alla endemiska arter. Det är vi klart nöjda med. Det finns emellertid några till, som dock är mycket svåra då de har mycket undanskymda vanor och sällan visar sig. Coqui Francolin *Francolinus coqui* ska vara hyfsat vanlig i Krüger, medan vi inte hade några lokaler för vare sig Shelley's Francolin *Francolinus shelleyi* eller Red-necked Francolin *Francolinus afer*.

SOUTHERN BANDED SNAKE-EAGLE *Circaetus fasciolatus*

Mycket lokalt förekommande i nordöstra Natal. Rapporteras ibland från vägen mellan Cape Vidal och S:t Lucia, där vi spanade efter den förgäves.

LESSER JACANA *Microparra capensis*

Följeart till Pygmy Goose, som vi såg mellan Cape Vidal och S:t Lucia. Lokaler som ska vara bra för denna är bl.a. den damm som beskrivs under Pygmy Goose i artlistan, samt våtmarksområdet vid Richards Bay, som vi prioriterade bort av tidsskäl.

GREEN COUCAL (YELLOWBILL) *Ceuthmochares aereus*

Fig Forest i Mkuzi ska vara bra för denna. Skogen var dock stängd när vi var där p.g.a. översvämning. Arten finns dock på andra ställen i Natal, men vi ägnade oss för lite åt skogsskådning, helt enkelt.

WOODWARD'S (GREEN) BARBET *Cryptolybia woodwardi*

Green Barbet häckar i Östafrika, men det finns även en population i Ngoye Forest i Natal. Dessa förs ibland till en egen art, Woodward's Barbet. Vägen till Ngoye lär dock vara riktigt dålig och guide med fyrhjuldriven bil är tydligen att rekommendera. Området har också, enligt uppgift, varit utsatt för en del hel del rån och bilstölder på senare år. Vi valde därför bort den från vårt program.

DELEGORGUE'S PIGEON *Columba delgorguei*

SPOTTED GROUND THRUSH *Zoothera guttata*

Två sällsynta arter som är lättast att se i Dlinza resp. Entumeni, två skogsreservat i Natal. Duvan är lättast i Entumeni medan trasten har sin bästa förekomst i Dlinza. Lokalerna ligger nära varandra och kan med fördel kombineras. P.g.a. vårt pressade tidsschema valde vi bort den omväg som det inneburit att besöka dessa två lokaler. Kanske lika bra det, då skogsskådning är det som ger minst i januari, i förhållande till tidigare på säsongen.

PALM-NUT VULTURE *Gypohierax angolensis* (palmgam)

Är mycket ovanlig i Sydafrika, men häckar i lokalt längs Natal-kusten, t.ex. vid Mtunzini. Då vi alla sett arten tidigare lade vi ingen extra energi på den.

SHARP-BILLED HONEYGUIDE *Prodotiscus regulus*

BLUE-MANTLED FLYCATCHER *Trochocercus cyanomelas*

YELLOW WHITE-EYE *Zosterops senegalensis*

RED-BACKED MANNIKIN *Spermestes bicolor*

GREEN TWINSPOUT *Mandingoa nitidula*

Arter som finns i skogarna i Natal, men som vi inte lyckades få korn på. Vi hade inga speciella lokaler, men de är nog inte alltför ovanliga. Otur, helt enkelt. Sharp-billed Honeyguide hörde vi nog när vi var ute med Rob Guy, men den lät tyvärr bara en gång och vi såg inte fågeln heller.

BLACK CUCKOO *Cuculus clamosus*

Denna är enligt reserapporterna ganska vanlig. Gökarna verkar dock generellt ha tystnat i januari, och vi hörde bara enstaka av Red-chested, som ska vara allmän. Trots det en riktig praktdipp!

KNYSNA WOODPECKER *Campethera notata*

Häckar i Oribi Gorge. Är dock inte särskilt lätt att få se och inte heller särskilt ljudlig. Dippas ofta på skäddarresor!

AFRICAN BROADBILL *Smithornis capensis*

Även här spelade nog tid på säsongen in. Svårsedd art som vi hade tämligen exakta lokaler för i såväl Mkuzi som Oribi Gorge. Bandspelare hjälpte föga.

BLACK-WINGED PLOVER *Vanellus melanopterus*

Ovanlig häckare i Natal som vi inte hade någon bra lokal för.

STRIPED PIPIT *Anthus lineiventris*

Ganska ovanlig art, som brukar ses vid t.ex. Oribi Gorge och Hella Hella. Vi letade på dessa ställen men utan resultat.

Flufftails

Vi hörde Red-chested Flufftail i Wakkerstroom, men det finns tre arter till. Normalt slutar de dock spela tidigare på säsongen, så vi hade nog snarast tur, eftersom de är så gott som omöjliga att få syn på. Buff-spotted Flufftail *Sarothrura elegans* häckar bl.a. i Rob Guys stora trädgård, men är den tyst kan man glömma den. Striped Flufftail *Sarothrura affinis* är inte heller direkt ovanlig. Det är däremot White-winged Flufftail *Sarothrura ayresi*, som dock har rapporterats från Franklin Marsh på senare år.

SOUTHERN WHITE-BELLIED KORHAAN *Eupodotis cafra***BLACK-BELLIED KORHAAN** *Eupodotis melanogaster*

Vi var endast några timmar i de fina markerna kring Ladysmith och större delen av dessa gick åt att leta upp Melodious Lark. Black-bellied kan man även ha på många andra ställen men vi lade inget extra krut på den, eftersom några av oss sett den tidigare.

BARLOW'S LARK *Certhilauda barlowi*

Arten har ett mycket begränsat utbredningsområde längs kusten i södra Namibia och nordvästligaste Sydafrika. Större delen av denna kuststräcka är avspärrad p.g.a. diamanfyndigheter. Det hade säkert kostat en hel dag extra att åka till Port Nolloth, som den mest kända lokalen heter, vilket hade lett till att vi fått prioritera bort någon annan lokal.

BURCHELL'S COURSER *Cursorius rufus***SCLATER'S LARK** *Spizocorys sclateri*

Utpräglade ökenarter och eftersom vi endast lade en dag i öknen så är vi nöjda med att vi såg alla specialiteter utom dessa. Vi hade en bra lokal för lärkan några mil öster om Brandvlei. P.g.a. punktering och ytterligare ett klart slitet däck (p.g.a. riktigt dåliga vägar i öknen) så valde vi bort detta. För att se Burchell's Courser är det mycket tur som krävs.

CAPE LONG-BILLED LARK *Certhilauda curvirostris*

En av fem arter (fyra i Sydafrika och en i Namibia) som har uppstått ur en split från den tidigare arten Long-billed Lark. Cape-arten hade vi en lokal för, i strandvegetation ("strandveld"), väster om Velddrif. Vi gick över några fält som såg bra ut, men hade ingen lycka.

BLACK SPARROWHAWK *Accipiter melanoleucus***RED-BREASTED SPARROWHAWK** *Accipiter rufiventris***BULLY (BRIMSTONE) CANARY** *Serinus sulphuratus***STREAKY-HEADED CANARY** *Serinus gularis*

Inte alltför ovanliga arter, som vi hoppats få se någonstans längs vår rutt, även om vi inte hade några säkra lokaler för dem. Red-breasted Sparrowhawk brukade t.ex. passera över Jim och Caz' trädgård i Kirstenhof ganska ofta, medan Black Sparrowhawk häckade i närheten av Rob Guy's trädgård (men de var inte kvar där vid vårt besök). Dessa arter har man dock god chans att se på många andra håll i Afrika.

Havsfåglar

När man åker till ett så stort land som Sydafrika i 23 dagar, så missar man självklart en del och dipp-listan ovan är inget som stör oss nämnvärt. Däremot var det väldigt synd att vi inte lyckades komma ut på en havsfågeltur med båt utanför Kapstaden. Vi hade fixat detta på förhand och hade tre dagar tillgängliga. Dagen vi kom ner till Kapstaden (23/1) var vädret idealiskt, men på natten mot 24/1 blåste det upp och detta väder höll i sig ända till vi åkte hem den 27/1. Vi försökte minimera förlusterna genom att spana havsfågel från land, vilket gav en del. Januari är bland de sämsta månaderna för havsfåglar och hade vi kommit ut hade vi inte kunnat förvänta oss de enorma mängder av t.ex. albatrosser, som man kan se på en del bilder. Artmässigt gick vi ändå med stor sannolikhet miste om Shy Albatross *Diomedea cauta*, Black-browed Albatross *Diomedea melanophrys* (svartbrynad albatross), Yellow-nosed Albatross *Diomedea chlororhynchos*, Great Shearwater *Puffinus gravis* (större lira), Great-winged Petrel *Pterodroma macroptera*, Wilson's Storm-petrel *Oceanites oceanicus* (havslöpare) och European (British) Storm-petrel *Hydrobates pelagicus* (stormsvala), kanske även Southern Giant Petrel *Macronectes giganteus* (sydlig jättestormfågel) och Northern Giant Petrel *Macronectes halli* (nordlig jättestormfågel).

Däggdjur

Vi lade i stort sett upp rundan efter fåglar och glädde oss helt enkelt åt de däggdjur som kom i vår väg. Karismatiska djur som vi kunde sett i Krüger och/eller Mkuzi är framför allt Leopard *Panthera pardus* (leopard), Cheetah *Acinonyx jubatus* (gepard) och Black Rhinoceros *Diceros bicornis* (spetsnoshörning). I östra delen av landet hade man ju vidare kunnat tänka sig ytterligare antiloper i form av bl.a. Roan Antelope *Hippotragus equinus* (hästantilop), Oribi *Ourebia ourebi* (oribi) och den lilla Suni *Neotragus moschatus* (suniantilop). Southern Right Whale *Lissodelphis peronii* (rätval) är ju en begivenhet i Kapprovinsen, men januari är en dålig månad för dessa. Slutligen kan man nämna några nattaktiva, och extremt svårседda djur, som t.ex. Aardvark *Oryzomys afer* (jordsvin) och Bat-eared Fox *Otocyon megalotis*, men för att se någon av dessa krävs en nästan osannolik tur.