


KENYA

2009-12-19 - 2010-01-10



**Anders Dahl
Andreas Viberg
Stellan Bygård**

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Deltagare

Anders Dahl, Arlöv dahl_anders@hotmail.com
Andreas Viberg, Stockholm andreas.viberg@tele2.se
Stellan Bygård, Dalstorp stellan.bygard@svedbergs.se

Program

(Siffror inom parentes hänvisar till kartan på nästa sida)

19/12 Nairobi – Limuru wetland (1) - Kinangop plateau (2) - Molo grassland - Nakuru
20/12 [Lake Nakuru NP](#) (3) - Lake Baringo (4)
21/12 Lake Baringo – Kapedo (5)
22/12 Kapedo-Baringo – Kitale (6)
23/12 Kitale - Kongelai Escarpment - Kitale
24/12 Kitale - Kongelai - Kakamega forest (7)
25/12 [Kakamega forest](#)
26/12 Kakamega forest – Busia (8)
27/12 Busia – Matayos – Kisumu (9)
28/12 Kisumu – Dunga - [Mara West Camp](#)
29/12 [Masai Mara](#) (10)
30/12 Masai Mara – Naivasha (11)
31/12 Gatamaiyu forest (12) - Kinangop plateau - Lake Naivasha - Naivasha
1/1 [Aberdare NP](#) (13) – Gatarakwa – Wajee – Thika (14)
2/1 Thika – Garissa (15)
3/1 Garissa - Mado Gashi (16)
4/1 Mado Gashi – Garissa - Nairobi
5/1 [Nairobi NP](#) (17) - Nairobi Jockey Club - Olorgesaille (18)
6/1 Olorgesaille – Nairobi - Voi
7/1 Taita Hills (19) - [Tsavo East NP](#) (20) – Mombasa - Malindi
8/1 [Arabuko Sokoke Forest](#) (21) - Mida Creek (22)
9/1 Roka Ponds - Lake Chem Chem – Malindi – Gongoni - Sabaki river delta (23) - Jilore
10/1 Malindi - [Shimba Hills](#) (24)
11/1 Hemfärd, Nairobi - Amsteden-Stockholm

Inledning


Under planeringen av årets skådarresa funderade vi på att återigen tillbringa julen i Sydamerika, och i så fall Peru, men efter lite funderande föll valet på Afrika och Kenya. Kenya är lite konstigt nog inte så välbesökt av skådare som man skulle kunna tro, men några områden i södra delen av landet är välkända för sina däggdjur och därför ofta besökta av vanliga naturintresserade människor.

Landet är relativt lätt att resa i, men vägarna är i många fall mycket tröttsamma med oändliga mängder av stora hål och ojämnheter. Trots detta lyckades guiden och chauffören Chege hålla en i många fall förbluffande hög hastighet. Att inte vår bil helt skakade sönder varje dag under resan får betraktas som ett mirakel. Under långa sträckor var det bättre att köra i dikesrenen än på den yta som kallades för väg.

Även om landet i många ögon har ett gott rykte för att vara Afrika, är den inrikespolitiska situationen något orolig. Senast större oroligheter med något tusental dödsoffer blossade upp var efter valet 2007. Nu är situationen åter lugn och turister börjar återvända, men i vissa områden i

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

landet, framför allt i norr och nordost, bör man vara försiktig och känna till de lokala förhållandena. Guideböckerna avråder nästan helt att besöka de nordöstra delarna, vi upplevde dock inga problem där själva men hade bra guider med kunskaper om de aktuella förhållandena.



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Dagbok

17/12 Anders och Stellan reste upp genom ett snöigt Sverige och kom upp till Andreas i Stockholm under kvällen.

18/12 Tidigt uppvaknande och taxi till Arlanda för att ta British Airways flight till Heathrow klockan 06.50. Innan bordning kom beskedet att eftersom det kanske skulle kunna tänkas komma snö på Heathrow under förmiddagen kunde vi inte lyfta som planerat utan sannolikt först vid lunch! Vårt anslutande flyg från Heathrow till Nairobi skulle avgå 10.50 så detta var ju nästan katastrof. Hur som helst kom vi iväg från Arlanda och landade i ett soligt och snöfritt London. Kaptenen kunde dock berätta att molnen vi kunde ana på ena sidan flygplatsen minsann kunde ha medfört snö.

När vi efter lång väntan kommit av planet hade vårt anslutande flyg mot Nairobi redan avgått. I ankomsthallen var det totalt fullpackat med strandsatta resenärer, en del låg till och med och sov i stillastående köer. Hela flygplatsen var ett kaos, inga informationstavlor fungerade och ingen visste något. Vår taktik blev att Anders ställde sig i den monsterlånga kön till informationsdisken, Stellan försökte få tag på någon från British Airways och Andreas höll sambandet och fixade mat och dryck. Mirakulöst nog lyckades Stellan få tag på en BA-manager för informationsavdelningen och med gråten i halsen förklarade Stellan att det var total katastrof och att vi skulle missa vårt livs safari om vi inte var i Nairobi i morgon bitti. På något vis blev vi ombokade på ett plan mot Paris som skulle avgå typ nu, för att där ha ganska god marginal för att ta kvällsflyget med Kenyan Airways mot Nairobi. Vi sprang mot gaten och gick ombord. Då fanns ingen avisningsmaskin att tillgå, personalen måste bytas, vi fick inget starttillstånd mm, så vi kom inte iväg förrän tre timmar för sent, först vid 17.30.

Vi började inse att det skulle bli extremt bråttom i Paris, vi var heller inte incheckade på fligheten med Kenyan Airways och behövde få våra boardingkort utskrivna. Det fanns några lediga säten längre fram i planet och de bytte vi till, sedan rusade vi av planet, åkte en buss till en annan terminal och möttes av en lång kö vid incheckningsdisken. Det tog vi ingen hänsyn till utan haffade första bästa anställd och sa att vi måste få våra biljetter NU. Då fanns vi inte i datasystemet, och dessutom var det redan för sent för planet går nu var beskedet. Vi bönade och bad om att de skulle hålla planet och titta lite extra i systemet om vi inte ändå fanns där. Ett telefonsamtal och en del knappande i datorn, och plötsligt hade vi våra biljetter i handen. Kön vid säkerhetskontrollen sprang vi förbi, tokrusade genom hela terminalen och slängde oss på planet som var lite försenat, precis när gaten stängde. Helt sjukt! Väl ombord på det halvfulla planet fick vi varsin tre-sits rad, en bärs och en gin och tonic, och efter en fruktansvärd dag kunde vi äntligen andas ut. Vi förstod dock att vårt bagage knappast hängt med i svängarna, men vi var på rätt väg och det var ändå huvudsaken.

19/12 Bagaget hade förstås inte kommit med och vi anmälde det efter att vi hade landat. När vi gick ut ur terminalen såg vi först ingen skylt av vår guide, typiskt för denna resa efter mardrömsstarten. Men efter en halv timmes väntande såg jag att en av de som stod och väntade på gäster höll sin lapp bak och fram. I solljuset på lappen kunde jag ändå ana att [Birdwatching East Africa](http://www.birdwatchingeastafrika.com) lös genom och det visade sig att det var vår guide Chege! Äntligen var vi någorlunda på spåret, visserligen 12 timmar sena och utan bagage, men det var ju ändå detaljer i sammanhanget.



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Eftersom det redan var tidig förmiddag hade vi missat morgonen vi skulle haft i en skog intill Naivasha, i stället åkte vi mot Limuru Wetlands, strax nordväst om Nairobi, och började bekanta oss med den afrikanska avifaunan. Några korta stopp vid några våtområden gav bl.a. Hunter's Cisticola, Speke's Weaver, Streaky Seed-eater. Tråkigast med det uteblivna bagaget var att där låg våra stativ. Tubarna hade vi dock haft i handbagaget, men Cheges stativ var väldigt dåligt.

Därefter åkte vi upp mot Kinangop Plateau som är en bra lokal för den endemiska och starkt hotade Sharpe's Longclaw. Efter en stunds letande i

gräsmarkerna invid vägen hittade Anders en Sharpe's och vi fick fina obsar. I övrigt hade vi en Red-capped Lark. Efter lite mekaniska problem med bilen, en fyrhjulsdriven sliten Mitsubishi Danica, åkte vi vidare längs A104 på kanten av Great Rift Valley, en väg av god kvalitet. Ett kort stopp längs vägen i backen ner mot Lake Nakuru gav ett par Schalow's Wheatear på



Sharpe's Longclaw *Hemimacronyx sharpei*

ett hus. Eftersom vi inte hade hunnit ta ut dollars i London som tänkt, stannade vi i Nakuru och tog ut dollar på en bank med relativt dålig växelkurs. Chege ville ha dollars, inte Kenyanska Shillings och vi hade fått en bättre växelkurs i London eller Sverige, men nu var det som det var. Vi åkte ner till entrén till Lake Nakuru National Park och löste inträde för morgondagen. Sedan skådade vi i omgivningarna och ner mot reningsverksdammarna. Ganska mycket fågel och väldigt varmt och en brännande sol på vårt bleka skinn. Solskydd och andra kläder än de vi hade på oss befann sig i vårt bagage på för oss okänd plats i världen.

På eftermiddagen åkte vi upp till Molo Grasslands, ett område beläget på 2700 möh med åkrar, fält och små sjöar. Resan hit tog ca en och en halv timme med stopp för någon vacker stäpphök. Väl uppe skådade vi vid en sjö på vänster sida vägen tills solen gick ner, med ca 20 av traktens nyfikna barn i släptåg. Målarten Aberdare Cisticola hittades snart, i övrigt hade vi African Quail-Finch, Lesser Jacana, Knob-billed Duck, Cape Teal, Maccoa Duck, Great Crested Grebe, Black Crake och African Snipe.

På vägen från grasslands spelade Chege fram en Montane Nightjar som både svarade och flög runt oss ett par varv.

När vi var tillbaka i Nakuru handlade vi mat för kommande dagar och checkade sedan in på hotellet Midland. Duschade och åt en sen middag, vi var mycket trötta och hungriga, hade inte ätit något på hela dagen förutom lite kakor, än mindre druckit kaffe. Chege var också trött och somnade vid

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

matbordet. Men vi var riktigt glada med att överhuvudtaget vara här, det kunde vi inte tro igår när allt såg så mörkt ut.

125 arter sågs under dagen.

20/12 Lämnade hotellet 6.30 och åkte direkt ner till Lake Nakuru NP. Inne i parken fick man inte gå runt eftersom det bl.a. fanns lejon och noshörningar, och vi skådade från bilen som hade stora uppfällbara takluckor. Området var mycket torrt, och sodasjön Nakuru Lake var mycket mindre än vad den varit de senaste åren. Kenya ligger i område som påverkats mycket av klimatförändringar.

Exakt vad det beror på är inte helt känt, men en kombination av lokal avskogning och global växthuseffekt är väl en bra gissning. En hel del flamingos fanns i sjön i alla fall, uppskattningsvis något 10000-tal och på håll såg sjön helt rosa ut.

I parken finns ett återinplanterat bestånd av både vit och svart noshörning, och en hel del gaseller, apor och andra djur. Vi såg även ett lejon i skuggan av ett träd. Under vår tid i nationalparken åkte vi ett varv runt sjön och bitvis var det mycket fågel. Vi letade rätt länge

efter den mycket lokala Grey-crested Helmetshrike, och på sista stoppet (picknick-siten) innan utfärden hittade vi äntligen några tillsammans med den betydligt vanligare White-crested Helmetshrike. I övrigt hade vi Secretary bird, Rüppel's Vulture, mörk form av Gabar Goshawk, Tawny Eagle, White-fronted Bee-eater, Southern Ground Hornbill, Greater Honeyguide, Northern Puffback, Arrow-marked Babbler, Pectoral-patch Cisticola, Mocking Cliff Chat, Bearded Woodpecker, African Grey-headed Woodpecker Black Cuckooshrike.



White Rhinoceros *Ceratotherium simum* female with young and Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*.



Three-banded Courser *Rhinoptilus cinctus*

Efter att vi kört ur parken åkte vi upp till Midland hotel för en sen lunch innan vi påbörjade resan norrut mot Lake Baringo dit vi anlände sent på eftermiddagen. Vid Lake Baringo hade Chege stämt möte med en lokal guide, 22-åriga Francis CherutWich, som visade oss tre stycken vilande Three Banded Courser och en Northern White-faced Owl på dagkvist. Dessa fåglar hade i princip varit helt omöjliga att

hitta för oss utan hjälp eller kunskap om var de brukade tillbringa

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

dagarna. Sedan gick vi ner till stranden av sjön och när solen gick ner kom ganska många flodhästar upp ur vattnet för att beta. Vi inkvarterade oss på Lake Baringo Club, duschade och åt middag.

Totalt under dagen såg vi 139 arter, 208 arter totalt efter två dagar i Kenya.

21/12 Upp klockan 06 och iväg direkt med bilen, åkte upp till stora vägen och sedan norrut en liten bit. På vänster sida hade vi en långsträckt klippvägg och mycket passande upptäckte Stellan en Verreaux's Eagle som gled längs väggen för att sedan sätta sig på en klippa. Enligt Francis, som även var med idag, var klippörn ingen lätt art i området, så det var en bra start. Vid den hoppingivande skylten "All birds available" svängde vi ner mot foten av bergväggen.



Vegetationen under branten var som så ofta i Baringoområdet mycket torr och bestod mest av vassa taggbuskar och kaktusar, uppblandat med en del träd som på något märkligt sätt lyckats växa till sig bland termit-skorstenarna. Vi gick nedanför branten och skådade någon timme i behaglig temperatur innan solen stigit för högt. Ett par killar med en skock getter passerade, det verkade finnas hur mycket getter som helst i detta land. I fågelväg hade vi Shikra, Dideric Cuckoo, Red-fronted Barbet, Pygmy Batis, Mouse-colored Penduline Tit, Brown-tailed Apalis, Northern White-crowned Shrike, Grey Tit-Flycatcher (ledcolored), Beautiful Sunbird, Red-fronted Apalis (warbler) och White-bellied Canary.

Tillbaka till Club Baringo för sen frukost, i ett av trädgårdens träd satt två African Scops Owl väl



Bristle-crowned Starling *Onychognathus salvadorii*

kamouflerade, och när vi stod och tittade på dem rusade två stora Monitor Lizards förbi. I ett annat träd satt en sömning Verreaux's Eagle-Owl. Sedan visste Francis var man kunde se Slender-tailed Nightjar som brukade ligga i sanden på dagen. Två stycken låg där öppet på ca 5 meters håll men var otroligt svåra att få syn på. En bit intill låg dock en död hund och jäste i solen och luktade pyton. Francis hade också ett område där Greyish Eagle-Owl brukade sitta på dagen och efter ett tag hittade vi trädet där paret satt, en rätt bra uggle-dag! Vi hade dock missat Bristle-crowned Starling och Baringo var vår chans att se denna art, och på vägen ner mot Club Baringo fick vi syn på en lämplig kandidat som flög över och försvann ner mot de höga träden vid Cluben. Efter intensivt letande hittade vi två Bristle-crowned Starling i ett träd samt White-billed Buffalo-Weaver, Northern Brownbul och Yellow-bellied Eremomela.

Efter att ha ätit lunch åkte vi norrut mot Kapedo. Denna tur var egentligen oplanerad eftersom boendet däruppe var av det enklare slaget och vi skulle få laga middag

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

själv. Dessutom kunde det ibland vara lite stökigt i området med boskapsstölder och påföljande bråk. Chege frågade oss om vi ville åka upp dit istället för en till natt i Baringo och vi behövde inte lång betänketid för att tycka att det var en bra idé eftersom där fanns en del arter vi bara kunde få där. Förutom Francis följde en lokal guide som hette Cliff med, han kunde även den lokala varianten av språket som pratades norr om Kapedo vilket skulle visa sig vara användbart. Grusvägen upp till Kapedo var stundtals mycket dålig, och landskapet väldigt torrt, hett, dammigt och kargt. Vi tänkte att här kan ingen bo, men stannade vi och gick ut och skådade så hade vi efter 10 minuter typ 20 personer runt oss som envist hävdade att de ville ha pengar för något, vad som helst kändes det som.



Folket här, en del med traditionella kläder och vackra utsmyckningar, var misstänksamma mot besökare, och det gick absolut inte att ta några kort, varken på människorna, deras boskap eller landskapet om de såg på. Längs vägen hade vi Pygmy Falcon, Lichtenstein's Sandgrouse, Grey-headed Bushshrike, Slate-colored Boubou och strax innan Kapedo hörde vi Crested Lark.

Vi anlände till byn Kapedo efter skymningen och skulle bo i ett betonghus en finsk missionär (!) lät bygga på 70-talet, givetvis utrustat med bastu (vilket våra guider inte hade en aning om vad det var för ett rum, kanske inte så konstigt då temperaturen ute kl 23 var 33 grader och vår bastulängtan starkt begränsad. Men klart finnen skulle ha en bastu). Vi lagade mat tillsammans med två lokala killar, stekte lamm (grymt segt), lök och kokade spagetti. Efter maten tog killarna med oss till en å intill som rann ut från en varm källa. Vattnet var väldigt hett och det var en helt fantastisk känsla att i det totala mörkret ligga i hett vatten under en enormt klar stjärnhimmel. Helt klart en av resans höjdpunkter, och mycket oväntad. Anders försökte, lite väl optimistiskt i beckmörkret, skölja upp sitt enda par strumpor men det slutade tyvärr med att ena strumpan flöt i väg och inte gick att återfinna.

Dagen gav 139 arter vilket var resans högsta dagssumma, 209 arter totalt hittills.

22/12 Direkt efter uppgång kvart i fem gick vi ut i byn för att försöka se Somali Sparrow, och efter en kort stunds letande hittade vi ca 30 stycken, dessutom Somali Bunting och Magpie Shrike. Ett antal nyfikna bybor följde oss på håll, det kändes verkligen att det inte var vanligt med turister i denna del av Kenya. Efter att ha letat genom byn åkte vi ca 15 km norrut i det torra området på dålig väg, hade längs vägen Somali Fiscal, Ethiopian Swallow, Singing Bush Lark, Pale Prinia, Desert Cisticola, Straw-tailed Whydah. I området finns några relativt traditionellt levande folkstammar, Pokhot och Turkana, som inte kommer speciellt bra överens med varandra och som



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

inte brukar uppskatta övriga besök. När vi kom åkandes längs vägen stod en man på vägen där den korsade en uttorkad flodfåra och mannen vinkade att vi skulle stanna. Vad vi inte såg just då var att en annan figur, beväpnad med en AK-47, hade lagt sig intill vägen bakom en buske. Som tur var hade vi vår lokale guide Cliff som på det lokala språket frågade mannen vad han ville. Uppenbarligen förvånad över att det fanns någon i bilen som kunde prata deras språk svarade mannen att han ville ha lift till en annan by längre fram. Cliff förklarade att vi inte skulle dit utan avsåg leta efter fåglar ungefär här. Mannen nöjde sig med det och hans beväpnade kumpan kom fram från sitt gömställe och de båda lommade iväg. Cliff berättade för oss att vi sannolikt hade blivit rånade om han inte kunnat deras språk, de rånar tydligen inte varandra åtminstone. Vi hade inte svårt att tro Cliff, men sådana detaljer som överfall och rån hade vi inte tid att fundera på nu, utan vi fortsatta till fots in i buskarna i den uttorkade flodfåran i jakt på nya fåglar.

Tyvärr hittade vi inte målarterna Fox Kestrel och Swallow-tailed Kite, och det började bli sjukt varmt i den stekande solen fram på förmiddagen.

På vägen tillbaka kom två tjejer i spännande kläder och vackra halsringar gående och ville ha lift med oss. De var på väg till Kapedo och tillbaka under dagen, en promenad på ca 40 km. Cliff förklarade att de kunde åka med en liten bit men att vi sedan skulle stanna och skåda fåglar, något tjejerna inte alls trodde på.

Vi körde av vägen och in i buskmarken fram till en flod som märkligt nog rann genom det torra landskapet. Nere vid floden hade vi en del välbekanta vadare samt Striated Heron och Senegal Thick-knee.

Sedan tillbaka till Kapedo och den långa och otroligt skumpiga vägen ner till Baringo dit vi anlände på eftermiddagen. Vi hade inte ätit något alls under dagen förutom några torra kakor, så vi hade sett fram mot mat på Baringo Club. Chege hade även ringt och meddelat vår ankomst. Men när vi kom dit satt hela personalstyrkan i trädgården och strejkade, någon slags aktion mot ledningen som tvingats till en del nedskärningar bland annat tack vare det vikande antalet besökare sedan oroligheterna i landet vid senaste valet. Efter viss förvirring stod det klart att det enda vi kunde få serverat var vatten.

Vi fortsatte därför hungriga den långa resan mot Kitale som vi kom till strax före 22. Strax innan Kitale hände det lite kittlande att bilens motor på ett ögonblick la av helt mitt på vägen, och allt blev svart. Jag satt i passagerarsätet fram och greppade den ficklampa som låg mellan mig och Chege och lös framåt för att vi skulle se något i bekmörkret, och inte riskera att bli påkörda. Det visade sig att en sladd till batteriet skakat loss i ett gupp och det kunde fixas snabbt. Med tanke på det konstanta och mycket tröttsamma skumpanDET i håll och vägbulor kändes det otroligt att inte fler saker i bilen skakat sönder.

Vi checkade in på Kitale Golf Club i trevliga bungalower och åt en pepparstek, första maten för idag. En riktigt givande dag, men lite ansträngande med lång transportsträcka, ingen mat och hög värme.



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Men vad gör det när vi kan summera 108 arter idag, och 290 totalt under resan hittills. Dessutom var det kul att se lite spännande människor.

23/12 När vi skulle åka iväg på tidigt på morgonen var Chege inte där. Vi hade inte sett var han skulle sova och bilen såg vi inte heller till så vi antog att han bött någonstans intill och försökte förgäves ringa honom. Efter nästan en timme dök han upp, han hade sovit på golfklubben han med men gömt bilen väl. Varför han hade försovit sig fick vi aldrig någon klarhet i och det var väl för övrigt betydelselöst nu, men det var självklart irriterande att missa en viktig morgontimme. På grund av detta ändrades planen för förmiddagen och efter ett kort stopp i en skogsduge som gav Ross Turaco, begav vi oss mot området Kongelai Escarpment, ett bergigt område som sluttar ner mot ett lågland på gränsen mot Uganda. I bakgrunden bland molnen kunde Mount Elgon, 4321 möh, skymtas.



D'Arnauds Barbet *Trachyphonus darnaudii*

Vi körde över berget längs den slingriga vägen mot Kongelai och gick ur och skådade då vi såg något eller där det såg ut att finnas fågel. Bland det vi hittade fanns Mottled Swift, Hemprich's Hornbill, White-headed Barbet, Double-toothed Barbet, Scaly-throated Honeyguide, Orangebreasted Bushshrike, Yellow-throated Leaflove, Bronze-tailed Starling, Eastern Double-collared Sunbird, Little Sparrowhawk, Black Crake och African Emerald Cuckoo.

Området var väldigt torrt med flera helt uttorkade flodbäddar. Vid en av de uttorkade flodbäddarna hade vi Yellow-billed Shrike och Black-headed Gonolek. Vi passerade genom några byar och innan vi vände kom vi fram till en flod, Suam, med vatten där lokalbefolkningen tvättade och badade. I området och vid floden såg vi Abyssinian Scimitarbill, Abyssinian Roller, Silverbird, Grey Kestrel, Eastern Plantain-eater och Purple-banded Sunbird.

När vi vände började det skymma och längs vägen tillbaka lös vi på träden för att försöka hitta ugglor, och ibland stannade vi för att lyssna efter nattskärnor men tyvärr utan resultat.

134 arter under dagen och 337 totalt.

24/12 Julaftonen inleddes tio i fem med avfärd mot en by intill där några Heughlin's Masked Weavers bodde i ett träd mitt i byn, en vävare som annars är rätt svår. Efter lite väntan kom vävarna inflygande och satte sig i trädet innan de försvann in i sina bon. Även ca 30 Chestnut Weaver sågs i samma by. Därefter skådade



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

vi i landskapet omkring, längs en delvis uppodlad sluttning och vi hade Gabar Goshawk, Black-crowned Tchagra och Singing Cisticola. Tyvärr fick vi inte syn på den White-Crested Turaco som Chege hörde på håll. En damm intill innehöll bl.a en Purple Heron, Purple Swamphen, Brown Parisoma.

Vid lunch åkte vi in till staden Kitale och G4S kontor dit 2 på flyget borttappade väskor skulle ha levererats, och vi var alla spända på vilka som skulle få sin väska och vem som skulle bli utan



Red-tailed Bristlebill *Bleda syndactylus*


julklapp... Till Stellan's stora förvåning fick han sin väska, och även Andreas, som dock inte var särskilt förvånad. Anders väska var däremot fortfarande borta. Vi åkte ner till Kitale Golf Club för lunch och skådning intill golfbanan som låg bakom restaurangen. Över golfbanan flög mängder av svalor runt och Stellan kunde snart plocka ut några Grey-rumped Swallow. Även en Red-throated Wryneck satt i ett träd. Sedan bar det, med ett stopp vid en viadukt där Angola Swallow häckade, av mot Kakamega 3 timmar bort. Vi

checkade snabbt in på ett hotel i staden och övervägde för en liten stund att ta ett tidigt avslut på dagen, men Chege var påstridig att vi skulle köra de 16 km upp till Kakamega-skogen för en timmes skådning innan skymningen. Det var nog bra för vi såg några arter på resan endast vid detta tillfälle. Vi åkte alltså upp till Kakamegaskogens kant och skådade sedan längs huvudvägen in i skogen och hade bl.a. Purple-throated Cuckooshrike, Chapin's Flycatcher och en hörd Yellow-spotted Barbet .

Tillbaka vid hotellet var det riktigt skönt att efter en vecka i Afrikas värme få byta strumpor (i Anders fall att få på sig ett par strumpor) och kalsonger. Anders kunde ha Andreas kläder så även han fick ett rent ombyte och var nog egentligen rätt nöjd att slippa kånka på en stor väska resten av resan. På hotellet pågick någon form av juldisco hela natten med hög musik och fruktansvärda blinkande och spelande julgranar.

Dagen summerade 130 arter och totalt för resan var vi uppe i 365.

25/12 Vi gick upp halv sex och begav oss direkt mot Kakamega Forest. Kakamega är en av de få kvarvarande rester av den skog som en gång sträckte sig ända ut till atlantkusten och innehåller ett antal arter som i Kenya bara finns här. Skogen är ganska liten och man skådar från den väg som leder genom, samt från en del stigar och andra öppna områden. Med oss idag hade vi även en mycket



Blue Monkey *Cercopithecus mitis*

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

duktig och sympatisk lokal guide som hette Ben Obanda och som hade skådat i Kakamega i över tio år. Vi började i gryningen vid en plantskola, Tree Nursery och KEEP, sedan gick vi en stig därifrån ut till grusvägen som leder genom skogen. Hade här Slender-billed Greenbul, Lühder's Bushshrike, Western Olive Sunbird, Redheaded Malimbi, Black-and-White Mannikin, Black-billed Weaver, Stuhlmann's Starling, Black-faced Rufous Warbler, Yellow-billed Barbet (hörd), Scaly-breasted Illadopsis, Chestnut Wattle-eye, Equatorial Akalat, Dusky Crested Flycatcher, Olive-green Camaroptera, Mountain Illadopsis, Buff-throated Apalis, Kakamega Greenbul, Banded Prinia, Black-crowned Waxbill och ett gäng roliga Blue Monkey som jagade varandra i träden.



Chubb's Cisticola *Cisticola chubbi*

Sedan åkte vi ner mot Rondo Retreat Center, där det egentligen hade varit bäst att bo för att slippa åka till och från skogen. Att vi inte bodde här berodde sannolikt på att det var fullt, eller så var det mycket billigare att bo nere i samhället. I de stora träden vid RRC hade vi en av resans målarter Great Blue Turaco samt Vieillot's Black Weaver.

Därefter åkte vi vidare längs grusvägen ca en km och därefter gick vi in på en väg till höger och hade Chubb's

Cisticola, Blue Malkoha, Petit's Cuckooshrike och 2 ex av en annan målart Blue-headed Bee-eater, framvislad Bartailed Trogon, African Broadbill, Toro Olive Greenbul, Yellow-crested Woodpecker i håll, Little Grey Greenbul, och hörde White-tailed Rufous Thrush. Tyvärr började det regna på eftermiddagen och det fortsatte hela kvällen. Vi höll ut ändå och var inte tillbaka förrän vid 19-tiden. Vi åt middag och även ikväll pågick juldiscalot med enorm volym på hotellet.

Dagen gav 79 arter och 418 totalt, många var nya för resan och sågs endast här. Kakamega är ett måste om man vill få en bra artlista och vi hade tur att vädret ändå var så pass bra som det var idag. Till det vi tyvärr missade hörde bl.a. Grey Parrot.

26/12 Uppstigning halv sex och återigen upp mot Kakamega Forest. Det hade regnat hela natten och gjorde det fortfarande så vägen var mycket lerig. Även idag var Ben med oss och vi skådade mestadels längs vägen i regnet, tyvärr var det ganska lite fågel. Regnet upphörde först vid 11-tiden. Idag gick vi även in i trädgården på Rondo Retreat Centre och när regnet nu hade slutat fick vi in en del bra arter. Speciellt kan nämnas Palm-nut Vulture (tydligt rätt svår här), White-spotted Flufftail (hörd), African Pygmy Kingfisher, Blue-headed Bee-eater, White-headed Wood Hoopoe, Thick-billed Honeyguide, Tullberg's Woodpecker, Bocage's Bushshrike, Mackinnon's Shrike, Red-bellied Paradise-flycatcher, Dusky Tit, Honeyguide Greenbul, Green Hylia, Turner's Eremomela, Grey-winged Robin-Chat, Grey-chinned Sunbird, Black-necked Weaver och ett par Oriole Finch.

Vi hade haft en och en halv dag i Kakamega, plus första kvällen, och tack vare hårt slit både från oss själva samt våra duktiga guider hade vi sett de flesta av målarterna. Men det hade inte varit fel att haft en heldag till här, speciellt som en del skådning kan försämrats vid intensivt regn. För maximal utdelning är nog Rondo Retreat Centre bäst att bo på, och se till att boka upp Ben som guide!

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Vid halv fyra var vi tillbaka vid hotellet för en sen lunch och sedan åkte vi mot staden Busia på gränsen mot Uganda. Vid bron över Nzoia efter staden Mumias stannade vi för att hänga in Rock Pratincole som alltid brukade stå på några stenar i det forsande vattnet. Men idag var vadarsvalorna irriterande nog borta trots att vi letade ganska länge på båda sidor om bron som skakade rejält när lastbilar körde över den. Däremot hade vi bättre lycka med nattskärnor på ett öppet område strax innan Busia i skymningen. Vi såg och hörde Swamp Nightjar samt en annan nattskärna, men den senare lyckades vi inte identifiera säkert. Väl i Busia tog vi ut pengar i en automat och anlände därefter till Blue York Hotel strax efter åtta. Här genomled vi resans sämsta middag, något som kallades Chicken Maryland och som förmodligen hade legat i fritösen sedan lunch och serverades med en sådan där äcklig korv och friterad banan.

Dagen gav 103 arter och totalt var vi uppe i 438.

27/12 Under natten vräkte regnet ner, vårt beställda frukostpaket var försenat så vi kom inte iväg innan halv sju. Vi åkte direkt, med kort stopp för den Senegal Coucal som flög över vägen,



Nzoia

tillbaka till bron över Nzoia för att återigen försöka på Rock Pratincole. Tyvärr samma nedslående resultat som igår men i alla fall Western Citril och Angola Swallow sågs under den timme vi var där. Sedan skådade vi oss tillbaka längs vägen mot Busia och nu tittade solen återigen fram, vi hade Marsh Tchagra, Purple Starling, Moustached Grass Warbler, Black-bellied Firefinch. Vi hade även en lång obs av två rovfåglar som skruvade och långsamt gled över vägen och vi hade vissa bekymmer med att identifiera dem, men att den ena

som var en ormörn var en Beaudouin's Snake Eagle stod klart efter läsning av den litteratur vi hade med.

I anslutning till en lite större å som vägen korsade gick vi runt någon timme i ett delvis uppodlat landskap och fick äntligen se White-crested Turaco riktigt fint i toppen av ett träd. Här även Alpine och Mottled Swift, Bar-breasted Firefinch, Compact Weaver, Fawn-breasted Waxbill, Cardinal Quelea, Klaas's Cuckoo och en skruv med ca 300 Open-billed Stork.

När vi kom tillbaka till bilen upptäckte vi att någon hade krossat en sidobakruta. Ingenting i bilen var dock stulet, kanske hade marodören blivit avbruten i sin gärning. Några av oss hade tubarna kvar i bilen, i och för sig täckta med filter, och det var en lättnad att de var kvar. Chege blev däremot väldigt butter resten av dagen.

Vi åkte via en polisstation för skadeanmälan tillbaka till Blue York Hotel för lunch, och sedan påbörjade vi resan ner mot Kisumu vid Victoriasjöns östra strand. Vid Rio Sio stannade vi och spanade över några öppna fält efter Blue-breasted Bee-eater, och efter en stund fick vi syn på en liten flock. Hörde även Lesser Moorhen och såg Black-headed Weaver (Yellow-backed) här. Längs vägen även Black Bishop från bilen.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Vi fortsatte men tog av första höger efter Rio Sio, körde kanske 1 km och parkerade bilen vid en gård och gick upp mot några trädlösa höga gräskullar. Ett mycket trivsamt område, benämnt Busia Grasslands eller Matayos, och en väldigt fin kväll. Hittade målarten Whistling Cisticola samt Long-billed Pipit och Copper Sunbird.

Resan ner mot Kisumu tog sedan ytterligare 2 timmar i mörker på samma tröttsamma vägar med stora håll, tvära fartgupp och trafikanter utan lampor. Samtidigt som en Barn Owl skrek till checkade vi in på Sunset Hotel, och åt slutligen en sen middag.

Dagen gav 115 arter och vi var uppe i 469 totalt.

28/12 Uppstigning halv sex och direkt iväg mot området Dunga vid Victoriasjöns stora papyrusbälten. På vägen dit stannade vi kort vid skymten av siluetten av en Broad-billed Roller på en ledning. I papyrusen skulle ett antal specialer in, och vi skådade från några stigar i utkanten av vassen. Vi lyckades med den vackra Papyrus Gonolek, hade Greater Swamp Warbler, African Reed Warbler, Swamp Flycatcher, White-winged Swamp Warbler (hörd),



Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri*

Slender-billed Weaver, Northern Brown-throated Weaver, Papyrus Canary och Carruthers's Cisticola men dippade tyvärr Papyrus Yellow Warbler. Även Little Bittern och ett gäng Fulvous Whistling Duck flög förbi, annars var det den otroliga mängden svalor som övernattade i vassen och nu flög runt i stora moln som var fascinerande. Bland husen intill hittade vi Village Indigobird, och en Eastern Plantain-eater satt och åt upp ett träd i en trädgård.

Sedan åkte vi upp till hotellet för en något sen frukost. I en trädgård intill hotellet hade vi en Yellow-fronted Tinkerbird. Rent allmänt hade vi bra flyt på tinkerbirds och barbets under resan tyckte Chege.



Papyrus och svalor

Chege var tvungen att fixa något okänt ärende inne i stan och vi kom därför iväg lite sent mot Masai Mara. På väg ut ur Kisumu satt en Abdim Stork på ett tak och en African Cuckoo på en ledning, och på ett risfält till höger om vägen ganska nära Kisumu hade vi Long-toed Lapwing och Southern Red Bishop. En sen lunch intogs i Kisuu, och därefter tog vi en genväg över Ooloolo Escarpment mot Masai Mara, en

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10



mindre väg som efter en stund blev helt förvandlad till svart lervälling av den senaste tidens intensiva regnande. Chege körde bitvis på vägen, bitvis väldigt långt från vägen, bitvis i diket och vi trodde flera gånger att vi satt totalt fast, speciellt när bilen uppe på den snorhala vägbanken närmast gjorde en centrumsväng och befann sig stående med branta diken både framför och bakom. Vi såg framför oss en intressant natt med lejonerna kraftsande på bilens trasiga sidoruta, men på

något vis lyckades Chege få bilen ur leran, otroligt skickligt gjort, och vi kunde mycket lättade anlända till Masai Mara West Camp efter mörkrets inbrott. Det hade varit otroligt tråkigt att missa Masai Mara, och ett tag såg det mörkt ut.

Efter lite administrativt trassel kunde vi checka in i två bungalowsliknande tält och äta en väldigt fin middag i den lyxiga huvudbyggnaden. Helt klart en kontrast mot både oss själva som vid detta laget var ganska skitiga (jag och Anders hade tack vare väskstrulet t.ex. bara de enda par byxor vi hade på oss hela tiden under hela resan) , och de ställen vi hittills bott på.

Under dagen såg vi 117 arter, totalen var uppe i 491.

29/12 Vi inledde dagen med skådning runt campen och längs sluttningen ner mot Masai Mara. Det var nästan lite överkligt att stå och titta ut över den enorma slätten och på långt håll se giraffer, zebror, bufflar och andra djur. Längs sluttningens sida kom en hel del rovfåglar och gamar svävande när termiken började, däribland Brown Snake Eagle, Booted Eagle och en lite mer oväntad Asian Imperial Eagle. Av fåglar omkring campen kan nämnas Thick-billed (Grosbeak) Weaver, White-necked Raven, Familiar Chat, Miombo Wren-Warbler, Schalow's Turaco (hörd), Trilling Cisticola, Rock-loving Cisticola och Icterine Warbler.

Vid klockan två åkte vi ner till Oloololo Gate för en tur i parken, till stor del för att se de djuren och då framförallt gepard som vi alla saknade. Chege tyckte dock det var trist med stora djur, han ville helst leta tättingar istället. Tack vare det omfattande regnandet (ovanligt för denna årstid) gick det bara att köra på vissa av vägarna och däggdjuren var svårlokaliserade när det fanns vatten att dricka överallt. Efter en stund mötte vi dock en jeep som sa att de hade sett en gepard en bit härifrån. Vi satte av i hög hastighet och efter en stund fick vi syn på den långa katten när den lommade iväg i gräset. Ingen porrobs direkt, men vid några tillfällen vände den på huvudet



Lion *Panthera leo*

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

och de karakteristiska mörka tårarna kunde tydligt ses i ansiktet. Riktigt skönt att äntligen få se gepard tyckte framförallt jag som speciellt gillar katter.

Vi fortsatte genom MM och en stund senare kom vi fram till en jordhög där 3 lejoninnor låg och lät sig fotograferas på rätt nära håll. "Can we go back to the birdwatching business now?" var Cheges kommentar när vi fotat oss mätta. Under tiden vi tittade på lejonerna blev himlen djupt blåsvart och en molnfront drog in med en enorm regnskur som följde, som tur var blev den kortvarig. Vi körde ut ur parken och upp mot Masai Mara West och hoppades att inte regnet spolat bort vägen dit. Precis vid gatan gick en svart noshörning och sedan skådade vi i det sista ljuset längs slutningen upp mot campen. Speciellt Usambiro Barbet (ras av D'Arnaud's Barbet) kan nämnas.

Även denna kväll var middagen utsökt, och vi lyxade till det med en skön dusch innan. Dagen gav 126 arter, 519 totalt.

30/12 Ut strax efter 06, skådade från campen i riktning mot Oolololo. Soluppgången över Masai Mara var fullständigt magisk med låga dimmoln över slätten och vackra regnmoln som drog bort när solen började värma. Några luftballonger lyfte även från slättlandet framför oss. Vi körde ner i parken och direkt genom via

Serena Lodge där vi stannade kort. Vi var glada att vi inte bodde här, stället kändes kommersiellt och lyxigt och gästerna verkade inte vara intresserade av naturen utanför området swimmingpool. I MM hade vi Kurrichane (Common) Buttonquail, Black-bellied Bustard, Red-breasted (Rufous-chested) Swallow (ny för Chege), Black-backed Cisticola, Croaking Cisticola, Goliath Heron, African Quail-Finch, Grey-capped Social Weaver, och efter lite riktat eftersök i lämplig biotop till sist Rosy-throated Longclaw och White-tailed Lark.



Masai Mara



Red-breasted Swallow *Cecropis semirufa*

Lunchen åt vi på biltaket i skuggan av ett träd och fick då syn på en vacker Cerval som smög omkring i gräset en bit bort.

Vi lämnade Masai Mara via Sekenani gate där vi blev mer eller mindre överfallna av ett gäng grymt jobbiga Masai-kvinnor som tryckte upp filter, smycken, trädkulpturer och annat krimskrams i ansiktet på oss trots att vi vänligt sa att vi inget ville ha. Som så

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

ofta när en nationalpark lämnas blir kontrasten mot civilisationens nackdelar lite väldigt påtaglig. Därefter följde en lång transport mot Naivasha på inledningsvis dåliga vägar. Från bilen lyckades vi strax utanför MM hitta White-bellied Bustard, Double-banded Courser, Fischer's Sparrow-Lark. Vi tog ut pengar i den ruffiga staden Narok, sedan blev vägen lite bättre. Runt omkring oss syntes stora regnmoln och vi såg hur det åskade och regnade kraftigt på flera ställen, och på flera ställen kunde vi se spår av översvämningar och bortspolade vägbankar och vi hoppades att vår färd inte skulle störas ytterligare av regnet. Vid åtta kom vi fram till lodgen i Naivasha där vi fick klättra upp för en lång trappa innan vi kom till vårt rum. Fint ställe med utsikt och ganska bra mat, men ingen öl! Vi avtalade med en av killarna i restaurangen att han skulle fixa öl till oss till i morgon som ju faktiskt var nyårsafton.

125 arter under dagen, totalen uppe på 532.

31/12 Upp strax efter fem och iväg mot Nairobi-hållet och sedan en timmes färd upp mot Gatamaiyu Forest, belägen ganska nära stora vägen. Denna skog skulle vi egentligen besökt första morgonen men fick då strunta i den då tack vare flygförseningen. På väg upp mot skogen körde vi över en liten å och längst bort i kröken låg en African Black Duck. Vi parkerade vid "the office building" och promenerade längs vägen genom skogen. Efter några dagars bilburen skådning var det skönt att få gå runt och skåda igen, och skogen var riktigt fin och vi hade bra flyt med målarterna där ett flertal endast sågs här under resan. Green Ibis skulle ha häckat här i år, men boet var tyvärr tomt nu. Efter att ha skådat genom skogen åt vi medhavd lunch i gräset vid Office Building. I Gatamaiyu hade vi bl.a. Lemon Dove, Hartlaub's Turaco, Scarce Swift, Bar-tailed Trogon, Silvery-cheeked Hornbill, Moustached Tinkerbird, Black-fronted Bushshrike, Grey Cuckooshrike, Mountain Oriole, White-tailed Crested Flycatcher, Black-throated Apalis, Chestnut-throated Apalis, Grey Apalis, Black-collared Apalis, Olive-breasted Greenbul, African Hill Babbler, Abbott's Starling, Sharpe's Starling, Waller's Starling, White-starred Robin, Grey-headed Nigrita, Yellow-bellied Waxbill och Thick-billed Seedeater.



Common Hippopotamus *Hippopotamus amphibius*

Därefter åkte vi till Kinangop Plateau där vi var första dagen, detta för att komplettera med Black-winged Plover som vi hittade 10 exemplar av ganska omgående. Även 2 stycken Sharpe's Longclaw och Long-tailed Widowbird sågs. Efter det åkte vi ner till Lake Naivasha och tog en båtut i den södra delen av sjön bort till Elsamere. Längs stränderna stod mycket vadare, bl.a. Kittlitz's Plover och i sjön fanns det en del flodhästar och pelikaner och Grey-hooded Gull.

Visserligen var det lite skönt att få vara ute på sjön ett tag, men båtturen kan strykas från programmet utan att man missar något.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Uppe vid lodgen pågick något slags nyårsfirande, en betydande del av de andra gästerna var Babtister från USA och vi började på en gång ana oråd angående vår avtalade öl. Vår öl skulle dock komma, det var inga bekymmer lovade öl-killen oss. Underhållningen denna nyårsafton bestod av Discovery Channel på duk och hög (lokal?) musik, det eldades även kol i tunnor inne i matsalen så luften var minst sagt dålig. Rätt var det var kom det in ett gäng Masaier och hoppade upp och ner till Babtisternas förtjusning. Maten var tyvärr ungefär lika dålig som luften och när vi pressade öl-killen lite så stod det klart att någon öl inte skulle komma, man fick inte dricka alkohol på detta ställe. Efter det chockbeskedet, det var ju ändå nyårsafton, återvände vi till vårt rum där vi hade ett annat litet lager öl, tyvärr ca 30 grader varmt. Jag pratade kort med dem hemma i Sverige på telefon, där var det just nu kallare än minus 30 grader.

116 arter sågs under dagen, totalt var vi uppe i 568.

1/1 Avfärd kvart i sex upp mot Aberdare National Park, en stigning upp till över 3200 meter över havet. För att vara nyårsdagen var vi anmärkningsvärt fräscha, vi mindes med fasa förra årets mycket jobbiga baksmälla i Ecuadors amazonas. Vädret var nu fint men det kändes riktigt kallt häruppe och långkalsongerna åkte på. Längs stigningen innan NP-gränsen fick vi in några målarter, bl.a. Jackson's Francolin, Tacazze Sunbird, Scarlet-tufted Sunbird och Mountain Yellow Warbler, men tyvärr missade vi vår sista chans på Green Ibis som tydligen kan ses flygande över skogen på morgonen. Bergsryggen Aberdare är till ganska stor del täckt av tät skog och det var en väldigt vacker morgon. Inne i nationalparken får man inte lämna bilen eftersom det finns leoparder, elefanter och annat. Precis vid Mutubio West Gate där vi åkte in flög



Jackson's Francolin *Pternistis jacksoni*

några Slender-billed Starling över, tyvärr missade jag dem. Annars var vår lista på starar rätt bra nu.

Vi åkte genom parken, fina vyer men rätt lite fågel och sedan ut genom Arch's gate. I parken hade vi bl.a. Red-fronted Parrot, White-headed Wood Hoopoe, Levaillant's Cisticola, Moorland (Alpine) Chat, Abyssinian Crimsonwing samt elefant, bushbuck och waterbuck.

Sedan svängde vi norrut, hade Jackson's Widowbird från bilen, och plockade upp en lokal kille som visste var det fanns ett häckande par Cape Eagle Owl (ras Mackinder). Uvarna satt på plats på en klippfylla i ett annars uppodlat landskap. Chege berättade att folket tidigare försökte skrämman bort ugglor eftersom de förknippades med döden. Nu informerade frivilliga krafter bönderna om att ugglorna är bra på att ta smågnagare och därmed gynnar bönderna, samt att de kan tjäna lite extra pengar på att skådare kommer hit och tittar på ugglorna.

Efter att ha gett grabben bra lön för mödan fortsatte vi via Nyeri ner till Wajee Nature Park Camp Site för två målarter, endemen Hinde's Babbler och African Wood Owl. Vi letade i en trädklädd ravin och efter en stund hittade vi 4 stycken Hinde's, och efter en stund kom en lokal kille och visade in oss på

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

2 stycken African Wood-Owl som satt på dagkvist i den mycket täta och låga skogen. Vid det här laget var vi rätt trötta och hungriga, hade bara fått ett litet frukostpaket bestående av en skiva sockerkaka, ett blått ägg, en äcklig korv, en liten banan och småkakor och chips på hela dagen. Anlände till Thika och Blue Post Hotel vid åtta. Här packade vi om lite inför turen upp i nordost. Vi ville inte släpa på för mycket saker i de trakterna, och dessutom skulle vi få sällskap i bilen förstod vi. Eftersom Chege bodde i Thika kunde vi lämna lite grejor hos honom.

Dagen gav 90 arter och totalt var vi uppe i 585.

2/1 Lite sovmorgon till halv sju och sedan promenad från hotellet ner mot en å och Thika Falls. Precis när vi kommit ner till vattnet får vi se en hona African Finfoot snabbt simma över ån,



African Finfoot *Podica senegalensis*

bara det oväntat och häftigt. Strax därpå kommer hanen och han går i land i strandkanten på andra sidan och knatar omkring helt öppet på stenarna! Ska inte detta vara en superskulkare? Vi fortsätter ner längs ån och har bl.a. Grey-Olive Greenbul, Sombre Greenbul, Redfaced Cisticola, African Citril.

Tillbaka till hotellet för frukost och sedan åkte Chege ner till staden för att laga bilen, (sidorutan och hastighetsmätaren) samt handla mat

enligt Stellans inköpslista inför vår trip upp till de nordöstra delarna av landet. Handlingen tog tid och vi kom iväg först kl 13 på vår färd mot Garissa. Vägen var dock med Kenyanska mått mätt av god kvalitet och vi körde genom ödsliga områden där de fåtaliga byarna såg väldigt spartanska och fattiga ut, till och med med Kenyanska mått mätt. Eftersom vi började närma oss gränstrakterna mot Somalia och dess problem fanns det rätt mycket vägspärrar och automatvapenutrustade poliser. Några korta stopp för skådning längs vägen gav bl.a. Red-bellied Parrot och African Bare-eyed Thrush. Under eftermiddagen såg vi en hel del europeiska blåkråkor som alla flög åt samma håll, i riktning mot dit vi skulle. Chege sa att de flyger mot områden där det har regnat för att det samlas mycket insekter där.

Den sista biten in mot Garissa var annorlunda mot det Kenya vi sett hittills. Detta var muslimskt område och många kvinnor var klädda i nikhab med endast ögonen synliga. Vi åkte direkt till polisstationen där Chege skulle förhöra sig om det aktuella säkerhetsläget samt ordna



European Roller *Coracias garrulus*

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

med beväpnad eskort inför i morgon. Vi kom till Nomad Place Hotel vid halv åtta och checkade in samtidigt som böneutroparen drog igång. Det var fruktansvärt varmt, fortfarande ca 35 grader på kvällen, men hotellet var rätt fint och hade luftkonditionering. Vi åt bra biff och pommes, men vår medhavda öl fick vi dricka i smyg på hotellrummet.

Under dagen sågs 78 arter och vi hade nu efter 15 dagar passerat 600 och nått 608 arter. Vi började inse att det gick riktigt bra.

3/1 Nomadhotellet hade riktigt fin frukost som vi fick kasta i oss för att komma iväg snabbt. På väg ut från hotellet plockade vi upp två poliser som hoppade in i bilen och satt längst bak med sina automatkarbiner i knät. Dessa herrar skulle stå för vårt närskydd de kommande två dagarna uppe i de bandittrakter vi skulle skåda i, området är inte direkt hyllat i guideböckerna (typ "don't go there"). Chege sa att det för tillfället var relativt lugnt, men att



Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis*

det ibland var skärmytslingar mellan byarna som beboddes av ett särdeles tjuvaktigt och ondsint folkslag(!). Dessutom kom det in en del flyktingar från krigets Somalia samt att piraterna ute till sjöss kommer hit och säljer sina byten vilket drar till sig ytterligare kriminalitet. Det kändes lite spännande att åka upp hit, både med tanke på fåglarna och att inte så många andra turister brukade hänga här.

I Garissas utkanter var det otroligt skräpigt och många Marabou-storkar gick runt och slet i skräpet. Vi passerade några vägsparrar och något som såg ut som flyktingläger på vår väg upp mot Habaswein. Området var mycket ödsligt, sandigt och torrt och vägen blev snart endast en försänkning i sanden. De fåtaliga byar som fanns bestod av hus gjorda av torra kvistar och lera. Dock hade det regnat nyligen och växtligheten var delvis grön, något som var mycket ovanligt och Chege och poliserna hade aldrig sett området så här. Ett enormt antal vitfjärilar var på flytt och det verkade dra till sig fåglar. Bland annat såg vi ca 150 Grasshopper Buzzard som normalt ses i rätt få antal.

Att det var otroligt varmt även här kanske inte behöver nämnas, och vi tog faktiskt siesta under ett träd vid lunchtid. Vi skådade från bilen och stannade då och då för att undersöka närområdet lite mer noggrant, hade bl.a. Upcher's Warbler, White-throated Robin. Några månader innan vår resa hade några skådare från Birdwatching Eastafrica varit upp hit och sett en del bra arter, annars var det ganska okänd terräng även för Chege. På ett av stoppen lyckades vi få in en av de svåraste arterna, Collared Lark, som vi först hörde sedan även fick fina obsar på, sannolikt var det två ex. Hade i övrigt Pringle's Puffback, Three-streaked Tchagra, Red-naped Bushshrike, Upcher's Warbler, Somali Crombec, Shelley's Starling, Pale Flycatcher (Wajir), Northern Grosbeak-Canary, Levant Sparrowhawk, Spotted Thick-knee, Great Spotted Cuckoo, och på ett ställe rusade en Somali Ostrich över vägen.



Innan det blev skymning körde vi av vägen och ut i ett buskigt område för att slå upp våra enkla campingtält på behörigt avstånd från vägen. Där lagade vi mat på gasolkök och tittade på den fantastiska stjärnhimmel som fanns över oss. Våra poliser blev väldigt fascinerade av att få titta på planeterna i tubarna och höra oss berätta om himlakropparna, de sa sig aldrig ha funderat närmare över sådant. De hade heller aldrig tidigare blivit serverade spagetti och Stellans pastasås, men gillade maten lika mycket som vi andra. Poliserna hade nu släppt lite på sin till en början något formella stil och det var väldigt intressant att sitta och prata med dem om våra väldigt olika länder, livssituationer och valmöjligheter.

I tältet var det trots den sena kvällen bisarrt varmt, så varmt att vi låg och tokskrattade åt att det var så varmt. Kanske hjälpte den öl vi drack till, den var så varm att det kändes som att drycken förångades innan den nådde svalget.

Utanför tältet hördes Donaldson-Smith's Nightjar spela.

91 arter idag, 630 totalt under resan.

4/1 Tidig uppgång, och utanför sjöng fåglarna intensivt från de torra buskarna. Efter en enkel frukost med kaffe och vitt bröd åkte vi vidare mot Mado Gashi. Vi körde genom en liten by och stannade efter några hundra meter vid en liten skogsdunge och gick in i den för att skåda. När vi kom tillbaka till bilen var vår ena polis som vaktat bilen inbegripen i en högljudd diskussion med ett femtontal bybor, där vissa var utrustade med klubbor och stenar. Polisen berättade för oss att byborna befarade att vi skulle ta deras mark och skogsdungen ifrån dem och tänkte därför naturligtvis slå sönder vår bil. Situationen kändes dock snarare märklig än hotfull, och vi förklarade via polisen att vi var här för att titta på fåglar och visade lite bilder på fåglar i böckerna. Efter en stunds betraktande av fågelböckernas bilder frågade byborna efter malariapiller och smärtstillande piller, och vi skänkte dem en pillerkarta varpå alla blev enormt tacksamma och byäldsten skakade hand med oss. När vi åkte därifrån vinkade alla farväl och vi kunde koncentrera oss på fåglarna igen. Ett fascinerande land minst sagt.



Chestnut-bellied Sandgrouse *Pterocles exustus*

Vägen, eller fördjupningen i sanden, var nu ännu sämre och lösare och vi körde nästan fast vid något tillfälle. Alldeles innan Mado Gashi körde vi ut i

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

buskmarken, hade Chestnut-bellied Sandgrouse, Taita Fiscal, Donaldson-Smith's Sparrow-Weaver och plötsligt skriker Stellan "Scissor-tailed Kite"! Vår drömart kommer flygande rakt framför oss och passerar på kanske 100 meters håll. Chege blir tokig av lycka, detta var den fågelart han hade velat se allra helst sedan han började skåda. Vi fortsatte genom Mado Gashi, fick en hel del misstänksamma



Somali Courser *Cursorius somalensis*

blickar på oss från folket här, och fortsatte en liten bit norrut för att leta Heuglin's Bustard men tyvärr utan framgång. Däremot Somali Courser, Three-banded Plover, Somali Bee-eater och 10 Red-billed Quelea i ett träd. Det hade varit intressant att fortsätta ännu längre upp i detta av västerländska skådare utforskade område, men vi var tvungna att vända tillbaka och körde den långa vägen utan särskilt många stopp ner till Garissa där vi

tackade våra poliser för trevligt sällskap och släppte av dem.

På Nomadhotellet åt vi en god Club Sandwich innan vi, via ett snabbt stopp för Northern Carmine Bee-eater på ledning, fortsatte ner mot Thika för att hämta den packning vi lämnat där tidigare. Vi passerade säkert 10 vägspärrar under dagen innan vi slutligen vid 23-tiden anlände till Sirona Hotel i Nairobi, ett riktigt sunkigt ställe. Det kändes lite skönt att ha lämnat den del av Kenya vi kände lite osäkerhet inför innan resan. Samtidigt var det på ett sätt den mest fascinerande delen av landet att se.

77 arter under dagen, 651 totalt

5/1 Uppgång före klockan sex, hotellpersonalen låg och sov i lobbyn och någon frukost fanns inte att uppbringa. Chege som sovit på okänd ort var en halvtimme sen med förklaringen att han tvingats köra en annan väg eftersom det var strejk bland Matuto-förarna och han ville inte bli misstänkt för att vara strejkförbrytare. När Chege slutligen dök upp åkte vi direkt mot Nairobi National Park där vi skådade till klockan tre.

Nairobi NP, som ligger alldeles intill staden och rakt under inflygningen till flygplatsen, har en hel del djur och känns inte alls så djurparksaktig som man först skulle kunna tro. Och skådningen är bra med ett antal målarter, i parken hade vi bl.a. African Finfoot, Saddle-billed Stork, Secretarybird, Hartlaub's Bustard, Temminck's Courser, Greater Honeyguide, Brown-backed



Kori Bustard *Ardeotis kori*

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Woodpecker, Fawn-colored Lark, Athi Short-toed Lark, Short-tailed Lark, Dark-Capped Yellow Warbler, Northern Pied Babbler, Abyssinian White-eye och Nairobi Pipit.

Efter det körde vi till Nairobi Jockey Club för att leta upp Brown-backed Scrub Robin.

Eftersom vi skulle laga mat själva till kvällen handlade vi mat i förorten Karen, och fortsatte mot Olorgesailie. Under färden dit regnade det mycket kraftigt, och en del vatten rann rakt ner i bilens



Olorgesailie

kupé, och på flera ställen forsade vatten fram över vägbanan och stenar och annan bråte hade spolats med. Det kändes en aning läskigt att passera genom det bruna vattnet eftersom det var svårt att säga hur det såg ut under, säkert skulle hela vägen kunna spolas iväg om regnet fortsatte. Väl framme så slutade regnet, även om

blixtar fortfarande syntes runtomkring oss,

och vi kunde med sällskap av ett gäng hungriga katter laga mat på gasolkök under ett stort plåttak. Sov gjorde vi i fasta tält intill och utanför sågs och hördes Sombre (Dusky) Nightjar. Chege som natten innan rensat bilens kylare från ökensand och bara fått en timmes sömn, somnade på bordet under middagen.

Vi såg 135 arter under dagen.

6/1 Hela natten satt en Red-chested Cuckoo och visslade utanför tälten, och vi steg till sist upp vid halv sju. Åt enkel frukost med vitt bröd, honung och kaffe från gasolköket samtidigt som solen gick upp över Olorgesailie, en platt slätt som i förhistorisk tid var en sjö. Här har arkeologer gjort omfattande utgrävningar och hittat yxor som tillverkats



Grey-capped Social Weaver *Pseudonigrita arnaudi*

för ca 900 000 år sedan. Vi skådade lite i den omgivande terrängen och det var lite coolt att tänka att här på samma plats hade någon gått runt och skådat för 900 000 år sedan, undrar vad de hade sett för arter då? Vi nutida skådare hade i alla fall Spotted Eagle Owl, Spotted Palm Thrush och Grey-capped Social Weaver.


Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Vi åkte tillbaka mot Nairobi på förmiddagen och gjorde några stopp här och var och fick in några bra arter, Ashy Cisticola, Tiny Cisticola, Great Reed Warbler, Banded Parus och Southern Grosbeak Canary samt tog upp en liftande pojke i skoluniform som verkat missat skolbussen. Av gårdagens skyfall syntes det grus och de stenar vattnet fört med sig upp på vägen, och på ett ställe hade hela vägbanken lagats under morgonen. Till Cheges frustration missade vi några normalt vanliga arter här som sannolikt regnet hade skrämt väg, t.ex. Steel-bue Whydah och Cut-throat Finch. Vi fortsatte ner mot staden Voi, en lång transportsträcka där vi tog vägen via Nairobi eftersom vi misstänkte att den kortare genvägen över bergen var bortspolad.

Fortfarande saknade vi Pangani Longclaw, trots att vi letat intensivt igår i Nairobi NP, så när vi passerade några lämpliga fält ("Machapes Area", intill avtagsvägen från A104) stannade vi och Chege hittade en Pangani omgående! Sedan vidare iväg mot Voi, med snabbt stopp vid Hunter's Lodge där vi hade African Golden Weaver. När vi kom till Voi hade vi inget bokad boende och Chege verkade inte riktigt veta vart vi skulle ta vägen. Efter lite väntan och telefonsamtal checkade vi sent och trötta in på Silent Guest Resort.

96 arter sågs under dagen, totalt under resan var vi uppe i 660, det började se riktigt bra ut för en fantastisk totalsumma.

7/1 Upp före klockan 05 för att komma iväg tidigt mot Taita hills där några av resans viktigaste målarter fanns. Vägen upp blev till sist mycket smal och enormt brant, men till sist var vi uppe och kunde börja leta efter Taita Thrush i skogen som växte på berget. 2 lokala killar hjälpte även till, men den första timmen såg vi knappt en fågel trots att vi verkligen jobbade hårt. Sedan hittade en av de som hjälpte till en Taita Thrush inne i ett risigt område, och vi andra fick åla oss



Von der Decken's Hornbill *Tockus deckeni*

fram på mage för att få en hyfsad skymt av den skulkande trasten som hoppade runt tyst och diskret. Taita White-eye gick lättare och Taita Apalis tog ca 20 minuter att hitta en bit upp i de höga träden. Dessutom hade vi Yellow-throated Woodland Warbler och Stripe-faced Greenbul. Därefter frukost vid bilen omgivna av ett par Hartlaub's Turacos och sedan nerfärd efter en lyckad morgon.

Efter första backen tog vi nu vänster och körde en annan väg ner. Plötsligt fick vi syn på en stor rovfågel som gled över en bergssida, en Crowned Eagle! En lite oväntad men väldigt fin obs på denna örn som vi tre år tidigare missade försmädligt i Sydafrika. Här sågs även Striped Pipit hoppande på ett fält och Pallid Honeyguide. Sedan ner till Voi, hämtade väskorna och fortsatte ner mot kusten, men först ett stopp vid en buske utanför samhället för Tsavo Sunbird

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Lunch åt vi på Ngutuni Lodge och hade här även Martial Eagle, en flock Cut-throat Finch, innan vi fortsatte ner mot Malindi. En lång och tröttsam resa, speciellt omkring Mombasa där det var mycket trafik.

87 arter idag, 672 totalt.

8/1 Upp tidigt och direkt till Arabuko-Sokoke Forest, en av de större fåtaliga resterna av den kustnära regnskog som en gång täckte kusten. I skogen finns en hel del viktiga arter, och inte minst det märkliga djuret Elephant Shrew, en slags tvåfärgad långbent fet råtta med elefantsnabel. Vi gick runt i skogen intill huvudentrén och skådade tillsammans med den lokale och mycket skicklige guiden Willie. Även om vi tittade upp mot trädkronorna för det mesta började jag leta efter Elephant Shrewen som naturligt höll sig längs marken och ofta avslöjades genom lövprassel.

Vi hade Green Barbet, Scaly Babbler, Little Yellow Flycatcher, Retz's Helmetshrike, Verreaux's Eagle Owl, Eastern Bearded Scrub Robin, de svåra East Coast Akalat och Forest Batis invisslade på mycket nära håll av Willie, Plain-backed Sunbird, Pale Batis, Chestnut-fronted Helmetshrike, Terrestrial Greenbul, Ashy Flycatcher, Blue-mantled Crested Flycatcher, ett par Amani Sunbird plus juv, och sedan letade vi länge efter Sokoke Pipit tills vi såg den bra, hörde Mombasa Woodpecker. Och mitt i allt hade en Elephant Shrew rusat rakt över stigen framför mig, total lycka!

Därefter åkte vi ner till Mida Creek och spanade vadare, hade bl.a. gott om Crab Plover och sedan Lesser Sand Plover, Greater Sand Plover, White-fronted Plover, Lesser Crested Tern. Till Cheges stora



Sokoke Scops Owl *Otus ireneae*

lycka kunde vi hitta honom en vanlig strandskata, nytt kryss! Vid Mida Community Bandas där vi bodde hittade Stellan en Mottled Spinetail när vi inkvarterade oss i Bungalows.

Sedan åkte vi runt Arabuko-Sokoke Forest och in vid Jilore Gate. 1 km innanför den hade vi ett par Peter's Twinspot,

Green Malkoha, Four-colored Bushshrike och

Fischer's Turaco. Vid skymningen gjorde vi ett lyckat försök på den endemiska Sokoke Scops Owl. Vi ställde oss på vägen i ett område där ugglan brukade hålla till och väntade, samtidigt som Willie visslade. Efter en ganska lång stund behagade ugglan svara och vi kunde smyga in i den täta skogen och med en ficklampas hjälp få syn på den när den satt bara några meter bort! Samtidigt spelade Fiery-necked Nightjar och en Bushbaby skrek.

Sedan middag på restaurang inne i Malindi.

Dagen gav "endast" 81 arter men riktigt många nya och vi var uppe i 713.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

9/1 Iväg mot Roka Ponds vid 06 för att leta Collared Palm Thrush, och en sådan hittades rätt omgående under en palm. Hade även Golden Palm Weaver, Brown-headed Parrot och Water Thick-knee. Ringmärkning av vadare pågick här. Sedan åkte vi bakom Arabuko-Sokoke och till Lake Chemchem, parkerade i en by och promenerade ner till sjön där vi bl.a. hade Zanzibar Red Bishop. Därefter sen frukost vid bilen och vidare ner mot Malindi hamn för att spana vitfågel, bl.a. Sooty Gull. Därefter iväg till Gongoni, ovanför de stora saltanläggningarna, eftersom detta är en bra lokal för Malindi Pipit. Efter en stunds letande på gräsfälten hittade vi den eftersökta piplärkan. I övrigt Coastal Cisticola, Cuckoo Weaver och ett gäng snygga Carmine Bee-Eaters.

Sedan till Sabaki River delta där vi tyvärr dippade på Skimmer, men såg Ethiopian Swallow.

Lunch på samma hak i Malindi som vi ätit middag på kvällen innan, de hade en fruktansvärd god isad mangojuice! Efter det körde vi åter in i området Jilore bakom Arabuko-Sokoke och spanade ivrigt efter rovfåglar, och till sist fick vi äntligen in två av våra målarter Southern Banded Snake Eagle och Ayre's Hawk- Eagle som seglade över oss. I en sjö låg några African Pygmy Goose, Southern Pochard och White-backed Duck.



Chege



African Bush Elephant *Loxodonta africana*

Vid vår camp satt vi ute och pratade med två holländare som också bodde här. Listan summerade nu 739 arter, 113 under dagen.

10/1 Tidig start vid 04 för att åka ner längs kusten till Shimba Hills. Vid utfarten från campen satt en African Wood Owl på en gren. Efter att ha passerat genom Mombasa, tagit färjan över floden så nådde vi Shimba Hills National Park vid 08. Körde runt på vägarna och försökte denna resans sista dag att krama ur det sista ur Kenya. På några ställen sinkade elefanter vår framfart men annars gick väl skådningen hyfsat. Rätt fin skog och på några ställen vacker utsikt. Vi hade Brown-hooded Kingfisher, Broad-billed Roller, White-eared Barbet, Green-headed Oriole och Green-backed Camaroptera.

Lunchade på Shimba Lodge innan vi skådade en sista timme, fick in Brown-breasted Barbet. Vi började känna oss lite slitna och mätta efter att ha kört hårt i 23 dagar

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

och började tänka lite på hemresan. Från Mombasa skulle vi flyga till Nairobi, men när vi kom fram till Mombasa visade det sig att den ena av de två färjorna gått sönder och kön av fordon som skulle över vattnet var kilometerlång. Vi insåg att vi skulle missa vårt plan om vi skulle stå i denna kö, så Anders fick simulera allvarligt sjuk och sitta och se riktigt trött ut (alltså se ut som han normalt gör under bilfärd) medans Chege försökte övertyga köns vakter att släppa förbi oss så vi kunde åka till sjukhus. Det lyckades mirakulöst nog fram till sista vakten som behövde mutas innan vi kunde skeppas över. Kunde vi nu andas ut? Inte riktigt visade det sig, när vi kom till incheckningen fanns våra namn inte med i datasystemet. Efter lite palaver visade det sig att namnen förväxlats och vi kunde checka in och lyfta mot Nairobi som planerat.

På Nairobi International Airport fick vi besked om att det fortfarande var snökaos i London och vårt kvällsflyg dit var inställt. Istället hade British Airways varit vänliga att boka in oss på en flight om två dygn. Det var vi inte så sugna på och lyckades skälla till oss en plats med KLM redan morgonen därpå. Så det fick bli en natt på hotell i Nairobi. Flygresorna hade verkligen strulat denna resa men på något vis ordnade det alltid upp sig för oss.

Under den sista dagen sågs 55 arter och totalt slutade vi på 748 arter.

11/1 KLM till Stockholm via Amsterdam.

Sammanfattning och restips

Trots problemen med våra flygresor var resan mycket lyckad. Vi såg det mesta av våra förväntade målarter, och totalsumman på 748 arter översteg våra vildaste fantasier.

Vi valde att anlita en lokal firma för att sköta bokningar och stå för guidandet. Efter tips i andra reserapporter på nätet föll valet på Birdwatching EastAfrica och speciellt guiden Chege wa Kariuki. Chege motsvarade alla förväntningar och jobbade stenhårt för att vi skulle få se allt.

Kommunikationen med BirdwatchingEastAfrica innan resan var lite bristfällig och sporadisk eftersom det kunde ta flera veckor innan vi fick svar på mail. Detta förklarade Chege med att de var relativt nyetablerade i nya lokaler och inte hade fått igång rutinerna riktigt, men att det skulle bli bättre. Vi upplevde inte några egentliga problem av detta men nämnde för dem att vi européer gärna vill få snabba svar på det mesta vi undrar över, särskilt inför en resa. Ibland kanske den medhavda frukosten eller lunchen var lite snålt tilltagen men detta är detaljer. Vi kan mer än gärna rekommendera företaget som ett prisvärt alternativ, och det är trevligt att kunna gynna en lokal arrangör. Chege var en mycket trevlig person och förstod snabbt att vi i första hand ville ha någon med lokalkännedom som höll problemen borta, inte någon som gick först och pekade ut alla fåglar.

För resan Nairobi-Nairobi, 23 dagar betalade vi 3833 US dollar, ca 27.500 kr per man, och då ingick allt utom öl.

Att resa runt själva i Kenya skulle inte vara något större problem, förutom då kanske uppe i nordost. Men för att veta var man kan parkera, var arterna brukar finnas, kontakter med lokala guider mm så var det självklart oslagbart att ha Chege som guide.

Anders väska? Den dök upp hemma i Arlöv någon månad senare och hade av allt att döma varit runt i Kenya men vi måste ha missat den på något sätt.


Information

www.birdwatchingeastafrica.com


Francis Cherutich, guide i Baringo, frankrutich (at) yahoo.co.uk

Ben Obanda, guide i Kakamega, obandaben (at) yahoo.com


Willy Nganda, guide i Arabuko, willyndanda (at) gmail.com (willynganda (at) gmail.com?)




Birds of Kenya & Northern Tanzania (Zimmerman, Turner and Pearson)



Birds of East Africa (Stevenson and Fanshawe)



The Kingdon Pocket Guide to African Mammals (Kingdon)



Birds of the World (Larsson et.al.)

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Bird List

The taxonomy follows Larsson et.al. 2008. Birds of the World ver. 2.0 (BW). Subspecies name is added after species name when possible. When more than one subspecies seen these are separated in the record list. Subspecies mainly identified by geographical distribution. English name in brackets indicate name used in Birds of Kenya & Northern Tanzania by Zimmerman et.al. Taxonomic notes are included in square brackets.

Species endemic to Kenya are highlighted with **green**. Species restricted to Endemic Bird Areas according to BirdLife International¹⁾ are highlighted in **yellow**.

The Endemic Bird Areas in Kenya visited during this trip are:

- [EBA 108](#) Serengeti plains
[EBA 109](#) Kenyan mountains
[EBA 111](#) East African coastal forests

1) BirdLife International 2003 *BirdLife's online World Bird Database: the site for bird conservation*. Version 2.0. Cambridge, UK: BirdLife International. Available: <http://www.birdlife.org> (accessed 5/4/2010)

Common Ostrich *Struthio camelus massaicus*
Seen 6 days (Baringo, Masai Mara and Nairobi NP).

Somali Ostrich *Struthio molybdophanes*
1 ♂ near Mado Gashi.

Fulvous Whistling Duck *Dendrocygna bicolor*
Ca 200 Dunga wetland, Kisumu.

White-faced Whistling Duck *Dendrocygna viduata*
Seen 5 days (Dunga wetland, Masai Mara, Malindi).

White-backed Duck *Thalassornis l. leuconotus*
3 Lake Gilore.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*
Seen 14 days, widespread.

Spur-winged Goose *Plectropterus g. gambensis*
4 + 1 Masai Mara.

Knob-billed Duck *Sarkidiornis m. melanotos*
1 ♀ and 2 ♂♂ Molo grasslands.

African Pygmy Goose *Nettapus auritus*
12 Lake Gilore.

African Black Duck *Anas sparsa leucostigma*
2 ad and 3 pull Gatamaiyu Forest.

Cape Teal *Anas capensis*
2 Limuru wetland.

Yellow-billed Duck *Anas u. undulata*
Few birds seen 2 days (e.g. Molo grasslands).

Red-billed Teal *Anas erythrorhyncha*
Seen 3 days (Limuru wetlands and Lake Naivasha).

Hottentot Teal *Anas hottentota*
Seen 4 days.

Garganey *Anas querquedula*
1 pair Limuru wetland.

Northern Shoveler *Anas clypeata*
4 Limuru wetland and 10 Lake Naivasha.

Southern Pochard *Netta erythrophthalma brunnea*
1 ♂ Lake Gilore.

Maccoa Duck *Oxyura maccoa*
5 Molo grasslands.

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*
Seen 6 days (Baringo, Masai Mara, Nairobi NP etc.).

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Vulturine Guineafowl *Acryllium vulturinum*

Ca 10 seen 2 days Garissa – Mado Gashi.

Coqui Francolin *Peliperdix coqui hubbardi*

Heard 4 days (Lake Nakuru NP, Masai Mara).

Crested Francolin *Peliperdix sephaena*

ssp. *grantii* 1 heard along the road from Busia to Kisumu;

ssp. *spilogaster* 1 near Mado Gashi.

Jackson's Francolin *Pternistis jacksoni*

Common at Aberdare NP.

Red-necked Spurfowl *Pternistis afer cranchii*

1 seen 2 days in Masai Mara.

Yellow-necked Spurfowl *Pternistis*

leucoscepus

2 N. of Nyeri and ca 20 Nairobi NP.

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis capensis*

Seen 6 days in suitable wetlands.

Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*

infuscatus

4 Molo grasslands.

Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*

Ca 50 Nakuru sewage farm, 2 Lake Naivasha. Also observed at Mida Creek and Sabaki river delta.

Lesser Flamingo *Phoenicopterus minor*

Ca 50000 Lake Nakuru and ca 100 Sabaki river delta.

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*

Widespread, seen 12 days.

African Openbill *Anastomus l. lamelligerus*

Seen 5 days. Largest flock ca 500 Busia grasslands.

Black Stork *Ciconia nigra*

Seen 6 days.

Abdim's Stork *Ciconia abdimii*

1 seen on roof near Kisumu.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*

microscelis

Ca 20 Lake Nakuru NP, 2+2 Masai Mara and 2 Mida Creek.

White Stork *Ciconia c. ciconia*

Ca 60 between Masai Mara and Naivasha and ca 50 between Garissa and Mado Gashi.

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis*

2 Nairobi NP.

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus*

Common and widespread, seen 17 days.

African Spoonbill *Platalea alba*

Seen 5 days, few birds (Molo grasslands, Lake Baringo, Kisumu and Thika).

Sacred Ibis *Threskiornis a. aethiopicus*

Common and widespread, seen 12 days.

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash nilotica*

Very common, seen 17 days.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*

7 Limuru wetland and 4 Dunga wetland, Kisumu.

Grey Heron *Ardea c. cinerea*

Common, seen 15 days.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

Very common, seen 18 days.

Goliath Heron *Ardea goliath*

1 Masai Mara and 1 Sabaki river delta.

Purple Heron *Ardea p. purpurea*

1 Kongelai escarpment and 1 Lake Gilore.

Great Egret *Casmerodius albus*

melanorhynchos

Seen 9 days.

Yellow-billed Egret *Mesophoyx intermedius brachyrhyncha*

Ca 20 Kongelai escarpment and a few birds seen Masai Mara.

Little Egret *Egretta g. garzetta*

Seen 9 days.

Cattle Egret *Bubulcus i. ibis*

Very common, seen 19 days.

Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Seen 8 days.

Malagasy Pond Heron *Ardeola idae*

1 Kongelai escarpment.

Striated Heron *Butorides striata atricapilla*
(Green-backed Heron)

1 along a river N. of Kapedo.

Black-crowned Night Heron *Nycticorax n. nycticorax*

Seen 4 days.

Little Bittern *Ixobrychus minutus*

1 Dunga wetland, Kisumu.

Hamerkop *Scopus u. umbretta*

Common and widespread, seen 15 days.

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*

Seen 3 days (Lake Nakuru, Lake Naivasha and Malindi).

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*

Seen 4 days (Nakuru sewage farm, Lake Baringo, Garissa and Malindi).

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo lucidus*

Few birds seen 3 days (Lake Nakuru NP and Lake Naivasha).

Reed Cormorant *Phalacrocorax a. africanus*
(Long-tailed Cormorant)

Seen 6 days.

Secretarybird *Sagittarius serpentarius*

Seen 4 days (Lake Nakuru NP, Masai Mara and Nairobi NP).

Osprey *Pandion h. haliaetus*

1 Mida creek.

Black-winged Kite *Elanus c. caeruleus*
(Black-shouldered Kite)

Single birds seen 5 days.

Scissor-tailed Kite *Chelictinia riocourii*
(African Swallow-tailed Kite)

1 seen just S. of Mado Gashi.

African Harrier-Hawk *Polyboroides t. typus*

Seen 6 days.

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis*

1 imm. Kakamega forest and 2 ad. Shimba hills NR.

European Honey Buzzard *Pernis apivorus*

2 Shimba hills NR.

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

1 Lake Nakuru NP.

Lappet-faced Vulture *Torgos t. tracheliotus*

3-4 Masai Mara and 2 Nairobi NP.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

2-3 Masai Mara and 1 Shimba hills NR.

White-backed Vulture *Gyps africanus*
(African White-backed Vulture)

Common, seen 7 days.

Rüppell's Vulture *Gyps r. rueppellii*

2 Lake Nakuru NP.

Bateleur *Terathopius ecaudatus*

Seen 5 days (Masai Mara, Nairobi NP, Olorgesailie and Shimba hills NR).

Southern Banded Snake Eagle *Circaetus fasciolatus*

1 ad Arabuko Sokoke NR.

Black-chested Snake Eagle *Circaetus pectoralis*

1 between Busia and Kisumu, 1 + 1 Masai Mara and 3 + 1 between Mado Gashi and Garissa.

Beudouin's Snake Eagle *Circaetus beudouini*

1 ad Busia grasslands.

Brown Snake Eagle *Circaetus cinereus*

1 Mara west camp and 3 Masai Mara.

Dark Chanting Goshawk *Melierax m. metabates*

Seen 4 days in the west (Lake Baringo, Kongelai escarpment and Masai Mara).

Eastern Chanting Goshawk *Melierax poliopterus*

Seen 5 days in the east (Thika – Garissa – Mado Gashi, Voi).

Gabar Goshawk *Micronisus gabar aequatorius*

2 grey morph + 1 dark morph Lake Nakuru NP, 1 Kongelai escarpment and 1 Nairobi NP.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

African Goshawk *Accipiter tachiro sparsimfasciatus*

1 pair Gatamaiyu forest and 1 imm. Arabuko Sokoke forest.

Shikra *Accipiter badius sphenurus*

1 ad Baringo and 1 Kisumu.

Levant Sparrowhawk *Accipiter brevipes*

1 ♂ + 1 Garissa – Mado Gashi.

Little Sparrowhawk *Accipiter minullus*

1 Kongelai escarpment.

Black Sparrowhawk *Accipiter m. melanoleucus*

(Great Sparrowhawk)

1 ad Kongelai escarpment, 1 ad Kakamega forest, 1 +1 Masai Mara, 1 ad Nairobi NP, 1 ad Taita Hills and 1 Arabuko Sokoke forest.

Western Marsh Harrier *Circus a. aeruginosus*

Common, seen 10 days.

African Marsh Harrier *Circus ranivorus*

1 ad between Kisumu and Mara.

Pallid Harrier *Circus macrourus*

Seen 5 days (many left unidentified).

Montagu's Harrier *Circus pygargus*

Seen 5 days (many left unidentified).

Black Kite *Milvus migrans*

Very common, seen 22 days. (ssp. *migrans* and *parasitus*)

African Fish Eagle *Haliaeetus vocifer*

Common, seen 12 days.

Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis*

Ca 50 seen between Garissa and Mado Gashi.

Lizard Buzzard *Kaupifalco m. monogrammicus*

1 Arabuko Sokoke forest and 1 N of Malindi.

Common Buzzard *Buteo buteo vulpinus*

Fairly common, seen 8 days.

Mountain Buzzard *Buteo oreophilus*

1 Gatamaiyu forest and 2 Aberdare NP.

Augur Buzzard *Buteo augur*

Common, seen 11 days.

Crowned Eagle *Stephanoaetus coronatus*

1 ad Taita hills.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*

1 ad Ngutuni lodge, Tsavo East NP.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis*

1 + 1 Kongelai escarpment and 2 Busia grasslands

Lesser Spotted Eagle *Lophaetus pomarinus*

1 Lake Nakuru NP, 1 Masai Mara and 2 along the road from Olorgesailie.

Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*

1 Mara west camp.

Ayres's Hawk-Eagle *Hieraaetus ayresii*

1 subad Arabuko Sokoke forest.

Wahlberg's Eagle *Hieraaetus wahlbergi*

1 imm. + 2 ad Kongelai escarpment, 2 Masai Mara, 2 (1 pale morph) Mida creek and 1 Shimba hills NR.

Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii*

1 subad Lake Baringo.

African Hawk-Eagle *Aquila spilogastra*

1 ad feeding 1 imm Lake Nakuru NP, 2 Kongelai escarpment, 2 Olorgesailie and 1 2K Taita hills.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis*

Common, seen 8 days.

Tawny Eagle *Aquila r. rapax*

1 Lake Nakuru NP and 1 Garissa – Mado Gashi.

Asian Imperial Eagle *Aquila heliaca*

1 1K Mara west camp.

Pygmy Falcon *Polihierax semitorquatus*

3 Baringo – Kapedo and 2 N of Kapedo.

Common Kestrel *Falco tinnunculus*

Seen 8 days.

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus*

1 Kapedo and 1 Kongelai escarpment.

Lanner Falcon *Falco biarmicus*

ssp. *biarmicus* 1 ad Lake Nakuru NP; ssp. *abyssinicus* 2 imm and 1 ad Lake Baringo and 1 Kapedo.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Peregrine Falcon *Falco peregrinus*

1 Limuru wetland, 1 N of Kapedo, 1 Kongelai escarpment, 1 Mombasa and 1 Sabaki river delta.

Grey Crowned Crane *Balearica regulorum gibbericeps*

Common, seen 10 days.

White-spotted Flufftail *Sarothrura pulchra centralis*

1 heard Kakamega forest.

Black Crake *Amaurornis flavirostra*

2 Molo grasslands, 1 + 1 Kongelai escarpment and 2 Nairobi NP.

Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio madagascariensis*

2 Molo grasslands and 2 Kongelai escarpment.

Common Moorhen *Gallinula chloropus meridionalis*

Seen 3 days (Molo grasslands, Kongelai escarpment).

Lesser Moorhen *Gallinula angulata*

1 along the road from Busia to Kisumu.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata*

Seen 5 days in suitable wetlands.

African Finfoot *Podica senegalensis somereni*

1 pair Thika (Blue Post Hotel) and 1 Nairobi NP.

Kori Bustard *Ardeotis kori struthiunculus*

1 Masai Mara, 1 Garissa – Mado Gashi and 2 Nairobi NP.

White-bellied Bustard *Eupodotis senegalensis erlangeri*

2 ♂ + 1 ♀ along the road from Masai Mara to Naivasha.

Buff-crested Bustard *Lophotis gindiana*
(Crested Bustard)

1 ♀ + 1 pull Thika – Garissa and ca 10 Garissa – Mado Gashi.

Black-bellied Bustard *Lissotis m.*

melanogaster

1 ♂ + 3 + 2 Masai Mara.

Hartlaub's Bustard *Lissotis hartlaubii*

Ca 10 Nairobi NP and 1 along the road from Nairobi to Voi.

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis*

1 at a river N of Kapedo.

Water Thick-knee *Burhinus v. vermiculatus*

5 Roka ponds.

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis maculosus*

1 heard Garissa – Mado Gashi.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*

Common at Mida creek and Sabaki river delta.

Black-winged Stilt *Himantopus h. himantopus*

Common, seen 8 days.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*

Seen 3 days (Nakuru sewage farm, Lake Nakuru NP and Lake Naivasha).

Eurasian Oystercatcher *Haematopus*

ostralegus longipes

4 Mida creek.

Crab-plover *Dromas ardeola*

Ca 300 Mida creek.

Long-toed Lapwing *Vanellus c. crassirostris*

10 along the road between Kisumu and Masai Mara.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus*

Common, seen 7 days.

Spur-winged Lapwing *Vanellus spinosus*

Common, seen 12 days.

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus latifrons*

2 Garissa – Mado Gashi and ca 20 N of Mado Gashi.

Black-winged Lapwing *Vanellus m. melanopterus*

Ca 20 Kinangop plateau.

Crowned Lapwing *Vanellus c. coronatus*

Seen 4 days (Lake Nakuru NP, Masai Mara, Mado Gashi and Nairobi NP).

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

African Wattled Lapwing *Vanellus senegallus lateralis*

2 Molo grasslands and 2 Masai Mara.

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula tundrae*

Seen at Mida creek and Sabaki river delta.

Little Ringed Plover *Charadrius dubius curonicus*

2 Lake Nakuru NP and 1 N of Kapedo.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius*

6 Lake Naivasha.

Three-banded Plover *Charadrius t. tricoloris*

Seen 6 days (Molo grasslands, Masai Mara, Nairobi NP).

White-fronted Plover *Charadrius marginatus mechowi*

1 Mida creek and 2 Sabaki river delta.

Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*

3 Mida creek.

Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii*

Ca 100 Mida creek and ca 50 Sabaki river delta.

Lesser Jacana *Microparra capensis*

2 Molo grasslands.

African Jacana *Actophilornis africanus*

Widespread, seen 7 days in suitable wetlands.

African Snipe *Gallinago nigripennis aequatorialis*

1 Molo grasslands.

Black-tailed Godwit *Limosa limosa*

1 Lake Nakuru NP.

Whimbrel *Numenius phaeopus*

Ca 50 Mida creek and ca 10 Sabaki river delta.

Eurasian Curlew *Numenius arquata*

Ca 10 Mida creek and ca 50 Sabaki river delta.

Terek Sandpiper *Xenus cinereus*

Ca 10 Mida creek and ca 10 Sabaki river delta.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Common, seen 13 days.

Green Sandpiper *Tringa ochropus*

Fairly common, seen 9 days.

Spotted Redshank *Tringa erythropus*

1 Lake Naivasha and 5 Sabaki river delta.

Common Greenshank *Tringa nebularia*

Fairly common, seen 7 days.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*

Seen 5 days.

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Common, seen 10 days.

Sanderling *Calidris alba*

Ca 15 N of Kapedo and ca 100 Lake Naivasha.

Little Stint *Calidris minuta*

Common Lake Nakuru NP and ca 100 Sabaki river delta.

Temminck's Stint *Calidris temminckii*

5 Mida creek.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Ca 50 Sabaki river delta.

Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus*

Ca 20 Mida creek.

Ruff *Philomachus pugnax*

Seen 4 days (Lake Nakuru NP, Lake Naivasha and Garissa – Mado Gashi).

Kurrichane Buttonquail *Turnix sylvaticus lepuranus*

(Common Button-Quail)

1 Masai Mara.

Somali Courser *Cursorius somalensis littoralis*

1 N of Mado Gashi.

Temminck's Courser *Cursorius t. temminckii*

2 Nairobi NP.

Double-banded Courser *Rhinoptilus africanus gracilis*

(Two-banded Courser)

1 E of Masai Mara.

Three-banded Courser *Rhinoptilus c. cinctus*

(Heuglin's Courser)

3 Lake Baringo.

Gull-billed Tern *Gelochelidon n. nilotica*

Fairly common, seen 6 days.

Caspian Tern *Hydroprogne caspia*

1 Mida creek and 3 Malindi harbor.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*

1 1K Lake Naivasha.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida delalandii*

Fairly common, seen 6 days.

Swift Tern *Thalasseus bergii*

(Greater Crested Tern)

Ca 20 Malindi harbor.

Sandwich Tern *Thalasseus s. sandvicensis*

1 Malindi harbor.

Lesser Crested Tern *Thalasseus b.*

bengalensis

Ca 10 Mida creek and ca 10 Sabaki river delta.

Grey-hooded Gull *Larus cirrocephalus*

poiocephalus

(Grey-headed Gull)

Ca 100 Lake Naivasha.

Sooty Gull *Larus hemprichii*

Ca 50 Malindi harbor.

Lesser Black-backed Gull *Larus f. fuscus*

2 Malindi harbor.

West-Siberian Gull *Larus heuglini*

Ca 30 Malindi harbor.

Chestnut-bellied Sandgrouse *Pterocles*

exustus olivascens

Ca 30 around Mado Gashi.

Black-faced Sandgrouse *Pterocles decoratus*

ellenbecki

Seen 5 days (Thika – Garissa – Mado Gashi and Nairobi – Voi).

Lichtenstein's Sandgrouse *Pterocles*

lichtensteinii sukensis

1 ♀ + 7 ♂♂ N of Baringo.

Speckled Pigeon *Columba g. guinea*

Very common, seen 19 days.

African Olive Pigeon *Columba arquatrix*

(Olive Pigeon)

Seen 4 days (Mara west camp, Gatamaiyu forest and Aberdare NP).

Lemon Dove *Columba l. larvata*

3 heard Gatamaiyu forest.

Laughing Dove *Stigmatopelia s. senegalensis*

Common, seen 14 days.

Dusky Turtle Dove *Streptopelia lugens*

Seen 7 days (e.g. Molo grasslands, Masai Mara, Nairobi NP).

Mourning Collared Dove *Streptopelia decipiens*

(African Mourning-Dove)

Seen 8 days. Possibly over-looked.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Seen 7 days. Possibly over-looked.

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola*

Seen 5 days. Possibly over-looked (ssp. *somalica* in north and east and ssp. *tropica* in west).

Emerald-spotted Wood Dove *Turtur*

chalcospilos

Common, seen 12 days.

Blue-spotted Wood Dove *Turtur afer*

Seen 5 days in the west (e.g. Kongelai escarpment, Busia grassland).

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*

Widespread, seen 8 days.

Namaqua Dove *Oena c. capensis*

Seen 7 days in dryer areas of NE and E.

African Green Pigeon *Treron calvus granviki*

Seen 4 days in the west (Kakamega forest, Busia grassland and Kisumu).

Red-headed Lovebird *Agapornis pullarius ugandae*

2 ad + 1 juv Dunga wetland, Kisumu.

Lovebirds were seen in a few other places but due to extensive hybridisation the introduced species (Fischer's and Yellow-collared) are difficult to separate.

Red-fronted Parrot *Poicephalus gularis*
massaicus

1 seen + 2 heard Aberdare NP.

Meyer's Parrot *Poicephalus meyeri saturatus*
(Brown Parrot)

Fairly common in the west, seen 7 days.

Brown-headed Parrot *Poicephalus*
cryptoxanthus tanganyikae

6 Roka ponds.

Red-bellied Parrot *Poicephalus r. rufiventris*
(African Orange-bellied Parrot)

2 + 1 Nguni between Thika and Garissa.

Great Blue Turaco *Corythaeola cristata*
2 Kakamega forest.

Schalow's Turaco *Tauraco schalowi*
1 heard Mara west camp.

Fischer's Turaco *Tauraco f. fischeri*

1 + 1 heard Arabuko Sokoke forest and ca 10
Shimba Hills NR.

White-crested Turaco *Tauraco leucolophus*
1 Kongelai escarpment and 1 Busia grasslands.

Hartlaub's Turaco *Tauraco hartlaubi*
2 Gatamaiyu forest and 3 Taita hills.

Ross's Turaco *Musophaga rossae*
3 Kongelai escarpment and 2 along the road
from Kisumu to Mara.

Bare-faced Go-away-bird *Corythaixoides*
personatus leopoldi
2 + 1 Mara west camp.

White-bellied Go-away-bird *Corythaixoides*
leucogaster
Fairly common, seen 10 days.

Eastern Plantain-eater *Crinifer zonurus*
(Eastern Grey Plantain-eater)
1 Kongelai escarpment and 2 Dunga wetland,
Kisumu.

Jacobin Cuckoo *Clamator jacobinus pica*
(Black-and-White Cuckoo)
1 Thika – Garissa and 6 Garissa – Mado Gashi.

Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*
1 + 1 ad Garissa – Mado Gashi.

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*
2 heard Kisumu – Mara, 1 heard Ologesailie
and 1 heard Taita hills.

African Cuckoo *Cuculus gularis*
1 ad Kisumu – Mara and 1 Ologesailie –
Nairobi.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*
1 Busia grasslands and 1 heard Ologesailie.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx*
cupreus
1 Kongelai escarpment.

Dideric Cuckoo *Chrysococcyx caprius*
2 Lake Nakuru NP and 3 Lake Baringo.

Blue Malkoha *Ceuthmochares a. aereus*
(Yellowbill)
1 + 1 Kakamega forest.

Green Malkoha *Ceuthmochares australis*
(Yellowbill)
1 Arabuko Sokoke forest.

Blue-headed Coucal *Centropus monachus*
ssp. *fischeri* 2 Busia grasslands, 1 Dunga
wetland, Kisumu;
ssp. *monachus* 1 Aberdare NP.

Senegal Coucal *Centropus s. senegalensis*
4 Busia grasslands.

White-browed Coucal *Centropus*
superciliosus
Singles or pairs seen 5 days (Kongelai
escarpment, Busia grasslands, Kisumu,
Arabuko Sokoke forest and Lake Chem
Chem).

Barn Owl *Tyto alba affinis*
1 heard Kisumu Sunset Hotel.

Sokoke Scops Owl *Otus ireneae*
1 heard + 1 grey morph Arabuko Sokoke
forest.

African Scops Owl *Otus s. senegalensis*
1 Lake Baringo.

Northern White-faced Owl *Ptilopsis leucotis*
(White-faced Scops-Owl)
1 Lake Baringo.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Cape Eagle-Owl *Bubo capensis mackinderi*

1 pair Gatarakwa, N of Nyeri.

Spotted Eagle-Owl *Bubo a. africanus*

1 Olorgesailie.

Greyish Eagle-Owl *Bubo cinerascens*

(**Spotted Eagle-Owl**)

2 Lake Baringo.

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus*

1 Lake Baringo and 1 pair Arabuko Sokoke forest.

African Wood Owl *Strix woodfordii*

nigricantior

2 Wajee Nature Park, 1 Mida community bandas and 2 Shimba hills NR.

Sombre Nightjar *Caprimulgus fraenatus*

(**Dusky Nightjar**)

2 Olorgesailie.

Donaldson-Smith's Nightjar *Caprimulgus*

donaldsoni

1 heard and the same? + 1 more seen the next morning close to Mado Gashi, also one found dead on the road in the same area.

Fiery-necked Nightjar *Caprimulgus*

pectoralis shelleyi

1 heard Arabuko Sokoke forest.

Montane Nightjar *Caprimulgus*

poliocephalus

1 heard and seen Molo grasslands.

Swamp Nightjar *Caprimulgus n. natalensis*

(**African White-tailed Nightjar**)

2 heard and seen Busia grasslands.

Slender-tailed Nightjar *Caprimulgus clarus*

2 Lake Baringo.

Scarce Swift *Schoutedenapus m. myoptilus*

5 Gatamaiyu forest.

Mottled Spinetail *Telacanthura ussheri*

stictilaema

1 Mida community bandas and 1 Malindi town.

Böhm's Spinetail *Neafrapus boehmi*

sheppardi

2 Shimba hills NR.

African Palm Swift *Cypsiurus parvus*

Common, seen 13 days.

ssp. *myochrous* in west;

ssp. *laemostigma* in east and along the coast.

Alpine Swift *Tachymarptis melba*

2 Busia grasslands.

Mottled Swift *Tachymarptis a. aequatorialis*

1 Kongelai escarpment and 1 Busia grasslands.

Common Swift *Apus apus*

Seen 7 days (e.g. Busia, Masai Mara, Mado Gashi and Nairobi).

African Black Swift *Apus barbatus roehli*

Flocks seen 3 days. Molo Grasslands, Aberdare N.P (Thousands) and Olorgesailie.

Little Swift *Apus affinis*

Very common, seen 19 days.

Horus Swift *Apus h. horus*

2 Kinangop plateau.

White-rumped Swift *Apus caffer*

Fairly common, seen 8 days.

Speckled Mousebird *Colius striatus*

ssp. *kikuyensis* very common, seen 16 days;

ssp. *mombassicus* seen 2 days at the coast (Malindi area, Shimba hills).

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus*

pulcher

Seen 5 days (Lake Nakuru NP, Lake Baringo, Garissa – Mado Gashi, Olorgesailie).

Bar-tailed Trogon *Apaloderma vittatum*

1 Kakamega forest and 1 heard Gatamaiyu forest.

Grey-headed Kingfisher *Halcyon*

leucocephala

Fairly common, seen 7 days.

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon*

albiventris orientalis

5 Shimba hills NR.

Striped Kingfisher *Halcyon c. chelicuti*

Seen 5 days (e.g. 5 Lake Nakuru NP, 1

Kongelai escarpment, 1 Nairobi NP).

Woodland Kingfisher *Halcyon s.*

senegalensis

2 Lake Baringo and 3 Kongelai escarpment.

African Pygmy Kingfisher *Ispidina picta*

pictus

1 Kakamega forest, 2 Busia grasslands and 1 Blue Post Hotel, Thika.

Malachite Kingfisher *Corythornis c. cristata*

1 Lake Nakuru NP, 2 Baringo, 1 Kongelai escarpment and 1 Nairobi NP.

Giant Kingfisher *Megaceryle m. maxima*

1 Kinangop plateau and 1 Blue Post Hotel, Thika.

Pied Kingfisher *Ceryle r. rudis*

Fairly common, seen 10 days.

Blue-headed Bee-eater *Merops m. muelleri*

2 + 1 Kakamega forest.

Little Bee-eater *Merops pusillus*

Fairly common, seen 8 days.

Blue-breasted Bee-eater *Merops variegatus*

loringi

8 along the road from Busia to Kisumu.

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates*

oreobates

Fairly common, seen 7 days.

White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides*

bullockoides

1 Lake Nakuru NP.

Somali Bee-eater *Merops revoilii*

1 + 10 around Mado Gashi.

White-throated Bee-eater *Merops albicollis*

Fairly common, seen 7 days.

Blue-cheeked Bee-eater *Merops p. persicus*

1 Baringo, 4 Busia grasslands and 3 Garissa – Mado Gashi.

European Bee-eater *Merops apiaster*

Common, seen 9 days.

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus*

1 Garissa and ca 20 Gongoni.

Purple Roller *Coracias n. noevius*

(Rufous-crowned Roller)

3 Lake Nakuru NP, 1 Kisumu – Mara and 1 Thika – Garissa.

Lilac-breasted Roller *Coracias c. caudatus*

Common, seen 10 days.

Abyssinian Roller *Coracias abyssinicus*

1 Kongelai escarpment.

European Roller *Coracias garrulus*

Common in the east (Garissa – Mado Gashi, Tsavo, Malindi).

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*

ssp. *afar* 1 Dunga wetland, Kisumu;

ssp. *suahelicus* 6 Shimba Hills NR.

Eurasian Hoopoe *Upupa epops*

ssp. *aficana* and ssp. *epops* fairly common, seen 7 days.

White-headed Wood Hoopoe *Phoeniculus bollei jacksoni*

bollei jacksoni

3 Kakamega forest and 2 Aberdare NP.

Green Wood Hoopoe *Phoeniculus purpureus marwitzi*

marwitzi

Seen 7 days, most common in the west (Lake Nakuru NP, Baringo, Kongelai escarpment and Arabuko Sokoke forest).

Common Scimitarbill *Rhinopomastus cyanomelas schalowi*

cyanomelas schalowi

3 Kongelai escarpment

Abyssinian Scimitarbill *Rhinopomastus minor cabanisi*

minor cabanisi

3 Kongelai escarpment, 3 Garissa – Mado Gashi and 2 Tsavo East NP.

Southern Ground Hornbill *Bucorvus leadbeateri*

leadbeateri

1 Lake Nakuru NP and 5 Masai Mara.

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus*

5 Kongelai escarpment, 1 Masai Mara, 2 Arabuko Sokoke forest and 4 Shimba Hills NR.

Hemprich's Hornbill *Tockus hemprichii*

3 Kongelai escarpment.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

African Grey Hornbill *Tockus n. nasutus*
Seen 5 days (Baringo, Kongelai escarpment and Thika – Garissa).

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*
Seen 7 days (Baringo, Kongelai escarpment and Garissa – Mado Gashi).

Northern Yellow-billed Hornbill *Tockus flavirostris*
(**Eastern Yellow-billed Hornbill**)
Seen 5 days (Kapedo, Thika – Garissa – Mado Gashi).

Von der Decken's Hornbill *Tockus deckeni*
4 Thika – Garissa, 5 Garissa – Mado Gashi, 1 Olorgesailie and 2 Tsavo East NP.

Jackson's Hornbill *Tockus jacksoni*
Ca 15 Baringo, 5 Kapedo and 2 Kongelai escarpment.

Trumpeter Hornbill *Bycanistes bucinator*
Ca 10 Arabuko Sokoke forest and 2 Shimba Hills NR.

Black-and-white-casqued Hornbill
Bycanistes subcylindricus subquadratus
1 along the road from Baringo to Kitale, ca 5 Kakmega forest and 2 Masai Mara.

Silvery-cheeked Hornbill *Bycanistes brevis*
2 Gatamaiyu forest, 1 Taita hills and 2 Shimba Hills NR.

Yellow-billed Barbet *Trachyphonus purpuratus elgonensis*
1 seen + ca 5 heard Kakamega forest.

Red-and-yellow Barbet *Trachyphonus erythrocephalus*
ssp. *versicolor* 5 Baringo, 2 Kongelai escarpment;
ssp. *erythrocephalus* 2 Olorgesailie.

D'Arnaud's Barbet *Trachyphonus darnaudii*
ssp. *darnaudii* 2 Baringo – Kapedo and ca 5 Kongelai escarpment;
ssp. *boehmi* 2 Mado Gashi;
ssp. *usambiro* 2 Masai Mara.

Grey-throated Barbet *Gymnobucco bonapartei cinereiceps*
5 + 2 Kakmega forest.

White-eared Barbet *Stactolaema leucotis kilimensis*
1 Shimba Hills NR.

Green Barbet *Stactolaema o. olivacea*
2 Arabuko Sokoke forest and 2 Shimba Hills NR.

Green Tinkerbird *Pogoniulus simplex*
(**Eastern Green Tinkerbird**)
1 Arabuko Sokoke forest.

Moustached Tinkerbird *Pogoniulus leucomystax*
(**Moustached Green Tinkerbird**)
1 Arabuko Sokoke forest.

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus jacksoni*
Seen 7 days (E.g. Kongelai escarpment, Kakamega forest and Gatamaiyu forest).

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus affinis*
1 Baringo and app. 5 seen during two visits to Kongelai escarpment.

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus c. chrysoconus*
1 heard Dunga wetland, Kisumu.

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchailloi*
1 seen + 1 heard Kakamega forest.

Red-fronted Barbet *Tricholaema diademata*
ssp. *diademata* 2 Baringo;
ssp. *massaica* 1 Mara west camp.

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa*
ssp. *lacrymosa* seen 4 days (N of Kapedo, Kongelai escarpment and Tsavo East NP);
ssp. *radcliffei* ca 10 Mara west camp.

Black-throated Barbet *Tricholaema melanocephala stigmatothorax*
Seen 6 days (Baringo – Kapedo, Thika – Garissa – Mado Gashi and Tsavo East NP).

White-headed Barbet *Lybius l. leucocephalus*
1 + 1 Kongelai escarpment.

Brown-breasted Barbet *Lybius melanopterus*
1 Shimba Hills NR.

Double-toothed Barbet *Lybius bidentatus aequatorialis*

3 Kongelai escarpment, 2 + 2 Kakamega forest and 2 Dunga wetland.

Pallid Honeyguide *Indicator m. meliphilus*

1 Taita Hills and 1 Lake Chem Chem.

Thick-billed Honeyguide *Indicator c. conirostris*

1 Kakamega forest.

Lesser Honeyguide *Indicator minor teitensis*

2 Baringo, 1 N of Kapedo, 1 Kongelai escarpment, 1 + 1 Busia grasslands and 1 Thika.

Scaly-throated Honeyguide *Indicator variegatus*

1 heard Kongelai escarpment and 1 Arabuko Sokoke forest.

Greater Honeyguide *Indicator indicator*

1 Lake Nakuru NP and 1 Nairobi NP.

Red-throated Wryneck *Jynx r. ruficollis*

1 Kitale club.

Nubian Woodpecker *Campethera n. nubica*

Seen 7 days (e.g. Lake Nakuru NP, Kongelai escarpment and Garissa – Mado Gashi).

Mombasa Woodpecker *Campethera mombassica*

1 heard Arabuko Sokoke forest.

Tullberg's Woodpecker *Campethera tullbergi taeniolaema*

(Fine-banded Woodpecker)

1 Kakamega forest.

Brown-eared Woodpecker *Campethera c. caroli*

1 + 3 Kakamega forest.

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens*

Seen 5 days (Lake Nakuru NP, Kapedo, Aberdare NP and Nairobi NP).

Bearded Woodpecker *Dendropicos n. namaquus*

1 heard + 1 Lake Nakuru NP and 1 Gatamaiyu forest.

Yellow-crested Woodpecker *Dendropicos xantholophus*

2 Kakamega forest.

African Grey Woodpecker *Dendropicos g. goertae*

(Grey Woodpecker)

1 + 1 Kongelai escarpment.

African Grey-headed Woodpecker

Dendropicos spodocephalus rhodeogaster

1 + 1 Lake Nakuru NP.

Brown-backed Woodpecker *Dendropicos obsoletus ingens*

1 Kongelai escarpment and 1 at the Jockey Club, Nairobi.

African Broadbill *Smithornis capensis meinertzhageni*

1 Kakamega forest.

Forest Batis *Batis mixta ultima*

1 pair Arabuko Sokoke forest.

Chinspot Batis *Batis molitor puella*

Seen 6 days (e.g. Lake Nakuru NP, Kongelai escarpment, Mara west camp and Nairobi NP).

Pale Batis *Batis soror*

1 pair Arabuko Sokoke forest.

Western Black-headed Batis *Batis e. erlangeri*

(Black-headed Batis)

1 Kongelai escarpment.

Pygmy Batis *Batis perkeo*

Fairly common in the Baringo – Kapedo area and 4 Garissa – Mado Gashi.

Chestnut Wattle-eye *Dyaphorophya c. castanea*

5 Kakamega forest.

Brown-throated Wattle-eye *Platysteira cyanea nyansae*

Ca 10 Kakamega forest and 2 Dunga wetland, Kisumu.

Brubru *Nilaus afer*

Fairly common in dry area (e.g. Baringo, Kapedo, Kongelai escarpment and Garissa – Mado Gashi).

Grey-headed Bushshrike *Malaconotus blanchoti*

ssp. *catharoxanthus* 1 Lake Baringo;
ssp. *approximans* 1 heard Gongoni.

Pink-footed Puffback *Dryoscopus angolensis nandensis*

2 pair + 5 heard Kakamega forest.

Black-backed Puffback *Dryoscopus cubla*

ssp. *hamatus* 1 pair Mara west camp, 1 Blue Post Hotel, Thika and 1 Taita hills;
ssp. *affinis* 2 Arabuko Sokoke forest.

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis malzacii*

Ca 15 Lake Nakuru NP.

Pringle's Puffback *Dryoscopus pringlii*

4 heard + 1 pair along Garissa to Mado Gashi road.

Marsh Tchagra *Bocagia minuta*

2 + 2 Busia grassland.

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis minor*

1 Mara west camp, 1 Aberdare NP, 1 along the Ologesailie – Nairobi road and 2 Arabuko Sokoke forest.

Three-streaked Tchagra *Tchagra j. jamesi*

1 pair along Garissa to Mado Gashi road.

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegalus armenus*

1 Kongelai escarpment and 1 Mara west camp.

Slate-colored Boubou *Laniarius funebris*

1 along the Baringo to Kapedo road, 1 Kongelai escarpment, 1 heard Nairobi NP and 2 Ologesailie.

Lühder's Bushshrike *Laniarius luehderi*

Heard + 2 seen Kakamega forest.

Red-naped Bushshrike *Laniarius ruficeps rufinuchalis*

2 Garissa – Mado Gashi.

Tropical Boubou *Laniarius aethiopicus*

Fairly common, seen 8 days.

Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri*

2 Dunga wetland, Kisumu.

Black-headed Gonolek *Laniarius*

erythrogaster

3 Kongelai escarpment and 1 + 1 Busia grassland.

Black-fronted Bushshrike *Chlorophoneus n. nigrifrons*

1 pair Gatamaiyu forest.

Bocage's Bushshrike *Chlorophoneus bocagei jacksoni*

2 + 1 Kakamega forest.

Orange-breasted Bushshrike *Chlorophoneus sulfureopectus similis*

(Sulphur-breasted Bushshrike)

1 Baringo and 2 Kongelai escarpment.

Rosy-patched Bushshrike *Telophorus cruentus hilgerti*

1 pair + 1 imm. along Thika – Garissa road and 2 + 2 along Garissa – Mado Gashi road.

Four-colored Bushshrike *Telophorus quadricolor nigricauda*

2 Arabuko Sokoke forest.

White-crested Helmetshrike *Prionops plumatus*

Fairly common, seen 8 days.

Grey-crested Helmetshrike *Prionops polioloophus*

2 Lake Nakuru NP (together with white-crested).

Retz's Helmetshrike *Prionops retzii graculinus*

Ca 5 Arabuko Sokoke forest.

Chestnut-fronted Helmetshrike *Prionops scopifrons kirki*

Ca 20 Arabuko Sokoke forest.

Grey Cuckooshrike *Coracina caesia pura*

1 + 1 Gatamaiyu forest.

Petit's Cuckooshrike *Campephaga petiti*

2 pair Kakamega forest.

Black Cuckooshrike *Campephaga flava*

1 ♀ Lake Nakuru NP and 2 ♂♂ Kongelai escarpment.

Purple-throated Cuckooshrike *Campephaga quiscalina martini*

1 ♂ Kakamega forest.

Yellow-billed Shrike *Corvinella corvina affinis*

3 Kongelai escarpment.

Northern White-crowned Shrike

Eurocephalus rueppelli

Common around Baringo, 2 Kongelai escarpment and 2 Tsavo East NP.

Rufous Shrike *Lanius phoenicuroides*

Fairly common in the drier areas in the east, seen 5 days.

Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*

1 along the Garissa – Mado Gashi road.

Mackinnon's Shrike *Lanius mackinnoni*

(Mackinnon's Fiscal)

1 ad Kakamega forest.

Grey-backed Fiscal *Lanius excubitoroides*

Common, seen 10 days in the west and central.

Long-tailed Fiscal *Lanius cabanisi*

Ca 30 Nairobi NP and ca 20 Gongoni.

Taita Fiscal *Lanius dorsalis*

1 along Thika – Garissa road and 2 close to Mado Gashi.

Somali Fiscal *Lanius somalicus*

Ca 10 N of Kapedo.

Common Fiscal *Lanius collaris humeralis*

Common, seen 10 days.

Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus*

Seen and heard 4 days (Kongelai escarpment, Arabuko Sokoke forest and Shimba Hills NR).

Green-headed Oriole *Oriolus chlorocephalus amani*

1 heard Shimba Hills NR.

Western Oriole *Oriolus brachyrhynchus laetior*

(Western Black-headed Oriole)

3 heard + 1 seen Kakamega forest.

Mountain Oriole *Oriolus percivali*

5 Gatamaiyu forest.

Black-headed Oriole *Oriolus larvatus*

ssp. *rolleti* seen 4 days in the northwest and west (Lake Nakuru NP, Baringo and Kongelai escarpment).

ssp. *reichenowi* 2 Arabuko Sokoke forest.

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii sharpei*

Ca 10 Kakamega forest.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis fugax*

Very common, seen 17 days.

Blue-mantled Crested Flycatcher

Trochocercus cyanomelas bivittatus

1 heard + 1 ♂ Arabuko Sokoke forest.

Red-bellied Paradise-flycatcher *Terpsiphone rufiventer emini*

1 Kakamega forest.

African Paradise Flycatcher *Terpsiphone viridis ferreti*

Both white and rufous morph common, seen 11 days.

African Blue Flycatcher *Elminia longicauda teresita*

Seen 6 days in the west (Kongelai escarpment, Kakamega forest, Busia and Masai Mara).

Dusky Crested Flycatcher *Elminia n.*

nigromitrata

2 + 1 Kakamega forest.

White-tailed Crested Flycatcher *Elminia albonotata*

1 ♂ Gatamaiyu forest.

Little Yellow Flycatcher *Erythrocerus*

holochlorus

1 Arabuko Sokoke forest.

Cape Crow *Corvus capensis kordofanensis*
(Cape Rook)

Seen 4 days (Kinangop plateau and along the Voi – Malindi road).

Pied Crow *Corvus albus*

Very common, seen 19 days.

Fan-tailed Raven *Corvus r. rhipidurus*

Seen 3 days (Baringo, Kapedo and Kongelai escarpment).

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

White-necked Raven *Corvus albicollis*
2 Mara west camp, 5 along the Nairobi – Voi road and 2 Taita hills.

Dusky Tit *Parus f. funereus*
2 Kakamega forest.

White-bellied Tit *Parus albiventris*
Seen 4 days (e.g. Lake Nakuru NP, Mara west camp and Gatumaiyu forest).

Acacia Tit *Parus thruppi barakae*
(**Northern Grey Tit**)
Ca 20 Baringo and 5 along the Garissa – Mado Gashi road.

Mouse-colored Penduline Tit *Anthoscopus musculus*
5 Baringo and 5 N of Kapedo.

White-headed Saw-wing *Psalidoprocne a. albiceps*
Seen 5 days (Kakamega forest, Busia grasslands and Masai Mara).

Black Saw-wing *Psalidoprocne pristoptera massaica*
Fairly common, seen 12 days.

Grey-rumped Swallow *Pseudhirundo g. griseopyga*
Ca 10 Kitale Club.

Brown-throated Martin *Riparia paludicola ducis*
(**Plain Martin**)
Fairly common, seen 8 days.

Sand Martin *Riparia riparia*
Seen 4 days.

Banded Martin *Neophedina cincta suahelica*
2 Nakuru sewage farm.

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Very common, seen all days.

Angola Swallow *Hirundo angolensis*
Seen 3 days (Kitale – Kakamega, Kakamega – Busia and Busia grasslands).

Ethiopian Swallow *Hirundo a. aethiopica*
2 N of Kapedo and 2 Gongoni.

Wire-tailed Swallow *Hirundo s. smithii*
Fairly common in the west, seen 9 days.

Rock Martin *Ptyonoprogne fuligula rufigula*
Common, seen 8 days.

Common House Martin *Delichon urbicum*
Fairly common, seen 6 days.

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica unitatis*
Common, seen 10 days.

Red-breasted Swallow *Cecropis semirufa gordonii*
(**Rufous-chested Swallow**)
2 Masai Mara.

Mosque Swallow *Cecropis senegalensis saturator*
Seen 6 days (Molo grasslands, Masai Mara and Thika – Garissa).

Red-rumped Swallow *Cecropis daurica emini*
Seen 4 days (e.g. Mara west camp, Nairobi NP and Olorgesailie).

Singing Bush Lark *Mirafra cantillans marginata*
1 at Kapedo and 1 pair (the male singing) in Olorgesailie

White-tailed Lark *Mirafra albicauda*
1 seen in Masai Mara N.P.

Rufous-naped Lark *Mirafra africana*
ssp. *tropicalis* fairly common Masai Mara NP; ssp. *athi* fairly common in Lake Nakuru and Nairobi N.P.

Flappet Lark *Mirafra rufocinnamomea kawirondensis*
2 along the road between Busia and Kisumu and 2 at Mara West Camp.

Collared Lark *Mirafra collaris*
3 seen and heard app 30 km south of Mado Gashi.

Pink-breasted Lark *Calendulauda poecilosterna*
2 at Lake Baringo, fairly common in the desert area north of Garissa and 1 along the road between Voi and Malindi.

Abyssinian Lark *Calendulauda i. intercedens*
(**Fawn-coloured Lark**)
1 at Nairobi N.P.

Chestnut-headed Sparrow-Lark *Eremopterix signatus*

App. 10 at Kapedo and common around Garissa and north of Garissa.

Fischer's Sparrow-Lark *Eremopterix leucopareia*

4 along the road between Masai Mara and Lake Naivasha, fairly common in Nairobi N.P and Olorgesailie.

Red-capped Lark *Calandrella cinerea williamsi*

5 at Molo grasslands, App. 10 in Lake Nakuru and 5 in Nairobi N.P.

Athi Short-toed Lark *Calandrella athensis*
(**Somali Short-toed Lark**)

2 at Nairobi N.P.

Short-tailed Lark *Pseudalaemon fremantlii delamerei*

2 at Nairobi N.P.

Crested Lark *Galerida cristata somaliensis*

1 singing + app. 10 at Kapedo.

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*
ssp. *melanorhyncha* seen 6 days;
ssp. *tenella* seen 2 days along the coast.

Pale Prinia *Prinia somalica erlangeri*

5 at Kapedo and app.10 north of Garissa.

Banded Prinia *Prinia bairdii melanops*

A few seen two days in Kakamega Forest.

Regarding Cisticolas. You will see a lot of them. We ignored many of them because it takes time to identify them. Therefore the comments are not really correct. We have of course seen a lot of species more days but not identified them. Just make sure to KNOW where you should see the rare species.

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops sylvia*

1 at the water fall trail at Blue post hotel in Thika.

Singing Cisticola *Cisticola cantans pictipennis*

1 at Kitale and 1 in Nairobi N.P.

Whistling Cisticola *Cisticola lateralis antinorii*

1 singing along the road between Busia and Kisumu.

Trilling Cisticola *Cisticola w. woosnami*

5 seen close to Mara West Camp.

Chubb's Cisticola *Cisticola c. chubbi*

4 + 2 in Kakamega Forest.

Hunter's Cisticola *Cisticola hunteri*

1 at Limuru Wetland and common in Aberdare N.P.

Rock-loving Cisticola *Cisticola e. emini*

1 close to Mara West Camp.

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana*

Seen and heard 7 days.

Ashy Cisticola *Cisticola cinereolus schillingsi*

1 along the road between Olorgesailie and Nairobi.

Lynes's Cisticola *Cisticola distinctus*
(**Wailing Cisticola**)

1 seen 2 days in Olorgesailie.

Winding Cisticola *Cisticola marginatus nyansae*

Seen 5 days. Limuru Wetland, Lake Nakuru and Kisumu.

Coastal Cisticola *Cisticola haematocephala*
(**Winding Cisticola**)

1 at Gongoni.

Carruthers's Cisticola *Cisticola carruthersi*

5 at Lake Victoria.

Levaillant's Cisticola *Cisticola tinniens oreophilus*

2 in Aberdare N.P.

Stout Cisticola *Cisticola robustus nuchalis*

Fairly common in Masai Mara N.P.

Aberdare Cisticola *Cisticola aberdare*

2 at Molo grasslands and 2 in Aberdare N.P.

Croaking Cisticola *Cisticola natalensis strangei*

1 in Masai Mara and 1 Shimba Hills.

Tiny Cisticola *Cisticola nanus*

2 along the road between Ologersailie and Nairobi.

Short-winged Cisticola *Cisticola*

brachypterus reichenowi

(Siffling Cisticola)

1 at Lake Chem Chem and 1 at Shimba Hills.

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis uropygialis*

App. 10 in Nairobi N.P, 2 in Ologersailie and 2 along the road between Voi and Malindi.

Desert Cisticola *Cisticola aridulus tanganyika*

1 app. 10 km N of Kapedo and 3 in Nairobi N.P.

Black-backed Cisticola *Cisticola eximius*

eximia

1 in Masai Mara.

Pectoral-patch Cisticola *Cisticola*

brunnescens

ssp. *nakuruensis* 3 at Lake Nakuru;

ssp. *hindii* 2 at Nairobi N.P.

Wing-snapping Cisticola *Cisticola ayresii*

mauensis

2 at Molo grasslands.

Black-faced Rufous Warbler *Bathmocercus*

rufus vulpinus

App 10 seen two days in Kakamega Forest.

Grey-capped Warbler *Eminia lepida*

2 heard and 1 seen in Busia and 1 at the water fall trail at Blue post hotel in Thika.

Taita Apalis *Apalis fuscigularis*

(Bar-throated Apalis)

2 seen well at Taita Hills.

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida*

ssp. *pugnax* common in Lake Nakuru;

ssp. *caniceps* a few seen around Kisumu.

Brown-tailed Apalis *Apalis viridiceps*

flavocincta

(Yellow-breasted Apalis)

App. 5 at Lake Baringo and 2 at Kitale.

Black-throated Apalis *Apalis j. jacksoni*

App. 10 at Gatamaiyu Forest.

Black-headed Apalis *Apalis m.*

melanocephala

2 in Arabuko Sokoke Forest and 1 Shimba hills.

Chestnut-throated Apalis *Apalis*

porphyrolaema

App 10 in Gatamaiyu Forest.

Buff-throated Apalis *Apalis rufogularis*

nigrescens

3 one day and 5 one day in Kakamega Forest.

Grey Apalis *Apalis c. cinerea*

2 in Gatamaiyu Forest.

Black-collared Apalis *Apalis p. pulchra*

1 seen and 5 heard in Gatamaiyu Forest and 2 at Nairobi Jockey club.

Green-backed Camaroptera *Camaroptera*

brachyura pileata

(Grey-backed Camaroptera)

1 at Arabuko Sokoke Forest.

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera*

brevicaudata

Seen 5 days. Lake Baringo, Lake Nakuru, Kitale, Kisumu and Nairobi N.P.

Olive-green Camaroptera *Camaroptera*

chloronota toroensis

2 in Kakamega Forest.

Grey Wren-Warbler *Calamonastes simplex*

App. 10 during the 2 days north of Garissa and 3 in Ologersailie.

Miombo Wren-Warbler *Calamonastes u.*

undosus

(Pale Wren-Warbler)

3 at Mara West Camp.

White-chinned Prinia *Schistolais leucopogon*

reichenowi

Fairly common in Kakamega Forest.

Red-fronted Apalis *Urorhipis rufifrons smithi*

(Red-fronted Warbler)

2 at Lake Baringo, 4 at Kapedo and 2 along the road between Ologersailie and Nairobi.

Buff-bellied Warbler *Phyllolais pulchella*

1 at Lake Nakuru, 3 at Lake Baringo and 4 at Nairobi N.P.

Dodson's Bulbul *Pycnonotus dodsoni*

(Common Bulbul)

Fairly common from Garissa and North, 1 in Tsavo East N.P.

Dark-capped Bulbul *Pycnonotus t. tricolor*

(Common Bulbul)

Very common except from Garissa and North.

Kakamega Greenbul *Andropadus k.*

kakamegae

(Shelley's Greenbul)

A few seen every day in Kakamega Forest.

Olive-breasted Greenbul *Andropadus*

kikuyuensis

(Mountain Greenbul)

App. 10 at Gatamaiyu Forest and 1 at Aberdare N.P.

Stripe-faced Greenbul *Andropadus striifacies*

(Stripe-cheeked Greenbul)

2 at Taita Hills.

Little Grey Greenbul *Andropadus gracilis*

ugandae

1 in Kakamega Forest.

Ansorge's Greenbul *Andropadus ansorgei*

kavirondensis

2 + 1 two days in Kakamega Forest.

Plain Greenbul *Andropadus c. curvirostris*

(Cameroon Sombre Greenbul)

3 seen one day in Kakamega Forest.

Slender-billed Greenbul *Andropadus g.*

gracilirostris

App. 5 seen one day in Kakamega Forest.

Yellow-whiskered Greenbul *Andropadus l.*

latirostris

The most common Greenbul in Kakamega.

Also Fairly common in Gatamaiyu Forest.

Sombre Greenbul *Andropadus importunus*

insularis

(Zanzibar Sombre Greenbul)

1 at the water fall trail at Blue post hotel Thika,

2 at Lake Chem Chem and 2 at Shimba hills.

Honeyguide Greenbul *Baeopogon i. indicator*

1 at Kakamega Forest.

Joyful Greenbul *Chlorocichla l. laetissima*

App. 10 seen 2 days in Kakamega.

Yellow-bellied Greenbul *Chlorocichla*

flaviventris centralis

2 in Arabuko Sokoke Forest.

Yellow-throated Leaflove *Chlorocichla*

flavicollis flavigula

3 at Kitale, 2 at Kongelai escarpment and 2 at Busia Grassland (in a small patch of forest)

Terrestrial Brownbul *Phyllastrephus*

terrestris suahelicus

1 in Arabuko Sokoke Forest.

Northern Brownbul *Phyllastrephus strepitans*

2 at Lake Baringo and heard at Gongoni.

Grey-olive Bulbul *Phyllastrephus c.*

cerviniventris

(Grey-olive Greenbul)

2 at the waterfall trail at Blue Post hotel Thika.

Toro Olive Greenbul *Phyllastrephus*

hypochloris

2 in Kakamega Forest.

Fischer's Greenbul *Phyllastrephus fischeri*

4 at Arabuko Sokoke forest.

Cabanis's Greenbul *Phyllastrephus cabanisi*

sucosus

2 in Kakamega Forest and 2 in Gatamaiyu Forest.

Tiny Greenbul *Phyllastrephus debilis rabai*

3 at Arabuko Sokoke Forest.

Red-tailed Bristlebill *Bleda syndactylus*

woosnami

4 seen in total two days in Kakamega Forest

Eastern Nicator *Nicator gularis*

A few seen all three days in Arabuko Sokoke Forest and Shimba hills.

Little Rush Warbler *Bradypterus baboecala*

elgonensis

1 in Kitale.

White-winged Swamp Warbler *Bradypterus*

carpalis

2 in Dunga Wetland, Kisumu – Lake Victoria.

Cinnamon Bracken Warbler *Bradypterus c. cinnamomeus*

2 in Gatamaiyu Forest and 3 in Aberdare N.P.

Moustached Grass Warbler *Melocichla mentalis amaouroura*

(African Moustached Warbler)

2 at Busia Grassland.

Greater Swamp Warbler *Acrocephalus rufescens ansorgei*

2 in Dunga Wetland, Kisumu – Lake Victoria

Lesser Swamp Warbler *Acrocephalus gracilirostris parvus*

1 singing Limuru wetland and 2 in Kitale.

Great Reed Warbler *Acrocephalus arundinaceus*

1 in a small pond along the road between Ologersailie and Nairobi.

Sedge Warbler *Acrocephalus schoenobaenus*

2 seen two days along a river close to Busia.

African Reed Warbler *Acrocephalus baeticatus cinnamomeus*

1 seen very well at Dunga Wetland, Kisumu – Lake Victoria.

Eastern Olivaceous Warbler *Hippolais pallida*

App. 10 at Lake Baringo.

Upcher's Warbler *Hippolais languida*

2 along the road north of Garissa.

Icterine Warbler *Hippolais icterina*

1 at Mara West Camp.

Dark-capped Yellow Warbler *Chloropeta natalensis massaica*

1 in Nairobi N.P.

Mountain Yellow Warbler *Chloropeta similis*

2 in Aberdare N.P.

Green Hylia *Hylia p. prasina*

3 seen one day in Kakamega Forest.

Yellow-throated Woodland Warbler

Phylloscopus ruficapilla minullus

3 + 1 imm that just had jumped / fallen out of the nest in Taita Hills.

Uganda Woodland Warbler *Phylloscopus budongoensis*

Fairly common in Kakamega Forest.

Brown Woodland Warbler *Phylloscopus umbrovirens mackensianus*

3 in Gatamaiyu Forest and 5 in Aberdare N.P.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*

Seen 8 days.

Common Chiffchaff *Phylloscopus collybita*

1 at Aberdare N.P.

Yellow-bellied Eremomela *Eremomela icteropygialis*

2 at Lake Baringo, 1 at Nairobi N.P and 2 at Ologersailie.

Yellow-vented Eremomela *Eremomela flavicrissalis*

1 seen two days in Lake Baringo.

Turner's Eremomela *Eremomela t. turneri*

3 the last day in Kakamega Forest.

Northern Crombec *Sylvietta brachyura leucopsis*

5 at Lake Baringo and app.8 north of Garissa.

Red-faced Crombec *Sylvietta whytii*

The most common Crombec. Seen 6 days.

Somali Crombec *Sylvietta isabellina*

(Somali Long-billed Crombec)

1 north of Garissa.

White-browed Crombec *Sylvietta l. leucophrys*

1 at Kakamega Forest and 2 at Gatamaiyu Forest.

African Hill Babbler *Sylvia a. abyssinica*

App. 10 at Gatamaiyu Forest.

Eurasian Blackcap *Sylvia atricapilla*

Fairly common. Seen 8 days.

Garden Warbler *Sylvia borin*

1 in Busia.

Barred Warbler *Sylvia nisoria*

1 ♂ along the road between Thika and Garissa. App. 8 north of Garissa.

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

Brown Parisoma *Sylvia lugens jacksoni*
2 at Kongelai escarpment.

Banded Parisoma *Sylvia b. boehmi*
1 along the road between Ologersailie and Nairobi.

Common Whitethroat *Sylvia communis*
3 north of Garissa.

Scaly-breasted Illadopsis *Illadopsis albipectus barakae*
3 in Kakamega Forest.

Mountain Illadopsis *Illadopsis p. pyrrhoptera*
4 in Kakamega Forest.

Rufous Chatterer *Turdoides r. rubiginosa*
A few seen three days at Lake Baringo and north up to Kapedo.

Brown Babbler *Turdoides plebejus cinerea*
App.5 at Lake Baringo. Fairly common in Kongelai escarpment.

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardineii kikuyuensis*
Common at Lake Nakuro N.P.

Scaly Babbler *Turdoides s. squamulata*
Fairly common in Arabuko Sokoke Forest.

Hinde's Babbler *Turdoides hindei*
4 at Wajee Nature Park.

Northern Pied Babbler *Turdoides h. hypoleuca*
App. 20 in Nairobi N.P.

Abyssinian White-eye *Zosterops abyssinicus flavilateralis*
4 in Nairobi N.P.

African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis*
The most common White-Eye. Seen 5 days.

Montane White-eye *Zosterops polioastrus kikuyuensis*
Common in Gatamaiyu forest and Aberdare N.P.

Taita White-eye *Zosterops silvanus*
(Montane White-eye)
Common in Taita hills. App. 20 seen in a few hours.

Abbott's Starling *Pholia femoralis*
2 ♂♂ and 1 ♀ in Gatamaiyu forest.

Sharpe's Starling *Pholia sharpii*
5 in Gatamaiyu forest.

Stuhlmann's Starling *Poeoptera stuhlmanni*
5 seen 2 days in Kakamega forest.

Greater Blue-eared Starling *Lamprotornis chalybaeus cyaniventris*
Common. Seen 10 days.

Lesser Blue-eared Starling *Lamprotornis chloropterus*
App 20 seen during the 2 days in Kitale and Kongelai escarpment.

Bronze-tailed Starling *Lamprotornis chalcurus emini*
App. 5 seen at Kitale. Could have been more. Very similar to Greater Blue-Eared.

Purple Starling *Lamprotornis purpureus amethystinus*
1 at Busia Grasslands.

Rüppell's Starling *Lamprotornis p. purpuroptera*
(Rüppell's Long-tailed Starling)
Common. Seen 12 days.

Golden-breasted Starling *Lamprotornis regius*
ssp. *regius* common at Garissa and north;
ssp. *magnificus* seen along the road between Voi and Malindi.

Black-bellied Starling *Notopholia c. corrusca*
Fairly common at the coast.

Superb Starling *Lamprotornis superbus*
One of the most common birds. Seen 17 days.

Hildebrandt's Starling *Lamprotornis hildebrandti*
Fairly common in and around Masai Mara N.P, Nairobi N.P and the area around Nairobi.

Shelley's Starling *Lamprotornis shelleyi*
App. 50 seen the two days north of Garissa.

Fischer's Starling *Lamprotornis fischeri*
First seen app. 50 km west of Garissa. Then common north of Garissa.

Magpie Starling *Speculipastor bicolor*
10 in Kapedo, common north of Garissa.

Violet-backed Starling *Cinnyricinclus leucogaster verreauxi*
App. 10 in Kitale and Kongelai escarpment and app. 10 in Masai Mara NP.

Red-winged Starling *Onychognathus morio rueppellii*
Seen 3 days. (Baringo and in Nairobi)

Slender-billed Starling *Onychognathus tenuirostris theresae*
2 at Aberdare N.P.

Waller's Starling *Onychognathus w. walleri*
App. 10 in Gatamaiyu forest.

Bristle-crowned Starling *Onychognathus salvadorii*
2 in the lodge at Lake Baringo. Seen both days in the garden.

Wattled Starling *Creatophora cinerea*
7 at Lake Baringo and ca 50 at Olorgesailie.

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*
Fairly common where there is animals. Lake Nakuru, Masai Mara, Nairobi N.P.

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus a. africanus*
Common in Masai Mara N.P.

White-tailed Rufous Thrush *Neocossyphus poensis praepectoralis*
(White-tailed Ant Thrush)
1 two days in Kakamega forest.

Taita Thrush *Turdus helleri*
1 + 2 Taita Hills. Extremely shy!

African Bare-eyed Thrush *Turdus tephronotus*
(Bare-eyed Thrush)
1 along the road between Thika and Garissa. 1 at Gongoni (15 km north of Malindi).

Mountain Thrush *Turdus a. abyssinicus*
(Olive Thrush)
Seen Limuru wetland, Lake Nakuru, Lake Naivasha and Aberdare N.P.

African Thrush *Turdus pelios centralis*
Seen 5 days, Kitale, Kakamega, Busia.

Brown-chested Alethe *Pseudalethe poliocephala carruthersi*
App. 5 seen two days in Kakamega forest.

White-starred Robin *Pogonocichla stellata* ssp. *intensa* 5 in Gatamaiyu forest, 2 in Aberdare N.P.;
ssp. *helleri* 1 at Taita hills.

Equatorial Akalat *Sheppardia a. aequatorialis*
App. 10 the first day in Kakamega forest.

East Coast Akalat *Sheppardia gunningi sokokensis*
2 in Arabuko Sokoke forest.

White-throated Robin *Irania gutturalis* (Irania)
1 ♂ between Garissa and Mado Gashi.

Cape Robin-Chat *Cossypha caffra iolaema*
1 on the way between Kisumu and Mara and 1 Aberdare N.P.

Grey-winged Robin-Chat *Sheppardia p. polioptera*
(Grey-winged Robin)
1 at Kakamega forest.

Rüppell's Robin-Chat *Cossypha semirufa intercedens*
1 along the road between Lake Baringo and Kitale and 1 Aberdare N.P.

White-browed Robin-Chat *Cossypha h. heuglini*
Fairly common. Seen 8 days.

Snowy-crowned Robin-Chat *Cossypha niveicapilla melanonota*
(Snowy-headed Robin-Chat)
Seen all three days at Kakamega forest.

Collared Palm Thrush *Cichladusa arquata*
2 at Roka Ponds.

Spotted Palm Thrush *Cichladusa guttata* (Spotted Morning Thrush)
ssp. *guttata* 5 Lake Baringo;
ssp. *intercalans* 1 along the road between Olorgesailie and Nairobi.

Bearded Scrub Robin *Erythropygia q. quadrivirgata*

(Eastern Bearded Scrub Robin)

App. 10 in Arabuko Sokoke forest.

Brown-backed Scrub Robin *Erythropygia hartlaubi*

1 at Nairobi Jockey club.

White-browed Scrub Robin *Erythropygia leucophrys*

Fairly common. Seen 9 days. (ssp. *leucoptera* around Baringo, ssp. *zambesiana* at Kongelai escarpment and ssp. *brunneiceps* at Nairobi NP and Olorgesailie)

Rufous-tailed Scrub Robin *Erythropygia galactotes*

(Rufous Bush Chat)

1 south of Garissa, 1 south of Mado Gashi and 1 in Olorgesailie.

Whinchat *Saxicola rubetra*

2 Limuru wetland, 2 at Kongelai escarpment and 1 at Mara west camp.

Eurasian Stonechat *Saxicola torquatus axillaris*

(Common Stonechat)

Seen 7 days.

Capped Wheatear *Oenanthe pileata livingstonii*

Seen 2 days at Molo grasslands, 1 along the road between Mara and Lake Naivasha and 5 in Nairobi N.P.

Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*

Fairly common in dry country.

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*

Seen 14 days. Common.

Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka*

1 ♂ Lake Baringo, 1 ♂ Kapedo and 5 in the area around Olorgesailie.

Schalow's Wheatear *Oenanthe schalowi*

1 pair between Nairobi and Lake Nakuru.

Familiar Chat *Cercomela familiaris falkensteini*

App. 5 around Mara west camp.

Brown-tailed Rock Chat *Cercomela scotocerca turkana*

Common Lake Baringo.

Moorland Chat *Pinarochroa sordida ernesti*
(Alpine Chat)

Common in Aberdare N.P.

Anteater Chat *Myrmecocichla aethiops cryptoleuca*

(Northern Anteater Chat)

Seen 6 days. Lake Nakuru, Lake Baringo, Kitale and Naivasha.

Sooty Chat *Myrmecocichla nigra*

App. 10 seen two days in and around Masai Mara N.P.

Mocking Cliff Chat *Thamnolaea cinnamomeiventris subrufipennis*

(Cliff Chat)

Common around Lake Baringo.

Rufous-tailed Rock Thrush *Monticola saxatilis*

(Common Rock Thrush)

1 imm Kongelai escarpment, 3 north of Garissa, 1 Taita hills and 1 Shimba hills.

White-eyed Slaty Flycatcher *Dioptornis f. fischeri*

Seen 7 days. Lake Nakuru, Kongelai, Kakamega, Mara West, Gatamaiyu, Aberdare and Thika.

Northern Black Flycatcher *Melaenornis edolioides lugubris*

Seen 5 days. Kakamega, Kisumu and Mara west.

Southern Black Flycatcher *Melaenornis p. pammelaina*

1 in Lake Nakuru and 1 in Taita hills.

Pale Flycatcher *Bradornis pallidus*

Seen 5 days.

ssp. *murinus* Kitale, Kongelai and Mara west; ssp. *bafirawari* Garissa and Mado Gashi.

African Grey Flycatcher *Bradornis microrhynchus*

Fairly common, Seen 8 days.

Silverbird *Empidonax semipartitus kavirondensis*
2 in Kitale.

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*
Seen 4 days, Lake Baringo, Kitale, Mara west and Olorgesailie.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens cinereola*
4 in Arabuko Sokoke forest.

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica infulata*
App. 5 Dunga wetland, Kisumu – Lake Victoria.

Chapin's Flycatcher *Muscicapa l. lendu*
2 in Kakamega forest.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*
Seen 7 days in various habitats.

Grey Tit-Flycatcher *Myioparus p. plumbeus*
(Lead-coloured Flycatcher)
1 Lake Baringo and 1 Kitale.

Plain-backed Sunbird *Anthreptes reichenowi yokanae*
1 ♂ in Arabuko Sokoke forest.

Eastern Violet-backed Sunbird *Anthreptes orientalis*
Fairly common. Seen 7 days.

Grey-chinned Sunbird *Anthreptes rectirostris tephrolaemus*
(Green Sunbird)
1 ♂ Kakamega forest.

Collared Sunbird *Anthodiaeta collaris*
ssp. *garguensis* fairly common. Seen 6 days;
ssp. *elachior* seen 1 day around Malindi.

Amani Sunbird *Anthodiaeta pallidigaster*
1 ♂ 2 ♀♀ Arabuko Sokoke forest.

Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis viridisplendens*
A few seen 2 days in Kakamega and app. 10 in Gatamaiyu forest.

Western Olive Sunbird *Cyanomitra obscura ragazzii*
(Olive Sunbird)
1 imm ♂ in Kakamega forest.

Eastern Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea*
(Olive Sunbird)
ssp. *neglecta* 1 in Gatamaiyu forest, app.5
Aberdare N.P.;
ssp. *changamwensis* 1 Taita hills and app. 5 in Arabuko Sokoke forest.

Green-throated Sunbird *Chalcomitra r. rubescens*
In total app. 10 during two days in Kakamega forest.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina kirkii*
5 at Lake Nakuru.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis lamperti*
Seen 6 days. Lake Nakuru, Kakamega, Busia and Thika.

Hunter's Sunbird *Chalcomitra hunteri*
1 ♂ Lake Baringo, App. 5 Kapedo and fairly common Garissa and north.

Tacazze Sunbird *Nectarinia tacazze jacksoni*
3 ♂♂ and 1 ♀ Aberdare N.P.

Bronzy Sunbird *Nectarinia kilimensis kilimensis*
Seen 5 days. Molo grasslands, Busia grasslands, Mara west and Nairobi N.P.

Scarlet-tufted Sunbird *Nectarinia j. johnstoni*
(Scarlet-tufted Malachite Sunbird)
1 ♂ in Aberdare N.P.

Golden-winged Sunbird *Drepanorhynchus r. reichenowi*
4 at Molo grasslands and common in Aberdare N.P.

Northern Double-collared Sunbird *Cinnyris r. reichenowi*
1 ♂ in Kakamega forest and 5 in Gatamaiyu forest.

Eastern Double-collared Sunbird *Cinnyris mediocris*

Seen 4 days. Gatamaiyu forest, Aberdare N.P, Taita hills and Arabuko Sokoke forest.

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchellus*

ssp. *pulchellus* common around Lake Baringo and up to Kapedo;
ssp. *melanogastrus* in the area around Olorgesailie.

Marico Sunbird *Cinnyris mariquensis*

Seen 5 days.
ssp. *osiris* in Kitale, Kongelai escarpment;
ssp. *suaelicus* in Kisumu and Olorgesailie.

Red-chested Sunbird *Cinnyris erythrocerius*

App. 10 seen during three days around Busia and Kisumu.

Purple-banded Sunbird *Cinnyris bifasciatus microrhynchus*

1 ♂ at Mida Creek.

Tsavo Sunbird *Cinnyris tsavoensis*

(Purple-banded Sunbird)

1 ♂ along the road between Voi and Malindi.

Shining Sunbird *Cinnyris habessinicus turkanae*

1 ♂ Kapedo.

Variable Sunbird *Cinnyris venustus*

One of the most common sunbirds. Seen 10 days.
ssp. *albiventris* in E and NE (Garissa – Mado Gashi);
ssp. *falkensteini* in W and central.

Copper Sunbird *Cinnyris c. cupreus*

1 ♂ Busia.

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali melanorhynchus*

Fairly common. Seen 10 days.

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver

Plocepasser superciliosus

App. 10 seen during two days around Kitale and Kongelai escarpment.

Donaldson-Smith's Sparrow-Weaver

Plocepasser donaldsoni

App. 10 around Mado Gashi.

Grey-capped Social Weaver *Pseudonigrita arnaudi*

ssp. *dorsalis* one nesting tree in Masai Mara with app. 20 birds;
ssp. *arnaudi* common around Olorgesailie.

Somali Sparrow *Passer castanopterus fulgens*

App. 50 in Kapedo.

Kenya Sparrow *Passer rufocinctus*
(Rufous Sparrow)

Fairly common. Seen 8 days.

Parrot-billed Sparrow *Passer gongonensis*
(Grey-headed Sparrow)

App. 5 Lake Baringo, 10 Kapedo, 10 Mado Gashi and 2 Shimba hills.

Swahili Sparrow *Passer suaelicus*
(Grey-headed Sparrow)

App. 10 both days in Masai Mara and Mara west camp.

Northern Grey-headed Sparrow *Passer griseus ugandae*

(Grey-headed Sparrow)

Fairly common. Seen 7 days.

Yellow-spotted Petronia *Gymnoris p. pyrgita*

Fairly common. Seen 8 days.

White-billed Buffalo Weaver *Bubalornis albirostris*

Common Lake Baringo.

Red-billed Buffalo Weaver *Bubalornis niger intermedius*

App. 10 just North of Garissa, app. 10 along the road between Nairobi and Voi and app. 10 Voi.

White-headed Buffalo Weaver *Dinemellia d. dinemelli*

Common in dry habitat. Lake Baringo and north to Kapedo and Garissa to Mado Gashi.

Speckle-fronted Weaver *Sporopipes frontalis emini*

App. 10 seen during two days in Kongelai escarpment.

Weavers: This is birds you will see everywhere. It takes time to separate them and our guide, Chege, knew what to look for and

where. One could certainly see much more in many places. The question is – Is it worth the time... We did not stay to identify weavers as long as we had seen the species we “needed” in each area.

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons montana*

(Grosbeak Weaver)

5 ♂ + 1 ♀ Mara west camp.

Compact Weaver *Pachyphantus superciliosus*
App. 20 Busia.

Baglafaecht Weaver *Ploceus baglafaecht*
Fairly common. Seen 8 days. (ssp. *reichenowi* in highlands and ssp. *emini* in Kongelai escarpment)

Slender-billed Weaver *Ploceus p. pelzelni*
2 ♀♀ Dunga wetland, Kisumu – Lake Victoria.

Little Weaver *Ploceus l. luteolus*
Common Lake Baringo and north to Kapedo. App. 20 Kitale and Kongelai escarpment and a few in Thika.

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis*
Seen 5 days. Kisumu (ssp. *crocatus*), Lake Nakuru, Gatamaiyu, Aberdare and Thika (ssp. *suaelicus*).

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis*
ssp. *nigricollis* a few seen two days in Kakamega forest;
ssp. *melanoxanthus* 4 in Taita hills.

Black-billed Weaver *Ploceus melanogaster stephanophorus*
In total 5 seen two days in Kakamega forest.

Yellow Weaver *Ploceus subaureus aureoflavus*
(African Golden Weaver)
App. 20 along the road between Nairobi and Voi.

African Golden Weaver *Ploceus xanthops*
(Holub's Golden Weaver)
Seen 5 days. Kitale, Kongelai, Kisumu, Mara west.

Heuglin's Masked Weaver *Ploceus heuglini*
App. 10 in Kakamega forest.

Golden Palm Weaver *Ploceus bojeri*
1 ♂ Roka ponds close to Malindi.

Northern Brown-throated Weaver *Ploceus castanops*
App. 20 Dunga wetland, Kisumu – Lake Victoria.

Northern Masked Weaver *Ploceus t. taeniopterus*
In total app. 20 during two days Lake Baringo.

Lesser Masked Weaver *Ploceus i. intermedius*
Seen 5 days. Lake Baringo - Kapedo, Garissa – Mado Gashi and Ologesaile.

Vitelline Masked Weaver *Ploceus vitellinus uluensis*
Seen 4 days. Limuru wetland, Kitale, Kongelai and low on Taita hills.

Speke's Weaver *Ploceus spekei*
1 ♂ Limuru wetland and 2 in Tsavo east N.P.

Village Weaver *Ploceus cucullatus*
(Black-headed Weaver)
Seen 7 days. (ssp. *bohndorffi* in the west and ssp. *nigriceps* (incl. *paroptus*) in the central and east)

Vieillot's Black Weaver *Ploceus n. nigerrimus*
In total 5 seen two days in Kakamega.

Black-headed Weaver *Ploceus melanocephalus fischeri*
(Yellow-backed Weaver)
1 ♂ along the road between Busia and Kisumu.

Golden-backed Weaver *Ploceus jacksoni*
(Jackson's Golden-backed Weaver)
2 ♂♂ Lake Baringo, common Busia and Kisumu.

Chestnut Weaver *Ploceus r. rubiginosus*
Ca 30 Kongelai escarpment and 1 along the road between Ologesaile and Nairobi.

Dark-backed Weaver *Ploceus bicolor*
ssp. *mentalis* app. 20 during two days in
Kakamega;
ssp. *kersteni* app. 5 in Arabuko Sokoke forest.

Brown-capped Weaver *Ploceus insignis*
In total 5 seen in Kakamega forest.

Red-headed Malimbe *Malimbus r. rubricollis*
2 pairs Kakamega forest.

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps*
leuconotos
A few seen at Lake Nakuru and Kongelai
escarpment.

Cardinal Quelea *Quelea c. cardinalis*
2 Busia Grassland.

Red-billed Quelea *Quelea quelea aethiopica*
App. 10 Mado Gashi – Garissa.

Black Bishop *Euplectes gierowii aethiopica*
1 ♂ along the road between Busia and Kisumu.

Zanzibar Red Bishop *Euplectes nigroventris*
1 ♂ Lake Chem Chem.

Southern Red Bishop *Euplectes orix*
2 ♂♂ along the road between Kisumu and
Masai Mara.

Yellow Bishop *Euplectes capensis*
crassirostris
Seen 6 days. Kitale, Kongelai, and Nairobi
N.P. and common in Masai Mara.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris*
phoeniceus
Seen 4 days. Kitale, Busia and Masai Mara.

Yellow-mantled Widowbird *Euplectes*
macroura
ssp. *macrocerca* seen around Busia;
ssp. *macroura* app. 20 during two days in
Masai Mara N.P.

White-winged Widowbird *Euplectes*
albonotatus eques
Seen 4 days. Kitale, Kongelai, Thika and along
the road between Ologesailie and Nairobi.

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*
suaelicus
Seen 4 days. Masai Mara, Aberdare and
Nairobi N.P.

Long-tailed Widowbird *Euplectes progne*
delamerei
1 ♀ Kinangop Plateau and 3 ♂♂ + 1 ♀ along
the road between Naivasha and Aberdare N.P.

Jackson's Widowbird *Euplectes jacksoni*
App. 50 along road B5 north of Nyeri.

White-breasted Nigrita *Nigrita f. fusconotus*
(**White-breasted Nigrofinch**)
In total app. 25 during 3 days in Kakamega
forest.

Grey-headed Nigrita *Nigrita canicapillus*
diabolicus
1 in Gatamaiyu forest.

Green-winged Pytilia *Pytilia melba*
soudanensis
5 Lake Baringo, 4 Kapedo and 5 Mado Gashi.

Cut-throat Finch *Amadina fasciata*
alexanderi
App. 50 in Tsavo east N.P.

Abyssinian Crimsonwing *Cryptospiza*
salvadorii kilimensis
3 Aberdare N.P.

Red-headed Bluebill *Spermophaga r.*
ruficapilla
In total 8 seen during 3 days in Kakamega
forest.

Red-throated Twinspot *Hypargos*
niveoguttatus macrospilotus
(**Peters's Twinspot**)
1 pair Arabuko Sokoke forest and 1 pair Lake
Chem Chem.

Black-bellied Firefinch *Lagonosticta r. rara*
1 ♀ Busia grassland.

Bar-breasted Firefinch *Lagonosticta*
rufopicta lateritia
Fairly common Busia grassland.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala*
ssp. *ruberrima* seen 2 days at Lake Nakuru and
Lake Baringo;
ssp. *somaliensis* 2 days along the coast.

African Firefinch *Lagonosticta rubricata*
ugandae
1 pair Lake Nakuru, app. 10 seen during two
days in Kitale and Kongelai.

Red-cheeked Cordon-bleu *Uraeginthus*
bengalus
Seen 6 days. Lake Nakuru, Lake Baringo,
Kitale, Kongelai (ssp. *bengalus*), Nairobi N.P
(ssp. *brunneigularis*) and Gongoni (ssp.
littoralis).

Blue-capped Cordon-bleu *Uraeginthus*
cycnocephalus
3 Kapedo and 3 just north of Garissa.

Purple Grenadier *Granatina ianthinogaster*
Seen 6 days. Lake Baringo, Masai Mara,
Aberdare and Ologersailie.

Yellow-bellied Waxbill *Coccygia quartinia*
kilimensis
2 at Gatamaiyu forest and 3 Aberdare N.P.

Fawn-breasted Waxbill *Estrilda p.*
paludicola
2 Busia grasslands.

Common Waxbill *Estrilda astrild*
Seen 4 days. Lake Baringo, Busia grassland,
Mara west and Aberdare N.P.

Black-crowned Waxbill *Estrilda n. nonnula*
5 in Kakamega and 5 Busia grassland.

African Quail-Finch *Ortygospiza fuscocrissa*
muelleri

(Quail-Finch) *Ortygospiza atricollis*
1 Molo grasslands and app. 20 in Masai Mara.

Bronze Mannikin *Spermestes cucullata*
scutata
Fairly common. Seen 8 days.

Black-and-white Mannikin *Spermestes*
bicolor poensis
App. 10 in Kakamega forest.

Red-backed Mannikin *Spermestes n.*
nigriceps
2 Gatamaiyu forest and fairly common at the
coast the last 2 days.

Village Indigobird *Vidua chalybeata centralis*
1 pair Dunga wetland lake Victoria, Kisumu.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*
Fairly common. Seen 7 days.

Straw-tailed Whydah *Vidua fischeri*
1 pair Kapedo.

Long-tailed Paradise Whydah *Vidua*
paradisaea
(Paradise Whydah)

Common Garissa and north and ca 10 Tsavo
East NP.

Cuckoo Weaver *Anomalospiza imberbis*
(Parasitic Weaver)
App. 50 Gongoni. Chege had never seen such a
big flock in this area before.

Long-billed Pipit *Anthus similis chyuluensis*
1 along the road between Busia and Kisumu, 1
Mara West camp, 1 along the road between
Ologersailie and Nairobi and 1 Nairobi N.P.
[The pipit seen in Nairobi NP might constitute
a split called “**Nairobi Pipit**”. A forest pipit.
Always in trees not on the ground as Long-
billed. For further information see:
<http://www.africanbirdclub.org/phorum/read.php?32,1270>]

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys*
Seen 5 days.
ssp. *goodsoni* Lake Nakuru and Lake Baringo;
ssp. *zenkeri* Mara west camp and Masai Mara.

Malindi Pipit *Anthus m. melindae*
2 found after some time of searching in
Gongoni.

Striped Pipit *Anthus lineiventris*
1 seen Taita hills.

Red-throated Pipit *Anthus cervinus*
2 Molo grassland.

Tree Pipit *Anthus trivialis*
Seen 5 days.

African Pipit *Anthus cinnamomeus*

(Grassland Pipit)

ssp. *lacuum* fairly common Kinangop plateau,
1 Masai Mara, app. 5 Nairobi N.P;
ssp. *annae* app. 10 Gongoni.

Sokoke Pipit *Anthus sokokensis*

2 in Arabuko Sokoke forest.

Golden Pipit *Tmetothylacus tenellus*

Fairly common Garissa and North and 2 Tsavo
East N.P.

Sharpe's Longclaw *Hemimacronyx sharpei*

1 seen the first day at Molo grasslands and 2
seen at the same place on the second visit.

Yellow-throated Longclaw *Macronyx*

croceus

Fairly common in grasslands. Seen 7 days.

Pangani Longclaw *Macronyx aurantiigula*

2 along the road between Nairobi and Voi.

Rosy-throated Longclaw *Macronyx ameliae*

(Rosy-breasted Longclaw)

2 in Masai Mara.

White Wagtail *Motacilla alba*

1 in a stream along the road between
Kakamega and Busia.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp vidua*

Common. Seen 17 days.

Western Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Common. Seen 10 days.

Cape Wagtail *Motacilla capensis wellsi*

1 at Limuru Wetland.

Grey Wagtail *Motacilla c. cinerea*

1 seen at the same place in Kakamega forest 2
days.

Mountain Wagtail *Motacilla clara torrentium*

2 in Aberdare N.P. and 4 at the waterfall trail,
Blue post hotel Thika.

Yellow-crowned Canary *Serinus f. flavivertex*

2 Molo grasslands and app. 20 along the road
between Naivasha and Aberdare N.P.

African Citril *Serinus citrinelloides kikuyensis*

App. 10 at the waterfall trail, Blue post hotel
Thika.

Southern Citril *Serinus hypostictus brittoni*

(African Citril)

1 ♂ along the road from Kitale to Kakamega
and common at Busia grasslands.

Papyrus Canary *Serinus koliensis*

2 at Dunga wetland, Lake Victoria – Kisumu.

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus*

The most common Canary. Seen 8 days.

ssp. *barbatus* in the west;

ssp. *mozambicus* along the coast.

Northern Grosbeak-Canary *Serinus*

donaldsoni

5 between Garissa and Mado Gashi.

Southern Grosbeak-Canary *Serinus*

buchanan

1 ♂ along the road between Olorgesailie and
Nairobi.

White-bellied Canary *Serinus dorsostriatus*

App. 10 Lake Baringo and app. 5 Olorgesailie.

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus*

sharpii

Seen 5 days. Kitale, Kongelai escarpment,
Kisumu and Olorgesailie.

Streaky Seedeater *Serinus s. striolatus*

Seen 5 days. Kinangop plateau, on the hillsides
of Rift Valley and Aberdare N.P.

Thick-billed Seedeater *Serinus burtoni*

albifrons

3 in Gatamaiyu forest.

Oriole Finch *Linurgus olivaceus elgonensis*

1 pair Kakamega forest.

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza t.*

tahapisi

(Cinnamon-breasted Rock Bunting)

5 seen during two days in Masai Mara N.P.

Somali Bunting *Emberiza poliopleura*

(Somali Golden-breasted Bunting)

1 ♂ Kapedo.

Golden-breasted Bunting *Emberiza*

flaviventris kalaharica

Seen 4 days. 3 during 2 days Kongelai
escarpments, 1 along the road between Kisumu
and Mara, 5 Olorgesailie.

Introduced Species

House Sparrow *Passer domesticus*

Common

Rock Pigeon *Columba livia*

Fairly common

(Indian) House Crow *Corvus splendens*

Common along the coast.

Fischer's / Yellow-collared Lovebird

Agapornis fischeri / *Agapornis personatus*

Seen in a few places e.g. Lake Nakuru and
Kisumu. Difficult to separate due to extensive
hybridization.

Mammal List

The taxonomy follows **Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)**, Johns Hopkins University Press.

Accessed at <http://www.bucknell.edu/msw3/>.

Golden-rumped Elephant Shrew

Rhynchocyon chrysopygus

3-4 Arabuko Sokoke Forest

Rock Hyrax *Procavia capensis*

Ca 10 Baringo

African Bush Elephant *Loxodonta africana*

Common in Masai Mara. Aberdare NP, Shimba Hills

Northern Greater Galago *Otolemur garnettii*

1 heard Arabuko Sokoke forest

Sykes' Monkey *Cercopithecus albogularis*

Aberdare NP, Arabuko Sokoke forest

Red-tailed Monkey *Cercopithecus ascanius*

Kakamega forest

Blue Monkey *Cercopithecus mitis*

Kakamega forest, Thika Blue Post Hotel

Olive Baboon *Papio anubis*

Kakamega forest, common Masai Mara

Yellow Baboon *Papio cynocephalus*

Arabuko Sokoke forest

Angola Colobus *Colobus angolensis*

Lake Nakuru NP, Kakamega forest

Striped Ground Squirrel *Xerus erythropus*

Lake Nakuru NP

Unstriped Ground Squirrel *Xerus rutilus*

Ca 10 between Garissa and Mado Gashi

Red-legged Sun Squirrel *Heliosciurus*

rufobrachium (Zanj Sun Squirrel)

Kakamega forest

Red Bush Squirrel *Paraxerus palliatus* (Red-bellied Coast-Squirrel)

Arabuko Sokoke forest, Shimba Hills

Forest Giant Squirrel *Protoxerus stangeri*

(African Giant Squirrel)

Kakamega forest

Striped Grass Mouse sp. *Lemniscomys sp.*

Kakamega forest

Cape Hare *Lepus capensis*

Baringo, Mara west camp

Yellow-winged Bat *Lavia frons*

1 between Busia and Kisumu, 1 between Garissa and Mado Gashi

Cheetah *Acinonyx jubatus*

1 Masai Mara

Serval *Leptailurus serval*

1 Masai Mara, 1 Nairobi NP

Lion *Panthera leo*

1 Lake Nakuru NP and ca 10 Masai Mara

Ethiopian Dwarf Mongoose *Helogale hirtula*

(Somali Dwarf Mongoose)

2 between Garissa and Mado Gashi

Egyptian Mongoose *Herpestes ichneumon*

(Slender-tailed Mongoose)

1 between Busia and Kisumu, 1 between Garissa and Mado Gashi

Banded Mongoose *Mungos mungo*

5 + 15 + 5 Masai Mara

Spotted Hyena *Crocuta crocuta*

1 + 1 Masai Mara.

Black-backed Jackal *Canis mesomelas*

4 Masai Mara

Burchell's Zebra *Equus burchellii*

Mara west camp, common Masai Mara, Nairobi NP

Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10

White Rhinoceros *Ceratotherium simum*
Nakuru NP

Black Rhinoceros *Diceros bicornis*
1 Masai Mara, 6 Nairobi NP

Common Warthog *Phacochoerus africanus*
Common Masai Mara, Aberdare NP, Nairobi NP

Common Hippopotamus *Hippopotamus amphibius*
Ca 50 Masai Mara, Nairobi NP

Giraffe *Giraffa camelopardalis*
Mara west camp, common Masai Mara, Nairobi NP, Shimba Hills

Impala *Aepyceros melampus*
Lake Nakuru NP, common Masai Mara, common Nairobi NP

Hartebeest *Alcelaphus buselaphus* (Kongoni (cookei))
1 Masai Mara, common Nairobi NP, Shimba Hills

Blue Wildebeest *Connochaetes taurinus* (Brindled Gnu)
Ca 100 Masai Mara (all but 2 east of the park), common Nairobi NP

Topi *Damaliscus korrigum*
Common Masai Mara

Thomson's Gazelle *Eudorcas thomsonii*
Lake Nakuru NP, common Masai Mara, common Nairobi NP

Gerenuk *Litocranius walleri*
1 Garissa–Mado Gashi

Kirk's Dikdik *Madoqua kirkii* (Salt's Dikdik)
1 Lake Nakuru NP and 5 between Garissa and Mado Gashi

Grant's Gazelle *Nanger granti*
Lake Nakuru NP, 1 Nairobi NP

Suni *Neotragus moschatus*
Arabuko Sokoke forest

Oribi *Ourebia ourebi*
Mara west camp, 3 Masai Mara,

African Buffalo *Syncerus caffer*
Common Masai Mara, Shimba Hills

Common Eland *Taurotragus oryx*
1 male Masai Mara, common Nairobi NP

Bushbuck *Tragelaphus scriptus*
1 pair Masai Mara, Aberdare NP, Nairobi NP, Shimba Hills

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus*
Common Masai Mara, Aberdare NP

Common Reedbuck *Redunca redunca* (Bohor Reedbuck)
1 Nairobi NP

Reptiles

Nile Monitor Lizzard *Varanus niloticus*
Baringo

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus*
Sabaki river delta

White-headed Dwarf Gecko *Lygodactylus picturatus*
Malindi

Rainbow Skink *Trachylepis margaritifera*
1 between Busia and Kisumu