

Colombia
22/2-19/3 2011



Heliangelus naturresor

Samuel Hansson
Bondegatan 2
573 40 Tranås

www.heliangelus.se
heliangelus@telia.com
Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Håkan Carlestam, Örebro
Ola Elleström, Malmö
Henry Hirsimäki, Varberg
Erling Jirle, Lund
Joakim Johansson, Örebro
Nils Kjellén, Lund
Bengt-Eric Sjölander, Degerhamn

Inledning

När jag startade Heliangelus naturresor och bestämde mig för att direkt satsa på en resa till Colombia såg jag det som en stor chansning. Skulle folk verkligen nappa, med all negativ publicitet som Colombia fått under så många år? Glädjande nog gick det vägen, och sedan har det blivit en resa varje år till världens fågelrikaste land. Förutsättningarna har hela tiden förbättrats och denna gång gick allt i lås, alltifrån logistik (trots många usla vägar) till det utmärkta slutresultatet 655 arter fåglar, inklusive hela 53+ endemer. För tio år sedan hade en sådan här lyckad resa varit fullständigt utopisk, det är bara att tacka ProAves Colombia och Ecoturs som faktiskt gjort det möjligt!

Resan bestod av två delar. Först gjorde vi en rundtur i centrala Colombia som omfattade Andernas tre bergskedjor, sedan flög vi till den karibiska kusten där vi besökte Colombias högsta berg Sierra Nevada de Santa Marta och området kring Ríohacha på Guajírahalvön. I centrala Colombia var transportlösningen ganska avancerad då vi ett flertal gånger fick växla mellan minibuss och jeepar, men samma buss följde oss hela tiden med den ständigt telefonpratande men trevlige och hjälpsamme Jorge som chaufför, och allt flöt på bra. Santa Marta-delen krävde också dessa båda transportmedel, men bara ett i taget. Den här gången hade jag en grupp av mycket rutinerade resenärer och duktiga skådare med mig, vilket bidrog till det fina slutresultatet. Tack för en trevlig resa! Tack även till Erling för kartan och Joakim för fotografierna till den här rapporten!

Höjdpunkterna under resan var som sagt många, och bland dessa bör följande nämnas: Northern Screamer, Chestnut-winged Chachalaca, Gorgeted Wood-Quail, Marbled Godwit, Forster's Tern (ca 3:e fyndet i Colombia), Yellow-eared Parrot, Flame-winged och Santa Marta Parakeets, Saffron-headed Parrot, Santa Marta Screech-Owl, Cloudforest Pygmy-Owl, Chestnut-bellied Hummingbird, Blossomcrown, Black-backed Thornbill (!), Bearded Helmetcrest, Dusky Starfrontlet, White-mantled Barbet, Chestnut Piculet, Star-chested Treerunner, Recurve-billed Bushbird, Urrao, Bicolored, Brown-banded, Santa Marta och Yellow-breasted Antpittas, Paramillo, Magdalena och Alto Pisones Tapaculos, Yellow-throated Spadebill, Chestnut-capped Piha, Niceforo's och Apolinar's Wrens, Munchique Wood-Wren, Chocó och Black-whiskered Vireos, Santa Marta Warbler, Multicolored, Scarlet-and-white, Black-and-gold och Gold-ringed Tanagers, Turquoise Dacnis, Chestnut-bellied Flowerpiercer, Sooty Ant-Tanager och Red-bellied Grackle. Ett fantastiskt resultat!

När blir nästa resa till Colombia? Det är i dagsläget osäkert, men klart är att det inte blir under 2012. Förhoppningsvis kan jag få till en ny resa under 2013, kanske med ännu bättre förutsättningar ...

/Samuel Hansson

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Mundo Nuevo

Betesmarker med starkt fragmenterad skog på lägre nivåer och sammanhängande skog övergående i páramo högre upp, precis utanför Chingaza NP i östra Anderna ovanför Bogotá. ProAves driver ett holkprojekt för Flame-winged Parakeet i området, som ligger på ungefär 2 700–3 000 meters höjd. Andra möjligheter inkluderar främst ett flertal trevliga kolibrier och White-capped Tanager.

Parque La Florida

En av få kvarvarande våtmarker i Sabana de Bogotá och klassisk lokal för Bogotá Rail och Apolinar's Wren. Ligger precis i utkanten av Bogotá och är ett populärt utflyktsmål för allmän rekreation.

Laguna de Fúquene

En av de största kvarvarande sjöarna i östra Anderna och kärnområde för bl.a. Apolinar's Wren och Spot-flanked Gallinule. Även bra för Least Bittern, Noble Snipe, Black-backed Grosbeak och Silvery-throated Spinetail samt allehanda våtmarksfåglar.

San Gil

Pittoresk stad i en torrare dalgång i östra Anderna. I utkanten av staden i anslutning till Río Fonce finns en liten naturpark med högstammig, lummig skog. Här finns förvånansvärt mycket fågel inklusive den extremt sällsynta Niceforo's Wren, Colombian Chachalaca, Bar-crested Antshrike och Golden-winged Sparrow.

Reserva Natural Reinita Cielo Azul

Sedan några år tillbaka äger ProAves 209 ha skyddad skog ovanför staden San Vicente de Chucurí i den från Anderna utskjutande bergsryggen Serranía de los Yarigués. Höjden över havet är omkring 1 600–1 800 meter. Vi skådade dessutom i kakao- och kaffeplantagerna nedanför skogen kring 1 300–1 500 meter. Gorgeted Wood-Quail, Chestnut-bellied Hummingbird, Black Inca, White-mantled Barbet, Recurve-billed Bushbird, Magdalena Tapaculo, Yellow-throated Spadebill, Turquoise Dacnis och Mountain Grackle är målarterna.

Reserva Natural Pauxi pauxi

Detta är ett av ProAves senast inköpta reservat, på hela 1 872 ha, beläget i Serranía de los Yarigués mellan 800–1300 m. Det mesta av skogen är otillgänglig för besökare, och huvudarten Northern Helmeted Curassow (*Pauxi pauxi*) är sällsynt. Den relativt dåligt utforskade fågelfaunan innehåller också sådana godbitar som Saffron-headed Parrot, Beautiful Woodpecker, Double-banded Graytail, Recurve-billed Bushbird och Sooty Ant-Tanager

Medio Magdalena

Samlingsbegrepp på de områden vi passerade under transporten från San Vicente de Chucurí ner genom mellersta Magdalenadalen. Naturen består av låglänta, mestadels flacka eller småkuperade områden med betes- och odlingsmarker, våtmarker (framfört allt säsongsbundna) och skogsrester. Northern Screamer är inte ovanlig i lämplig biotop, och man vet aldrig vad som kan dyka upp!

Reserva Natural Arrierito Antioqueño

Detta reservat (Arrierito Antioqueño = Chestnut-capped Piha) ligger i norra änden av Cordillera Central nära staden Anorí. Den skyddade arealen uppgår till 312 ha mellan 1500–1800 meter. Förutom pihan är de stora specialarna Multicolored, Purplish-mantled och Black-and-gold Tanagers, Parker's Antbird, Stiles's Tapaculo, Cinnamon Screech-Owl och Red-bellied Grackle.

Reserva Natural Colibri del Sol

Beläget nära Urrao i västra Andernas Páramo de Frontino, ett av Colombias bäst bevarade områden vid och ovanför trädgränsen. Reservatet är 582 ha stort och spänner mellan 2 750–3 800 meter i höjdd. Den endemiska Frailejon de Frontino *Espeletia frontinoensis* är karaktärsväxt uppe på

páramon, och reservatet är kärnområdet för den nyligen beskrivna Urrao Antpitta, den mycket sällsynta Dusky Starfrontlet samt Paramillo Tapaculo och Chestnut-bellied Flowerpiercer.

Reserva Natural Las Tangaras

ProAves senast inköpta reservat, beläget på västslutningen av Västra Anderna i den lägre subtropiska zonen kring 1 600–1 800 m. Området bjuder på suverän skådning i centrum av Chocóregionen med den obeskrivna Alto Pisonos Tapaculo, *Bangsia* x 2, Chocó Vireo och en uppsjö av andra Chocó-endemer som är betydligt enklare att se i Colombia än i Ecuador. En av resans klara höjdpunkter!

Jardín

Ovanför Jardín i västra Anderna ligger det 117 ha stora ProAves-reservatet Loro Orejiamarillo. Reservatet skyddar i första hand häckningsområdet för omkring 400 Yellow-eared Parrots, vilket är nästan halva världspopulationen! En hel del andra trevliga fåglar förekommer, men vi missade tyvärr de främsta specialarna Chestnut-crested Cotinga, Munchique Wood-Wren och Tanager Finch.

Río Blanco

Detta reservat ägs av staden Manizales vattenbolag och skyddar det avrinningsområde på västslutningen av centrala Anderna som Manizales tar sitt vatten ifrån. Höjden över havet är 1 600–3 500, men vi rörde oss mest kring 2 500 m. Utmärkt skog med massor av trevliga fåglar, vi fick in Brown-banded och Bicolored Antpittas samt Masked Saltator.

Nevado del Ruiz

Vi åkte en bit längs med vägen till nationalparken Nevado del Ruiz, som skyddar naturen kring en av de högsta vulkanerna i Cordillera Central. Biotoperna är elfin forest, degraderad páramo samt en mindre sjö. Vädret var ovanligt fint med växlande molnighet, vi vände på ca 3 900 meters höjd och såg främst mängder med kolibrier inklusive Bearded Helmetcrest, Black-thighed Puffleg och Rainbow-bearded Thornbill. Även bra för Rufous-fronted Parakeet (dipp).

Minca

Kaffeplantager och skogsrester på Santa Martas nordsluttning kring 500 meter. En nyhet under denna resa var att bo på Hotel Minca som drivs av ProAves och har bra hummingbird feeders. Bland våra bästa fynd kan nämnas Military Macaw (34 ex.!), Lazuline Sabrewing, Scaled Piculet, Black-backed Antshrike, Northern Royal-Flycatcher och Black-whiskered Vireo. En hona Santa Marta Sabrewing som varit stationär en tid kunde inte hittas.


Reserva Natural El Dorado, Santa Marta

Detta ProAves-reservat ligger på nordslutningen av utlöparen Cuchilla San Lorenzo som är separerad från Santa Martas huvudmassiv av en bred dalgång. Lodgen är belägen på 1 950 meters höjd med fantastisk utsikt mot Karibiska havet! Reservatet, som spänner mellan 1 000–2 700 meter, hyser i princip alla av Santa Martas 20+ endemer utom Santa Marta Wren; Santa Marta Sabrewing är dock mycket sällsynt och Black-backed Thornbill ytterst oregelbunden. Vi hade den stora turen att hitta sistnämnda art och nästan alla andra endemer! Ytterligare arter med särskild splittvarning är Masked Trogon (*sanctaemartae*), Montane Woodcreeper (*sanctaemartae*), Rufous Antpitta (*spatiator*) och Gray-breasted Wood-Wren (*anachoreta*). Bland övriga specialare bör nämnas Black-fronted Wood-Quail, Coppery Emerald, Blossomcrown, Tyrian Metaltail (*districta*), White-tipped Quetzal, Streak-capped Spinetail och Rusty-breasted Antpitta.

Parque Nacional Los Flamencos

Los Flamencos har nyligen blivit uppgraderad till nationalpark och skyddar en stor lagun med omgivande mangrove. Tidvis finns här tusentals flamingos, men vi lyckades bara se en ensam fågel. Vi fick desto bättre obsar på många vadare, tärnor och hägrar och kunde notera tre tunga Colombiarariteter: Lesser Black-backed Gull, Forster's Tern och Marbled Godwit! I buskskogen jobbade vi in de flesta av specialarna, inklusive Buffy Hummingbird, Chestnut Piculet, Russet-throated Puffbird, White-whiskered Spinetail, Glaucous Tanager, Orinocan Saltator och Vermilion Cardinal. Tyvärr missade vi den gäckande Toco Sparrow.

Karta över resrutten av Erling Jirle



Endemer

Colombia har ungefär 80 endemiska fågelarter varav många är knutna till den centrala delen av landet eller Santa Marta. Vi hade chans att se drygt 60 av dessa och missade bara fem arter: Rufous-fronted Parakeet, Santa Marta Sabrewing (sällsynt), Grayish Piculet, Beautiful Woodpecker och Colombian Mountain-Grackle. Med tanke på att många av Colombias endemer är hotade, fåtaliga och mycket lokalt förekommande är resultatet imponerande. Dessutom sågs ett stort antal arter näraendemer! Här har vi den kompletta listan:

Chestnut-winged Chachalaca
Chestnut Wood-Quail NT
Gorgeted Wood-Quail EN
Bogotá Rail EN
Flame-winged Parakeet VU
Santa Marta Parakeet EN
Santa Marta Screech-Owl (obeskriven)
Indigo-capped Hummingbird
Chestnut-bellied Hummingbird EN
Blossomcrown VU
Black-backed Thornbill EN
Black Inca EN
Dusky Starfrontlet CR
White-tailed Starfrontlet
Santa Marta Woodstar
White-mantled Barbet EN
Santa Marta Toucanet*
Silvery-throated Spinetail
Rusty-headed Spinetail VU
Santa Marta Foliage-gleaner NT
Parker's Antbird
Brown-banded Antpitta EN
Urrao Antpitta CR
Santa Marta Antpitta VU
Santa Marta Rufous Antpitta*
Matorral Tapaculo
Brown-rumped Tapaculo
Stiles's Tapaculo
Alto Pisones Tapaculo (obeskriven)

Upper Magdalena Tapaculo EN
Paramillo Tapaculo EN
Santa Marta Tapaculo
Chestnut-capped Piha EN
Santa Marta Bush-Tyrant EN
Apical Flycatcher
Niceforo's Wren CR
Apolinar's Wren EN
Munchique Wood-Wren CR
Yellow-crowned Whitestart
Santa Marta Warbler VU
White-lored Warbler NT
Turquoise Dacnis VU
Multicolored Tanager VU
Black-and-gold Tanager VU
Gold-ringed Tanager EN
Santa Marta Mountain-Tanager
Flame-rumped Tanager*
Chestnut-bellied Flowerpiercer EN
Santa Marta Brush-Finch
Colombian Brush-Finch
Sooty Ant-Tanager NT
Crested Ant-Tanager
Red-bellied Grackle EN

* Taxonomisk status oklar

NT = near-threatened EN = Endangered
VU = Vulnerable CR = Critically Endangered



En av Colombias många hotade endemer: Apolinar's Wren vid Laguna de Fúquene.

Dagbok

Tisdag 22/2

Denna avresedag "började" för undertecknad med ett försenat kvällståg till Stockholm som anlände till centralen 01.00. En halvtimme senare gick jag till sängs för att stiga upp 06.05 och medelst flygbuss transportera mig till Arlanda. Håkan fanns på plats och vädret var utmärkt, vilket kändes bra, men ändå blev vi 45 minuter försenade. Atlantflygningen bjöd på glimtar av Island och Grönland och eftersom motvinden vår måttlig landade vi i **Newark** strax innan utsatt tid. Med andra ord behövde vi inte jäkta det minsta! Henry anslöt från Köpenhamn och tillsammans åt vi lunch på Sarku Japan (pratandes fåglar, förstås) innan det var dags att gå på planet till Bogota. Reseledaren fick än en gång åtnjuta uppgradering till business class, vilket var högst välkommet! Efter en god middag slumrades det rentav en timme eller två. Vi landade i **Bogotá** redan vid 20.40-tiden, men den tid vi tjänat in försvann snart i en osedvanligt lång passkontrollskö. Klockan tio tog vi slutligen en taxi till Hotel Emporium dit de övriga i gruppen hade anlänt en trekvart tidigare. Snart väntade sängen, men inte ens en sömntablett kunde försänka undertecknad i önskat tillstånd ...



Masked Flowerpiercer och Black-headed Hemispingus. Foton: Joakim J.

främsta målarten, Flame-winged Parakeet, var snart säkrad! Förutom fina obsar på denna endem kunde vi också notera arter som Broad-winged Hawk, Coppery-bellied och Glowing Pufflegs, Longuemare's Sunangel, Black-billed Mountain-Toucan, Strong-billed Woodcreeper, Rufous Antpitta (hörd), Barred Fruiteater, Black-collared Jay, Golden-fronted Whitestart, Black-crested och Blackburnian Warblers, Rufous-browed Conebill samt Scarlet-bellied och Hooded Mountain-Tanagers. Vi hoppade sedermera in i bilarna och fortsatte ytterligare en bit upp till subparamon inne i Chingaza NP där vi vandrade utmed en väg i närmare en och en halv timme. Här bjöds det på goda vyer och fåglar i form av White-browed Spinetail och en framspelad Matorral Tapaculo. Innan vi lämnade Mundo Nuevo hade vi också hängt in Black-headed Hemispingus och Slaty Brush-Finch i en fin blandflock. I byn åt vi en snabblunch bestående av chips, kex, läsk och andra onyttigheter, innan vi for vidare mot Bogotá. Efter ett fotostopp med vyer över halva mångmiljonstaden korsade vi densamma för att slutligen hamna vid **Parque La Florida** nära flygplatsen. Här hade man inhägnat det mesta ordentligt sedan året innan, men vi kröp under ett taggtrådsstängsel för att kunna locka fram Silvery-throated Spinetail och fortsatte sedan till kanten av en större våtmark där vi fick höra såväl Bogotá Rail som Apolinar's Wren

Onsdag 23/2

En förvånansvärt innehållsrik frukost serverades 04.30 och en knapp halvtimme senare installerade vi oss i två jeepar. Våra chaufförer Jeovani och Hernan körde oss snart genom ett uppvaknande Bogotá för att sedan på grusvägar fortsätta högre upp i Anderna mot målet **Mundo Nuevo**. Väl framme väntade en god överraskning i form av en reparerad väg, så vi kunde lätt ta oss upp till lämplig höjd med bilarna och börja skådningen en liten bit nedanför den sammanhängande skogen. Den





Vy över en liten del av norra Bogotá.

samt se White-tailed Kite, American Coot, Common Gallinule och Yellow-hooded Blackbird. Vid halv sex lämnade vi lokalen och någon timme senare var vi tillbaka på Hotel Emporium där middag och listgenomgång väntade. En god start på resan!

Torsdag 24/2

Även dag två började med frukost 04.30, om än en något torftig sådan. Utanför hotellet fanns vår huvudchaufför Jorge på plats med en rymlig minibuss, och snart packade vi in väskorna för att genast styra kosan mot **Laguna de Fúquene** ett par timmars färd norrut. Väl ute ur Bogota passerade vi jordbruks- och betesmarker och en och annan småstad innan vi nådde fram till sjön som till största delen bestod av cattail med några större öppna vattenytor. Vi gick utmed en grusväg nära stranden och hängde tämligen omgående in tre Apolinar's Wrens som kunde studeras alldeles utmärkt. Den fortsatta promenaden gav en hel del trevligheter inklusive våtmarksfåglar som Pied-billed Grebe, Cocoi Heron, Black-crowned Night-Heron, Least Bittern, Blue-winged Teal och Spot-flanked Gallinule samt trädgårdsfåglar som White-bellied Woodstar, Smoky-brown Woodpecker, Black-backed Grosbeak, Yellow-backed Oriole och Golden-rumped Euphonia. Ett sista försök på Bogotá Rail tog oss till en båtplats med två landtungor och ett stort dinosaurieliknande sjöodjur (ny på däggdjurslistan, enligt en icke namngiven deltagare). Här hittade vi en oväntad Sora och två Noble Snipes, vilket var en god ersättning till rallen som vi ju åtminstone hade hört kvällen innan! Vi hoppade in i bussen vid 09.30 för fortsatt färd norrut genom Cordillera Oriental, stannade för lite fika och fick även bevittna världens tjejslagsmål vid vägreken. Kombattanterna brydde sig inte ett skvatt om Jorges tutningar, och hur tvisten avlöpte lär vi aldrig få veta! Så småningom var det dags för lunch som intogs på en trevlig restaurang med blommande Mountain Immortellas där Indigo-capped Hummingbird, Red-crowned Woodpecker och Summer Tanager tillhörde matgästerna. Slutligen anlände vi till **San Gil** vid 16-tiden och begav oss genast till **Parque Gallineral** för att göra ett försök på den kritiskt utrotningshotade Nicéforo's Wren. Med inträdesbiljetter i form av ljusgröna armband gick vi raskt genom parken för att nå den stig strax utanför själva anläggningen som hyser denna eftertraktade endem. Trots ett flertal playbackförsök gavs inget livstecken från smygen, men vi såg många andra arter istället såsom Spectacled Parrotlet, Whooping Motmot, Plain Antvireo, Acadian och Streaked Flycatchers, Gray-cheeked Thrush (korrekt bestämd i efterhand utifrån foton), Northern Waterthrush, Dark-faced



Grassquit och Scrub Tanager. Klockan 17.30 var vi tvungna att lämna parken, istället fick vi tillfälle att göra lite sightseeing i den backiga staden, ta ut pengar och slutligen checka in på Hotel Bella Isla med fin utsikt över San Gil. Middagen innehöll bland annat yucca, något som särskilt föll Erling i smaken. Ola föreslog att det hela skulle utvecklas till en affärsidé genom öppnandet av "Valentins yuccabar" i Lund. Vi får väl se om denna vision någon gång blir verklighet!



Gray-cheeked Thrush and Whooping Motmot (SH) samt Niceforo's Wren (Joakim Johansson).

Fredag 25/2

Denna dag började med skådning i hotellets omgivning 06.00, och det blev en riktig rivstart med fina obsar av Colombian Chachalaca, Black-throated Mango, Bar-crested Antshrike, Bicolored Wren och Golden-winged Sparrow. I

den fortsatta jakten på Nicéforo's Wren kom vi slutligen in på stigen bakom Parque Gallineral utan att behöva passera entrén som öppnade först klockan åtta. Knappt 100 meter in på stigen hördes plötsligt den mjuka drillen från en Nicéforo's Wren. Den svarade omedelbart på playback, och snart fick vi kanonobsar på ett par som också lät sig fotograferas av dem som behagat släpa med sig kameran. Yes! Innan frukosten hann vi också se Olivaceous Piculet, Spot-breasted Woodpecker, White-fringed Antwren, Orange-billed Nightingale-Thrush, Chestnut-capped Warbler och Crimson-backed Tanager. Vid hotellet väntade två jeepar och chaufförerna Luis och Alonso; vägen till San Vicente de Chucuri var i alldeles för dåligt skick och Jorge skulle möta upp med bussen först om fyra dagar. Vi kom iväg prick nio och tog den snabbare 8-timmarsvägen istället för den normala 10-timmarsvägen. Vad detta innebar skulle vi bli varse om så småningom! Först korsade vi en djup, torrare dalgång, vilket tog bortåt fyra timmar. Vi fikade i den prydliga byn Galán och adderade bland annat Black-chested Buzzard-Eagle, Solitary Sandpiper och Pearly-vented Tody-Tyrant till fågellistan. Lunchen intogs i **Zapoteca** på en fin restaurang med innegård och museum. Resten av resan karaktäriserades av att vägen gradvis blev sämre, kraftiga regn och jordskred hade nämligen gjort många partier till en enda skumpig lervälling. Vi gjorde några skådarstopp som gav White-tipped Swift, Rufous-and-white Wren (hörd), Yellow-legged Thrush och flera arter skogssångare, men ju kortare tid vi behövde köra i mörker desto bättre. När vi äntligen kom fram till lodgen vid **Reinita Cielo Azul** var vi rejält fysiskt omskakade! Den påföljande middagen satt dock gott i kistan, och vi kom faktiskt i säng i hyfsad tid.



Lördag 26/2

Resans första riktiga träningspass startade 05.30 och innebar en promenad med hyfsad stigning upp till skogen vid El Talisman; med oss hade vi den unge hjälpguiden Hubert. Efter en trekvarter marsch var vi framme vid skogsbrynet, och bara en liten bit in i skogen fanns hummingbird feeders och en matningsplats för Gorgeted Wood-Quail. Det dröjde inte länge förrän en första Black Inca visade sig, och med hjälp av playback lockades en Wood-Quail fram som rentav skymtades av Joakim. Andra hummare inkluderade Purple-crowned Woodnymph, Green-crowned Brilliant, Andean Emerald och Speckled Hummingbird. Tillbaka på huvudstigen var det rätt så tyst till en början, men snart hade vi skrapat ihop en riktigt fin lista med arter som Black Hawk-Eagle, Green-fronted Lancebill, Parker's Antbird, Uniform Antshrike, White-bellied Antpitta (hörd), White-crowned och Magdalena Tapaculos (båda sedda fint!), Yellow-throated Spadebill (yes!!), Rufous-naped Greenlet,

Cerulean, Blackburnian och Black-and-white Warblers, Metallic-green Tanager och Blue-winged Mountain-Tanager. Vid El Talisman hade vi fin utsikt en kort stund innan bergsryggen till och från sveptes in i moln. Det spelades efter Colombian Mountain-Grackle flera gånger utan resultat, sedan blev det lunch vid 12.30 då en kille kom med med matlådor vars innehåll ännu inte kallnat. Suveränt! Vi fick nu gott om energi att påbörja nedfärden. Huvudaktiviteten blev en andra station med feeders som besöktes av samma arter som under morgonen plus Booted Racket-tail men med bättre fotomöjligheter. Sedan skulle vi göra ett försök på den sällsynta Recurve-billed Bushbird. Samtidigt som en White-mantled Barbet sjöng i slutningen högt ovanför positionerade vi oss strategiskt i skogskanten för ett playbackförsök, och det dröjde inte länge förrän vi fick svar! Fågeln satt dock alldeles för långt in och verkade inte vilja närma sig, så vi fick nöja oss med att höra denna verkliga raritet. De sista två timmarna med dagsljus ägnades åt skådning från verandan och fotografering, med arter som Indigo-capped Hummingbird, Bicolored Wren, Crimson-backed och Summer Tanagers, Yellow-tailed Oriole och Giant Cowbird. En mycket lyckad dag trots den missade bergsgrackeln!



Black Inca och Crimson-backed Tanager.

Söndag 27/2

Eftersom vi fick in nästan alla rimliga målarter på högre höjd igår satsade vi idag på kaffe- och kakaoplantagerna på lägre höjd med god chans på den sällsynta Chestnut-bellied Hummingbird. Men först skulle vi försöka se Turquoise Dacnis i trädgården. Det blev lodgens manager som ropade ut den lilla vackra blå fågeln först, och slutligen lokaliserade vi tre individer i samma träd. En fin start! Hubert ledsagade oss sedan till ett par feeders i en kaffeplantage där en Chestnut-bellied Hummingbird hade setts regelbundet på sistone. När det inte skådades fågel aktivt behandlades en blandning av diet- och taxonomirelaterade spörsmål. Hummaren satt som en smäck, och i övrigt sågs lite allt möjligt



En av många vackra Blackburnian Warblers vid Reinita.

såsom Striped Cuckoo, Slaty Spinetail, Yellow-throated Vireo, Cerulean Warbler och Yellow-throated Brush-Finch. Vi åt en tidig lunch vid 11.30 och skulle åka iväg en timme senare, men på grund av strul med en av bilarna blev det en halvtimmes försening och en ny chaufför som utseendemässigt påminde en hel del om Elvis Presley. Färden till Nästa ProAves-reservat **Pauxi pauxi** tog bortåt två timmar och blev åter en skumpig historia. En Yellow-tufted Dacnis och några Ruddy-breasted Seedeaters sågs utmed vägen, annars körde vi i princip

nonstop fram till reservatet. Vi var den andra gruppen någonsin som sov över vid Pauxi och efter att ha hälsats välkomna av skogvaktaren Douglas med fru installerades vi i två rum och två singeltält under tak. Enkla förhållanden alltså, men helt OK! Eftermiddagens aktivitet bestod i en vandring uppför en delvis ganska brant sluttning till en övernattningsplats för Saffron-headed Parrot. Douglas och de raskare i gruppen pinnade på rätt så bra medan vi andra tog det lite lugnare. Biotopen var huvudsakligen fågelfattig betesmark. De som gick först fick se en flock med Saffron-headed Parrots på håll, utpekade av Douglas, men när hela gruppen äntligen var framme vid övernattningsträdet började det att regna. Vi sökte skydd i ett öppet skjul vilket var synnerligen tursamt, för snart vräkte det ner! Några fler papegojor blev det inte denna kväll, men turen i oturen fortsatte i och med att det slutade regna lagom till att vi var tvungna att återvända. Det blev en klafsigt nedfärd utan stövlar, och när vi på slutet skulle passera en bäck hade vattnet stigit markant. Några valde klokt nog att vada över bäcken för att inte ta onödiga risker. Dusch och middag var inte fel efter denna utflykt; så förflöt kvällen vår första dag i Pauxi pauxi!



White-necked Jacobin och kakao, Pauxi pauxi.

Måndag 28/2

Vi vaknade till en morgon med fint väder och begav oss efter frukosten upp på den skogsklädda sluttningen ovanför lodgen. Innan vi kom in i själva skogen noterades arter som Dusky Antbird, Bay-breasted Warbler och Black-striped Sparrow, sedan dröjde det inte länge innan vi oväntat enkelt fick se vår första Sooty Ant-Tanager respektive Magdalena Antbird. Det var annars ganska tyst i skogen tills vi nådde högre höjder även om det droppade in ett och annat med jämna mellanrum. White-mantled Barbet var den tyngsta arten, nämns bör även Wattled Guan (hörd), Marbled Wood-Quail (hörd), Citron-throated Toucan, Southern Bentbill, Ochre-bellied Flycatcher, Bright-rumped Attila (hörd), Striped Manakin, Buff-rumped Warbler och en stor "helikopterslända" som särskilt exalterade



Golden-faced Tyrannulet vid Pauxi. Foto: Joakim Johansson.

ämnesexperterna Erling och Ola. I skogsbrynet på nervägen sjöng både Sooty-headed (sedd) och Black-bellied Wrens. Under lunchen spanade vi på hummarna i trädgården där White-necked Jacobin och Brown Violetear dominerade och övriga arter innefattade bland andra Pale-bellied och Hairy Hermits, Black-throated Mango, White-vented Plumeleeter och Long-billed Starthroat. Hotande moln och viss trötthet gjorde att vi på eftermiddagen skippade ett nytt försök på Saffron-headed Parrot och istället vandrade en bit utmed vägen. Tyvärr lyckades vi inte hitta den

önskade Beautiful Woodpecker utan fick nöja oss med Lineated dito samt Rufous-browed Peppershrike, ett flertal Bay-breasted Warblers, Yellow-tufted Dacnis och Plain-colored Tanager m.fl. På kvällen spelade reseledaren och Douglas son "Angry birds", sedan gick strömmen för resten av kvällen så att vi fick göra listan i skenet av stearinljus. Det blev med andra ord tidigt sänggående.

Tisdag 1/3

Trots allehanda störande moment under natten såsom en hel del regn, en skällande hund (?) och skrällandet av glas och flaskor mot ett glasbord klockan 03.05, sov åtminstone reseledaren riktigt hyfsat. Regnet fortsatte gryningen igenom men förminskades efterhand i styrka. Efter att vi hade ätit frukost inväntades lämpligt tillfälle att ta en promenad och göra ett sista försök på Beautiful Woodpecker. Det blev slutligen en kortare session i lätt regn som gav en del reprisar och White-breasted Wood-Wren men dessvärre ingen *pulcher*. När regnet åter tilltog var det bara att traska

tillbaka och göra oss redo för avfärd då "Elvis" och en ny chaufför var på plats i god tid. Klockan 07.26 tackade vi definitivt för oss och skumpade iväg ner mot **Magdalenadalen**. Som tur var kändes färden betydligt bekvämare än i förgår, trots samma usla väg till en början. Bilarna saknade oftast visuell kontakt, varför vi kom att stanna på lite olika ställen som såg giftiga ut. Tillsammans skrapade vi ihop en fin lista toppad av en Northern Screamer som stod snällt nära vägen, bland övriga arter kan nämnas Little Blue Heron, Fulvous Whistling-Duck, Savanna Hawk, Laughing Falcon, Purple Gallinule, Wattled Jacana, Solitary Sandpiper, Pale-vented Pigeon, Shining-green Hummingbird, Yellow-chinned Spinetail, White-headed Marsh-Tyrant, Fork-tailed Flycatcher, Cinereous Becard, drösvis med Bicolored Wrens, Black-chested Jay, Red-breasted Blackbird samt glasögonkajman. Bytet från jeepar till buss var högst välkommet, Jorge väntade vid en bensinmack där vi också kunde notera White-winged Swallow, Sand Martin och Yellow-rumped Cacique. Återstod gjorde nu en lång transport genom Medio Magdalena och uppför Cordillera Central till nästa ProAves-reservat. En del fåglar sågs utmed vägen, däribland Capped och Cocoi Herons, Whispering Ibis och Yellow-billed Tern, lunch intogs vid Puerto Araujo och dollars växlades till pesos i **Puerto Berrío** vid den mäktiga Magdalenafloden. Jorge körde på ordentligt, lite för bra ett tag så att reseledaren fick be honom att sänka hastigheten. Annars förflöt



En helt obekymrad Northern Screamer!



Tjusiga nattflyn vid Arrierito.

resan väl och slutligen anlände vi till **Arrierito Antioqueno** prick 19.00. Nisse mådde tyvärr dåligt och gick nästan genast till sängs, även flera andra i gruppen hade känningar i magtrakten och/eller feber. Det blev därför en del halväten mat och manfall vid listgenomgången. De som var vid god vigör kunde avsluta dagen med att fotografera en uppsjö av häftiga nattfjärilar och andra kryp på lodgens upplysta, vita väggar. Det var bara att hålla tummarna för att alla skulle vara fit for fight nästa morgon.

Onsdag 2/3

Den ende som klarade sig från magbesvär under natten var Henry, men det var olika hur vi andra hade drabbats. Några hade kräkts halva natten medan andra fått kraftig diarré. Hur som helst var det en något medtagen skara som slöt upp till frukost, och det äts inte allt för mycket. Håkan valde att stanna hemma och vila upp sig efter nattens pärs medan övriga klampade upp på stigarna i den närliggande, vackra molnskogen. Aktiviteten i skogen denna morgon var högst beskedlig, men i slutändan hade vi ändå skrapat ihop en hel del godbitar. De två främsta målarterna Chestnut-capped Piha och Multicolored Tanager satt extra gott, andra arter särskilt värda att nämnas var Chestnut Wood-Quail (hörd), Greenish Puffleg, Red-headed Barbet och Moustached Puffbird (hörda), Streak-capped Treehunter, Uniform Antshrike, Slaty Antwren, Parker's Antbird, Ochre-breasted Antpitta (kanonobs!), White-crowned Tapaculo, Rufous-browed Tyrannulet, White-throated Spadebill, Purplish-mantled (Ola) och Silver-throated Tanagers samt Andean Squirrel. Tillbaka vid lodgen var vi allmänt sega, men vila och/eller mat gjorde susen. Det regnade siestan igenom och fortsatte när det var dags för en eftermiddagspromenad utmed landsvägen. De dåliga förutsättningarna gjorde att vi såg få fåglar och att vi sedermera tog bussen tillbaka till lodgen. Behållningen blev hörda Russet-crowned Crakes och Blackish Rails samt ett ex. vardera av Andean Motmot och Yellow-throated Brush-Finch. Den sista timmen spanade vi i trädgården. Mängder av kolibrier trängdes vid ett antal feeders med stark dominans av Andean Emerald, Steely-vented Hummingbird, Green-crowned Woodnymph och Green-crowned Brilliant samt smärre antal av flera andra arter. På utlagda bananer sågs både Black-faced Tanager och Black-winged Saltator. Lagom till middagen var både dimma och regn borta och magarna i betydligt bättre trim, vilket höjde förväntningarna inför morgondagen!

Torsdag 3/3

Vi vaknade upp till en grå men regnfri morgon och gick efter frukosten iväg utmed vägen i jakt på Red-bellied Grackle, Stiles's Tapaculo och Purplish-mantled Tanager. Det började bra med en sjungande Tapaculo bara ett par hundra meter från lodgen, men sedan var det segare. Wattled Guan hördes och vi såg Inca Jay, Collared Trogon, Yellow-throated Brush-Finch och ett antal olika tangaror innan det var dags att testa en skogsstig för ett försök på grackeln. Reseledarens minne svek dessvärre,

så vi fick vända två gånger på två olika stigar varav den ena åtminstone delvis var rätt. Tur var kanske det, för på tillbakavägen hittade Ola faktiskt två Red-bellied Grackles som vi fick se hyfsat men kortvarigt! Andra noterbara arter utmed vägen var Swallow-tailed Kite, Colombian Chachalaca, Golden-crowned och Pale-edged Flycatchers, White-thighed Swallow och en hyfsat utfärgad Bay-breasted Warbler. Innan lunch hann vi också med en sväng in i skogen. Här var det väldigt tyst till en början, men på tillbakavägen dök det upp trevligheter som Red-faced Spinetail, Plain Xenops, Olive-backed Woodcreeper, Scarlet-and-white och White-winged Tanagers samt Blue-winged Mountain-Tanager. Vi fick en utmärkt avslutningslunch och kom iväg mot Medellín vid 13.30-tiden. Det regnade en del utmed vägen och under den drygt fyra timmar långa färden gjorde vi bara ett skådarstopp som gav arter som Whispering Ibis, Wattled Jacana, Bronze-winged Parrot och Red-breasted Blackbird; i övrigt sågs även Gray-necked Wood-Rail och Green Kingfisher. Väl framme i **Medellín** irrade vi runt en aning (GPS:en funkade inte) och fick slutligen ta till taxi-eskorts-tricket för att komma fram till det fräscha Hotel San Joaquin. Här kunde vi kolla nyheter och annat på internet, koka en utdragen middag, klara av artlistan och ladda upp inför nästa äventyr – Colibri del Sol!



Fredag 4/3

Idag fick vi något så ovanligt som "sovmorgon" med frukost från 06.00 och inpackning i bussen 06.50. Strax innan sju rullade vi iväg genom metropolen Medellín och fortsatte ner mot Cauca dalen; Flame-rumped Tanager och en överflygande Acorn Woodpecker blev nytillskott till reselistan. Cordillera Occidentals branta sluttningar var översållade med kaffebuskar och det var först i den mysiga

staden **Concordia** som vi gjorde ett stopp. Här dracks det kaffe, njöts av atmosfären och fotograferades vid torget; Nisse hittade rentav en Aplomado Falcon som kretsade ovanför oss! På grund av stora vägarbeten skulle vägen framför oss officiellt vara avstängd fram till klockan ett, men som tur var hade vi inga problem att ta oss igenom. Vi anlände därför som planerat till **Urreo** lagom till lunch och gick genast för att äta på en av reseledaren tidigare känd



Heliangelus goes cultural: Concordia, Antioquia!

restaurang. Sedan var det dags för den sista bilburna etappen mot **Colibri del Sol**, 45 minuter uppför en halvtaskig grusväg. Vid vägs ände tömde vi bilen, packade de saker vi behövde för två dygn framåt i en mindre väska och lämnade övrigt bagage för förvaring hos en lokal familj; Jorge skulle plocka



På väg upp till Colibri del Sol.

upp oss igen först om några dagar. El Guardabosque, Luis, hade snart tre hästar färdiga, men vi gick i förväg på den sex kilometer långa vandringen upp till den enkla lodgen. Promenaden bjöd på soligt väder, vackra vyer och en del fåglar, häribland White-tailed Hawk, White-capped Dipper och Slaty-backed Chat-Tyrant. När vi äntligen kom fram bjöd Luis fru Flor på mango- och björnbärsjuice, och det myllrade av kolibrier kring feeders på verandan. Tourmaline Sunangel, Collared Inca, Mountain Velvetbreast och Long-tailed Sylph tillhörde nykomlingarna, imponerande var också hela 15-20 White-bellied Woodstars! Annars hände inte så mycket innan skymningen. Vi duschade av oss med varmvatten i en hink och pälsade sedan på oss inför middagen – vi hade en rätt så kylig natt framför oss, men med långkalsonger och fyra filtår fick man snart upp värmen. Spännande att vara här (igen)!

Lördag 5/3

Resans utmaning var utlovad denna dag men det fanns också flera blytung Colombiaendemer att vänta sig i belöning. Vädret var som tur var utmärkt! Efter frukosten var det dags för utfodring av Colombias senast beskrivna art (x 2), Urrao/Fenwick's Antpitta, med en nyinventerad världspopulation på 33 par. Det var bara att bänka sig under en plastpresenning och vänta! Efter att ha lagt ut maskar på marken under ett litet tak av svart plast vislade Luis några gånger, och snart hoppade en antpitta fram sju meter framför oss. Den visade upp sig utmärkt och fick efter en stund sällskap av ytterligare en hungrig individ samt två Stripe-headed Brush-Finches. Excellence! Efter denna succé var det så dags för vandringen upp till páramon. Den första etappen var huvudsakligen en dryg transportsträcka, men vi fick in en del fåglar i form av t.ex. Tawny-breasted



Heliangelus exortis – vilken fågel!



Urrao Antpitta, subpáramo, Luis och en hona Dusky Starfrontlet.

Tinamou (hörd), Chestnut-naped Antpitta och Spillmann's Tapaculo (hörda), Golden-fronted Whitestart, Blue-capped Tanager och Slaty Brush-Finch. Etapp två tog oss in i skogen på en brant trappa och där inne kom vi slutligen fram till en station med feeders. Dagens andra superendem Dusky Starfrontlet sågs tämligen omgående, totalt kunde fem fåglar inräknas varav två suveräna hanar! Sword-billed Hummingbirds fascinerade med sina fantastiska näbbar och det sågs även Glowing Puffleg och Collared Inca. Skogen var annars ovanligt tyst. Henry fick kämpa för att ta sig så här långt, och nu sade tyvärr knäna stopp för vidare vandring uppåt. Vi andra fortsatte till ett parti med vacker, frailejónbeströdd paramo och anslutande elfinskog där vi kunde notera ytterligare Dusky Starfrontlets, de mycket viktiga endemerna Chestnut-bellied Flowerpiercer och Paramillo Tapaculo (hörd) samt Barred Parakeet, Rusty-faced Parrot (hörd), Viridian Metaltail, Purple-backed Thornbill, Black-headed Hemispingus och Black-throated Flowerpiercer. Luis knallade ner vid 11-tiden för att hämta lunchen, och prick halv ett kom han tillbaka. Otroligt, alltså! Vi intog maten vid sockervattenautomaterna och var glada för regnskyddet när det plötsligt kom en skur. Skogen förblev tyst, och vid 14.30-tiden påbörjades nedstigningen. Innan vi något stumma i benen var tillbaka vid huset hade vi plussat på artlistan med bland andra Paramo Seedeater och Lacrimose Mountain-Tanager, sedan var det hummingbirding och/eller vila som gällde; molnen trängde nämligen snart ner genom dalen och begränsade sikten avsevärt. Efter en ovanligt tidig middag och artgenomgång var de första redo att gå till sängs, Samuel och Nisse satt och pratade till åtta och den förre höll sig sedan sysselsatt till åtminstone halv tio, författandes bitar av denna reserapportsdagbok. Natten var tillräckligt lång ändå ...

Söndag 6/3

De första morgontimmarna denna Vasaloppssöndag skådade vi i närheten av huset. Aktiviteten var måttlig, men vi hade ett par flockar som drog förbi innehållande bland andra Montane Woodcreeper, Pearled Treerunner, Citrine och Russet-crowned Warblers, Capped Conebill och Gray-hooded Bush-Tanager; det gavs också goda obsar av Black-billed Mountain-Toucan. Vid 9-tiden påbörjade vi vandringen tillbaka mot civilisationen. Fågelmässigt var det ganska händelsefattigt, men det var bekvämare att gå nerför än uppför. Vi kom fram i lagom tid för att omorganisera packningen och äta fältlunch innan vi tackade Luis och fortsatte i två jeepar till **Urrao** och sedan vidare mot **El Carmen** på västslutningen av Cordillera Occidental. Till en början följde vi en floddal för att så småningom klättra upp mot allt finare tempererade molnskogar men allt sämre vägar. En bit innan krönet började det att regna ihållande, något som kom att försvåra våra chanser att hitta de eftertraktade Munchique Wood-Wren och Tanager-Finch som skulle finnas här i förhållandevis goda antal. Regnet upphörde sedermera varpå gärdsmynen kunde lockas fram i sista stund (svårsedd) medan Tanager-Finchen som vanligt lyste med sin totala frånvaro. Några fina flockar innehöll dessutom Green-and-black Fruiteater, Black-throated Tody-Tyrant, Purplish-mantled och Grass-green Tanagers samt Brown-capped Vireo. Vi anlände till den nyöppnade lodgen vid **Las Tangaras** strax efter mörkrets inbrott och blev snart serverade lunch utomhus under ett tak av flätade palmbblad. Skogvaktaren Uberné visade sig vara en trevlig, duktig och hjälpsam kille som hade mycket positiva nyheter om morgondagens målarter. Det här kändes riktigt bra!



Empress Brilliant, Las Tangaras.

Måndag 7/3

Klockan fem åt vi frukost och sedan körde vi upp till reservatet en halvtimmes jeepfärd bort. Vädret verkade mycket fördelaktigt! Knappt ute ur bilarna hittades en första Black-and-gold Tanager, upptakten till en grymt fin skådarmorgon. Innan vi kommit in i själva skogen hade vi fått fina obsar på sådana godbitar som Toucan och Red-headed Barbets, White-headed Wren, Grass-green, Purplish-mantled och Rufous-throated Tanagers, Indigo Flowerpiercer och Black-chinned Mountain-Tanager samt hört Chestnut Wood-Quail och den obeskrivna Alto Pisones Tapaculo! I skogen fortsatte flytet med den verkliga tungliraren Chocó Vireo och arter som Olivaceous Piha, Sepia-brown Wren och Dusky Bush-Tanager. Vi passerade ett vackert vattenfall och en enorm rasbrant, fortsatte uppför ett brant parti och hamnade slutligen på ett bergskrön med vackra vyer över mestadels obruten molnskog. Här dröjde det inte länge förrän Joakim hittade en vacker hane av Gold-ringed Tanager, dagens andra rara *Bangsia*! Innan vi

återvände samma väg sågs några Double-toothed Kites och längs stigen kunde vi sedan addera Yellow-breasted Antpitta, Alto Pisones Tapaculo, Uniform Treehunter, Star-chested Treerunner och Crested Ant-Tanager (NK och JJ). Detta var sannerligen högkvalitativ skådning! Även ett stort gäng färgglada gräshoppor upptäcktes innan vi var tillbaka vid jeeparerna och satte oss på en träbänk i väntan på Uberné och lunchen. Till vår stora förvåning anlände han snart med Jorge och bussen som skulle ha väntat på oss ytterligare ett dygn i Ciudad Bolivar! Viss förvirring rådde, men vi kom överens om att använda bussen resten av dagen och ta jeeparerna igen nästa morgon. Nästa punkt på programmet var att besöka relativt nyuppsatta hummingbird feeders några kilometer uppåt vägen. Antalet individer var få, men även här var det kvalitet som gällde med riktiga juveler som Empress Brilliant, Velvet-purple Coronet och Violet-tailed Sylph! Eftermiddagen blev annars en molnig och lite regnig historia med



Neglected 88, orkidé och Masked Trogon.

winged Manakin och Black-and-gold Tanager innan vi tog jeeparna upp och gick in på gårdagens trail. Vi behövde bara komma in i skogen för att det skulle börja hända saker! Nya arter blev exempelvis Western Slaty-Antshrike, Rufous-rumped Antwren och en kvick Orange-breasted Fruiteater, det hördes även en Beautiful Jay på håll. Vi var tillbaka vid lodgen vid 11.30-tiden och påbörjade färden mot dagens slutdestination Jardin en stund senare. Den dalgång vi körde ner igenom på



flesta åt gemensam middag medan reseledaren föredrog att fixa lite grejer på egen hand. Det lätta regn som börjat redan vid vår ankomst ökade under natten i styrka, och periodvis smattrade det rejält på takpannorna. Man kunde bara hoppas att det skulle lugna ner sig till morgonen ...

dåliga siktförhållanden. Vi såg dock en del repriser samt Golden-headed Quetzal och Narino Tapaculo innan vi for tillbaka till lodgen där vi slappade lite eller alternativt spanade i trädgården; en avvikande sångare debatterades livligt men var med all sannolikhet en Mourning Warbler med ovanligt välmarkerad ögonring. Middagen, som beställts till 18.30, serverades redan 17.45, och efter den digra listgenomgången följde allmän fotografering av fascinerande nattflyn i alla former, färger och storlekar. Sannerligen en lyckad dag!

Tisdag 8/3

Idag gick vi upp en halvtimme tidigare för att göra ett försök på nattfåglar i reservatet, något som efter omständigheterna föll väl ut med både Cloudforest Pygmy-Owl och Lyre-tailed Nightjar hörda. Vädret var minst lika bra som igår, men aktiviteten var dessvärre något avslagen och biotopen väl så degraderad där vi vandrade nerför vägen. Vi bjöds dock på fina obsar av Purple-bibbed Whitetip, Alto Pisones Tapaculo, Club-



västslutningen var den mest renrakade jag har sett i Colombia, i princip en enda stor kaffeplantage! Lunch intogs i Ciudad Bolivar, sedan återstod knappt två timmar till **Jardin**. Mindre än en mil från målet upptäckte Jorge att vi hade punka på vänster bakdäck, men han lyckades ändå köra ända fram till en däckverkstad i utkanten av staden. Tur! Chestnut-collared Swifts kunde studeras fint under lagningen, sedan åkte vi direkt till La Casona (via ett felaktigt hotell!) nära stadens torg och tjusiga kyrka. Härefter kunde man välja mellan att vila, handla, kolla internet eller följa (alternativt störa!) en filminspelning som pågick i ena änden av torget. De

Onsdag 9/3

Klockan 05.00 stod två jeepar och väntade utanför hotellet för att ta oss upp till nästa ProAves-reservat, **Loro Orejamarillo**. Regnet hade skönt nog upphört, men hur såg egentligen vägen ut på högre höjd? Vi skulle enligt uppgift bli tvungna att vandra de sista kilometrarna på grund av ett vägras. När det tog stopp 45 minuter senare förstod vi mycket väl att vägen var oframkomlig, men skadornas omfattning var mycket större än befarat och nattens regn hade knappast gjort saken bättre. De flesta hade som tur var tagit stövlarna, men de som var utan fick det synnerligen svårt att undvika all lera. När vi väl hade passerat de stora lerskreden var vägen perfekt för vanliga skodon. Nåväl, att få se Yellow-eared Parrot var prioritet nummer ett denna morgon, och förhoppningsvis skulle vi få se dem passera ett pass på väg till sina födosöksplatser. Dessvärre blev det dimmigt precis när det började bli dags, och när det slutligen flög förbi en grupp på fyra fåglar var det inte alla som fick se de grå skepnaderna. Våra chaufförer hade meddelat att skogvaktaren skulle möta oss på vägen, till vår förvåning kom han så småningom ifatt oss bakifrån. Han föreslog att vi skulle gå till ett område med holkar, och det lät som om det var god chans att se papegojorna därifrån. Trots hyfsat god aktivitet med arter som Red-crested Cotinga, Blue-backed Conebill, Black-capped Hemispingus och Lacrimose Mountain-Tanager traskade vi mest bestämt framåt i uppklärnande väder. Det blev riktigt soligt och fint med suveräna vyer över västra Anderna! Medan vi väntade på gojorna noterades bland andra Tawny-breasted Tinamou (hörd), Powerful Woodpecker och Streak-throated Bush-Tyrant, men minuterna tickade iväg. Slutligen kom det fram att fåglarna inte alls häckade så här års och att de var svåra att se denna tiden på dygnet! Lite av en "wild goose chase" med andra ord, men vad gjorde det när vi på tillbakavägen såg flera par och smågrupper av Yellow-eared Parrot på nära håll! Någon Tanager-Finch blev det givetvis inte (verkar stört omöjlig!), men vi kunde addera arter som Ocellated Tapaculo (hörd), Rufous-headed Pygmy-Tyrant, Rufous-crowned Tody-Tyrant, Citrine Warbler (*richardsoni*), Capped Conebill och Grass-green Tanager. Vi var tillbaka i Jardin innan tolv och fikade eller åt lunch innan vi fortsatte färden mot Manizales i Cordillera Central. Vid 15.30-tiden gjorde vi ett försök på Grayish Piculet vid en hacienda intill Caucafloden, men vi fick nöja oss med Orange-winged Amazon, Yellow-collared Manakin (oväntad!) och Tropical Gnatcatcher. Den nästan ständigt telefonpratande Jorge fick under kvällen veta att vägen upp till Rio Blanco var oframkomlig med buss efter ett jordskred. Antingen skulle vi få åka i jeepar om det gick att få tag i några, eller sova över på hotell i stan. Under återstoden av resan regnade det ganska rejält vilket sinkade oss avsevärt, så det såg inte bra ut när det gällde att kunna ta sig fram till reservatet. Det hela slutade med att vi fick ta in på första bästa hotell i **Manizales**, vilket var helt OK. På ett gatukök i hörnet av kvarteret köpte vi grillspett eller hamburgare. Frågan uppkom hur man egentligen tog sig in i lokalen, för det fanns ingen dörr! Hur det än förhöll sig med detta hade vi viktigare saker att tänka på; lista och sömn ...

Torsdag 10/3

Det blev alltså jeep även denna morgon, men idag fick vi trängas i ett fordon. Stället där ett jordskred rasat ner över vägen innebar inga problem för jeepen, men med bussen hade det mycket riktigt inte gått att ta sig förbi. Framme vid **Rio Blanco** fick vi en god frukost serverad, och sedan var det dags för ett besök vid resans andra antpittamatning. Brown-banded och Chestnut-crowned Antpittas liksom Stripe-headed Sparrows kunde studeras på suveränt närhåll, men den Chestnut-naped Antpitta som brukade komma tyckte kanske att det var lite för blött denna morgon. Det regnade lätt i någon timme, sedan stabiliserades vädret och blev bättre och bättre under dagen. Fåglar fanns det som brukligt gott om. Flockarna innehöll arter som Streaked Xenops, Pearled Treerunner, Montane Woodcreeper, Rufous-breasted Flycatcher, Mountain Wren, Brown-capped Vireo, Hooded och Buff-breasted Mountain-Tanagers, Superciliaried och Black-eared Hemispinguses, Grass-green Tanager och Plushcap medan skulkare innefattade Bicolored och Slate-crowned (hörd) Antpittas, Ash-colored och Ocellated (hörd) Tapaculos, Rufous Spinetail samt Yellow-bellied Chat-Tyrant. Andra roliga fåglar var Speckle-faced Parrot, Andean Toucanet, Dusky Piha och Slaty-backed Chat-Tyrant. I den sista flocken innan lunch lyckades Ola och Erling få syn på en sällsynt Masked Saltator, men den försvann dessvärre innan någon annan hann få korn på den. Vi tog det lugnt ett tag i samband med lunchen och ägnade oss bland annat åt kolibrifotografering. Precis som året innan var det nästan bara Buff-tailed Coronets som besökte automaterna (under andra delar av året är variationen betydligt större), men även Long-tailed Sylph och Tourmaline Sunangel sågs i blommande buskar nedanför verandan. Under eftermiddagen gick vi en bra bit neråt vägen, men vi började med ett nytt försök på Masked Saltator.

Ola och Erling stegade på som vanligt och plötsligt hördes ett vrål framför oss. I språngmarsch tog vi oss uppför backen och där satt saltatorn helt öppet! Efter denna fina inledning kompletterade vi listan med Scarlet-fronted Parakeet, Crimson-mantled och Powerful Woodpeckers, Bronzy Inca, Fawn-breasted Brilliant och Red-hooded Tanager. Efter ytterligare en fin dag i fält körde vi ner mot hotellet vid 17-tiden. Vägen var nu så gott som renskrapad, men oj vad floden hade ätit upp mycket på några ställen. Inte bra för framtida framkomlighet ens på kort sikt. På kvällen åkte vi in till centrala Manizales för att äta pizza. Jorge var i storform och spelade Michael Jackson-videor för oss, pizzan smakade utmärkt och alla var allmänt nöjda med tillvaron. Fast det är klart, Bengt-Eric hade ju gärna velat se White-capped Tanager också ...



Nevado del Ruiz och Jorge.

Fredag 11/3

Vår sista exkursion i centrala Colombia skulle avgå 05.30 men blev 40 minuter försenad på grund av punktering på vänster bakhjul. Men det gjorde inte så mycket. Vi fick tillfälle att läsa lite om de otäckta nyheterna om en stor jordbävning i Japan med tillhörande tsunami, och solen sken över Cordillera Central. Vårt mål **Nevado del Ruiz** och två andra snöklädda toppar var fullt synliga när vi lämnade Manizales. Väl uppe i elfinskog på 3 600 meters höjd satte skådningen igång, och vi blev snabbt varse om en god förekomst av kolibrier. Shining Sunbeam var vanlig, och vi såg även Rainbow-bearded Thornbill, Great Sapphirewing, Viridian Metaltail och Golden-breasted Puffleg. Bland övriga fåglar noterades bland andra Black-chested Buzzard-Eagle, White-chinned Thistle-tail, Paramo Tapaculo och Rufous Antpitta (hörda), Grass Wren, Scarlet-bellied Mountain-Tanager och Black-backed Bush-Tanager. Vid 9-tiden åkte vi upp till en liten sjö på 3 800 meters höjd där det låg några Andean Teals och Ruddy Ducks, det dracks också gratis kaffe och inhandlades vantar (av Ola) i de colombianska färgerna. Här efter följde fotografering av det mäktiga Nevado del Ruiz, och slutligen var det dags för eftersökningen av den åtråvärda Bearded Helmetcrest. Bengt-Eric och Ola var verkligen heta på gröten, men det var Håkan som slog till och hittade en hane sittande i en busktopp! Efter ett hastigt försvinnande återfanns skönt nog den läckra kolibrin så att alla fick åtminstone en hyfsad obs innan moln drog in och kraftigt försämrade sikten. Nöjda åkte vi ner till skogen där vi gick utmed vägen i ytterligare en och en halv timme i växlande molnighet och kunde addera en hona Paramo Tapaculo med "dununge" (!) samt en fin hane Black-thighed Puffleg. Klockan 12.10 kunde vi nöjda återvända till Manizales där vi snart hittade en restaurang vid namn "Rockola". Från en liten scen blev Ola gratulerad av Joakim för det efterlängtrade krysset av Bearded Helmetcrest, och sedan gick mikrofonen vidare till Erling som ledde oss i allsång för födelsedagsbarnet Jorge, 32 år. Det packades och byttes kläder innan vi for iväg till flygplatsen där vi tackade Jorge för en fin insats och sedan checkade in bagaget. Vid 17-tiden lyfte planet till **Bogota**, en kort flight som dock bjöd på två rejäla luftgropar. Medan vi väntade på planet till Santa Marta fick vi se bilder från tsunamin i Japan, vilka fruktansvärda krafter! Flygfärden till **Santa Marta** blev oväntat en enerverande tillställning, då ett gäng sällsynt ohyfsade (påända?) amerikanska collegeungdomar och en skällande hund (!) förde ett himla oväsen. Det var därför en lättnad att få kliva ur planet i den ljumma karibiska kvällen och



Streaked Flycatcher, Minca.

snart hoppa in i bekväma jeepar anförda av två unga killar vid namn Jorge, också kända som Jorge och Jorgito. Vid 22.10-tiden var vi äntligen framme vid det trevliga Hotel **Minca**, och så snart diverse förberedelser för morgondagen var avklarade fick man äntligen gå till sängs.

Lördag 12/3

Efter frukosten 05.15 tog vi jeepar och körde ca 7 km nedanför Minca för att under några timmar skåda i fragmenterade skogsmiljöer och plantager utmed vägen. Vi fick ihop en hel del roligt, inklusive hela 34 Military Macaws, Short-tailed Hawk, Scaled Pigeon, Whooping Motmot, Rufous-tailed Jacamar, Rainbow-billed Toucan, Cocoa Woodcreeper, Black-backed Antshrike, Forest och Greenish Elaenias, Pale-eyed Pygmy-Tyrant, Golden-fronted Greenlet, Black-whiskered och Red-eyed Vireos, Rufous-breasted och Rufous-and-white Wrens, Clay-colored Thrush, Red-legged Honeycreeper, Swallow Tanager och Orange-crowned Oriole. Vid 10-tiden satte vi oss för att spana kolibrier vid hotellets feeders. Steely-vented Hummingbird och White-necked Jacobin dominerade stort, men vi fann även en hel del

White-vented Plumeteers, Black-throated Mango, Hairy Hermit och en hane Lazuline Sabrewing. Av den lokale skådarkillen Marcos fick vi sedermera veta att den Santa Marta Sabrewing (en hona) som rapporterats från hotellet sedan december hade sitt vinterrevir i skogen en bit bort och inte kom fram till feeders. Platschefen Miles, som hade blivit fast i Santa Marta kvällen innan, konfirmerade det hela, och efter en utsökt men oväntat dyr lunch gick vi iväg i sällskap med Marcos för att försöka hitta rariteten. Tidpunkten på dagen

var knappast den bästa, och inte ens sparvugglevisslingar kunde frambringa mer än enstaka fåglar. Vi fick nöja oss med lite reprisar och sedan påbörja färden upp mot det hägrande **El Dorado**. På en allt sämre väg skumpade vi upp för Santa Martas sluttningar och stannade knappt innan vi nått omkring 1 300 meters höjd. Här letade vi i första hand efter kolibrier men fick "nöja oss" med fina obsar av Yellow-billed Toucanet, Black-chested Jay, Santa Marta Tapaculo, Santa Marta Brush-Finch och en



Yellow-billed Toucanet, El Dorado. Foto: Joakim Johansson.

hörd Rusty-breasted Antpitta. Vid en liten *tienda* inne i skogen spelades musik på hög volym och såldes drycker och choklad, men huvudanledningen till vårt stopp var att Blossomcrown verkade ha setts regelbundet här till och från. Efter en timmes väntan kunde reseledaren exalterat basunera ut en vacker hane Blossomcrown, och som bonus fick vi även se Sooty-capped Hermit, White-lored Warbler (Ola), Black-headed Tanager och Blue-naped Chlorophonia. Nöjda kunde vi så skumpa vidare de sista kilometrarna till den vackert belägna lodgen med grym utsikt över den karibiska kusten.

Rumsfördelningen bestämdes av en fågelsångstävling där vinnaren fick balkong. Joakim imponerade genom att på bara några sekunder känna igen Chocó Vireo, så det blev han och Bengt-Eric som fick viprummet! I trädgården kunde vi under kvällen hänga in Black-fronted Wood-Quail (hörd), Tyrian Metaltail, White-tailed Starfontlet (hona) och Colombian Brush-Finch för några samt en inmatad Santa Marta Antpitta. Till middag fick vi bland annat utsökt tillagad yucca, ytterligare en viktig komponent till den förestående Valentins yuccabar i Lund – eller Staffanstorp. Givetvis spännande att vara här!



Yellow-crowned Whitestart. Foto: Joakim Johansson.

lista av Santa Marta-endemer. Ryggen var tyvärr insvept i moln, men istället för den hisnande utsikten fick vi vindstilla förhållanden vilket gynnade fågelaktiviteten. Svåra arter som Santa Marta Parakeet, Santa Marta Bush-Tyrant, Santa Marta Rufous Antpitta (på vägen!) och Santa Marta Warbler (tyvärr väl så kvicka) var extra välkomna, och i en rad med slöjnet som ingick i ett långtidsprojekt för att övervaka områdets fåglar satt såväl Santa Marta Mountain-Tanager (också känd som Montane Bush-Tanager ;) och Mountain Velvetbreast som en hona White-tailed Starfrontlet. Tillbaka vid bilarna hittade Ola en liten hummare som snart bestämdes till en hona av den sällan sedda endemen Black-backed Thornbill, och i en blommande eukalyptus såg Nisse dessutom en hona Santa Marta Woodstar! Innan morgonen var över hade vi också sett arter som Sickle-winged Guan, en snabb hane White-tailed Starfontlet, Rusty-headed Spinetail, Montane Woodcreeper, Gray-breasted Wood-Wren (*anachoreta*), Yellow-crowned Whitestart och Plushcap samt hört Brown-rumped Tapaculo. Även om molntäcket lättade fick vi tyvärr inte någon skymt av det majestätiska huvudmassivet. Innan lunch hann vi även med lite skådning på lägre höjd, vilket gav White-tipped Quetzal (hörd), Streak-capped Spinetail, Golden-breasted Fruiteater och Black-throated Tody-Tyrant. Morgonen var så lyckad att eftermiddagen lämnades öppen för fria aktiviteter kring lodgen! Det vilades, fotograferades och spanades i omgivningarna. Några såg en White-tipped Quetzal, reseledaren sprang på en Gray-throated Leaf-tosser i skogen och alla fick se Colombian Brush-Finch fint i trädgården. Henry och Håkan satt länge och väntade på att någon Black-fronted Wood-Quail skulle besöka komposten, men de fick nöja sig med Santa Marta Antpitta. Dock

Söndag 13/3

För att kunna ta oss upp till toppen av San Lorenzo ridge till 6-tiden fick vi frukosten serverad 04.30. Innan dess hade vi redan hört den obeskrivna Santa Marta Screech-Owl! Sedan började skumpanDET igen. Ledarbilen stötte en eller två Band-winged Nightjars, annars var det bara att hålla i sig tills vi nådde parkeringsplatsen vid "La Laguna". Jag hade i förväg proklamerat vikten av att vara tidigt på plats, vilket också bevisades när vi efter en timme kunde summera en fantastisk



Blue-naped Chlorophonia.



Den nysplittade Colombian Brush-Finch.

hade försökt på annat håll och kunde visa upp fina fotografier! Eftersom vädret visade sig vara hyfsat klart gick vi efter frukosten till en utsiktspunkt för att om möjligt få vyer över Santa Marta, men det var tyvärr med nöd och näppe som man kunde urskilja de tre snöklädda topparna och alla tog sig inte upp för stigen dit efter rapporter om att man ändå inte såg något. Skogen nedanför lodgen gav Slaty-backed Nightingale-Thrush, Black-hooded Thrush och Santa Marta Antpitta, men ingen Gray-throated Leaf-tosser. Resten av morgonen vandrade vi nedför vägen ända till Blossomcrown-tiendan. Huvudmålarten Santa Marta Foliage-gleaner sågs endast av Joakim och Ola, trots en hel del playback fick vi inte ens höra någon annan individ. Santa Marta Tapaculo, som inte alla hade fått se tidigare, hoppade fram i ett par sekunder men gäckade fortfarande några i gruppen. I övrigt kunde vi notera White-tipped Quetzal (hörd), flera Lined Quail-Doves, Streak-capped Spinetail, Streaked Xenops, Olive-striped Flycatcher, Black-and-white Becard, Black-headed Tanager och slutligen hanen av Blossomcrown. Vi återvände med jeeparna vid 11.30-tiden och tog det lugnt fram till 15.00 då vi åkte ner till tiendan och fortsatte av vandra längs med vägen. En hona Coppery Emerald blev den största behållningen, medan andra intressanta arter bland annat inkluderade Long-tailed Antbird och Rusty-breasted Antpitta (osynlig men nära!). Någon Santa Marta Woodstar stod tyvärr inte att finna. En klart lugnare dag jämfört med gårdagen, men helt OK efter förutsättningarna.

Tisdag 15/3

Vi lämnade lodgen bakom oss strax efter 06.00 och åkte mot **Minca** med endast ett par stopp, eftersom vi ville göra ett seriöst försök på Santa Marta Sabrewing så tidigt som möjligt. En Santa Marta Foliage-gleaner lät spontant ett par gånger från en kaffeplantage, de flesta var på alerten och fick höra fågeln men några fler livstecken kunde inte frambringas. Följebilens passagerare såg tio Military Macaws på nära håll! Väl framme i Minca gick vi raka vägen till lokalen för Santa Marta Sabrewing och försökte åter locka fram den med sparvugglevisslingar. Knappt en kolibri fanns att beskåda i skogen! Hoppet rann snabbt ut, men vi kunde snart kompensera med obsar av Northern

fick vi faktiskt se en dununge av Wood-Quail som någon hade hittat ute på vägen och omhändertagit! Det molniga vädret gjorde att solnedgångsvyerna uteblev, men vilken lyckad dag vi hade bakom oss!

Måndag 14/3

Eftersom vi redan hade sett alla höghöjdsarter föll valet denna morgon på att först göra ett försök att se Santa Marta Screech-Owl och sedan återvända för frukost och skådning på mellannivåerna. När det gäller ugglan lyckades vi höra hela fem individer varav två på nära håll, men vi lyckades inte se dem. Några engelsmän som anlät kvällen innan



Cinnamon Flycatcher. Foto: Joakim Johansson.

Royal-Flycatcher, White-bearded Manakin och Scaled Piculet. Erling och Joakim bestämde sig för att jobba mer på solbrännan medan övriga höll ut till 10.30-tiden. Enligt programmet skulle en minibuss hämta oss vid 13.00 för vidare transport mot Ríoacha, men vi åkte istället ner mot **Santa Marta** med jeeparna för att i förtid möta bussen och på så sätt tjäna tid (och pengar). Vår nye chaufför Julio var på plats med en rymlig buss vid den överenskomna mötesplatsen klockan 11.40, och snart var vi på väg mot Guajiráhalvön. Vi kåkade lunch strax utanför Tayrona NP och kunde samtidigt spana in King Vulture (SH), Common Black-Hawk, tre arter kungsfiskare, Spotted Sandpiper och Orange-crowned Oriole. Längs den fortsatta färdrutten sågs överraskande nog en Northern Screamer, annars gjorde vi bara ett fåtal stopp längs den vältrafikerade vägen; Magnificent Frigatebird och Brown Pelican sågs i förbifarten. Vi anlände till **Ríoacha** redan vid 15-tiden. Innan vi checkade in på Hotel Barbacoa tog vi ut pengar och handlade snacks i en supermercado, sedan åkte alla utom reseledaren ner till strandpromenaden för att ta ett dopp i Karibiska sjön. Alla kom tillbaka välbehållna efter 2-3 timmar, men Nisses plånbok hade förmodligen påbörjat en oönskad resa med havsströmmarna mot Västafrika. På kvällen gick vi bort mot centrum och strandpromenaden för att äta middag på en restaurang vars granne var en av flera pubar i området som spelade musik på onödigt hög volym. Kvällstemperaturen var dock mycket behaglig och maten smakade OK. Så förflöt i stort sett denna tisdag, den 15 mars anno 2011.



Onsdag 16/3

Denna morgon kändes på något sätt som början på slutet av resan.

Klockan 06.00 började skådningen vid Camarones, **Los Flamencos**, och de fragmenterade buskskogarna och betesmarkerna med inslag av våtmarker längs den gamla infarten till byn var fulla med nya fåglar för resan! Innan klockan slog halv nio hade vi sett bland andra Roseate Spoonbill, White och Glossy Ibises, Black-bellied Whistling-Duck, Rufous-vented Chachalaca, Limpkin, Gray-necked Wood-Rail, Greater och Lesser Yellowlegs,

Green-rumped Parrotlet, Brown-throated Parakeet, Buffy Hummingbird, Red-billed Emerald, Russet-throated Puffbird, Rufous-tailed Jacamar, White-whiskered Spinetail, Caribbean Hornero, Black-crested Antshrike, Slender-billed Tyrannulet, Northern Scrub-Flycatcher, Pied Water-Tyrant, Glaucous Tanager (för några), Orinocan Saltator samt Baltimore och Yellow Orioles; Vermilion Cardinal var det bara Bengt-Eric som lyckades se. En nationalparksanställd motorcyklist stannade och pratade med både Julio och oss, hävdandes att vi skulle betala en inträdesavgift för att få besöka området. Det var ju något helt nytt, och hur detta skulle gå till verkade något oklart. Julio ville uppenbarligen inte fortsätta utan mitt godkännande, vilket ledde till att han stod kvar medan vi traskade på utmed vägen. Till slut fick jag gå och hämta bussen, sedan fortsatte vi mot nya marker som om inget hade hänt. En promenad i ett skogigare område gav slutligen Vermilion Cardinal åt alla utom Håkan, i övrigt kan också nämnas nytillskotten Prothonotary Warbler och Gray Pileated-Finch. Slutklämmen på morgonen blev ett besök



White Ibises och White-whiskered Spinetail.



Snowy Egret och en mix av Willets, Whimbrels, Marbled Godwits och Laughing Gulls.

vid den stora tidvattenlagunen där vi trots högvatten hittade rariteter i form av silltrut och fyra Marbled Godwits samt vanligare fåglar som Reddish Egret, Great Blue Heron, Royal och Sandwich Terns, Wilson's Plover, Whimbrel, Western och Least Sandpipers samt Willet. Motorcykelkillen stannade och pratade med oss ytterligare en gång med samma uppsåt som tidigare, men nu kunde en ung engelsktalande tjej hjälpa till med förhandlingarna som slutade med att vi slapp betala för den här gången. Vi åkte sedan tillbaka till Riohacha för en siesta, där de flesta valde att åka ner till strandpromenaden och äta lunch medan Nisse och undertecknad stannade kvar på hotellet. Klockan 16.00 var det dags för eftermiddagspasset vid Los Flamencos som i stort sett handlade om lagunskådning. Det var nu lågvatten och fullt med fågel, här bland 800 Semipalmated Sandpipers, 200 Least Sandpipers, 100 Western Sandpipers, 400 Short-billed Dowitchers, 130 Semipalmated Plovers och 8 kustpipare. Ecotursguiden Forrest Rowland med klient fanns också på plats och kunde senare rapportera om två Forster's Terns nära lagunens inlopp, en superraritet i Colombia! Vi drog genast och fick se de rara gästerna, i övrigt kunde vi också notera arter som Yellow-crowned Night-Heron, Caspian och Common Terns samt American Oystercatcher. Strax efter solnedgången återvände vi till Riohacha och gick sedan för att äta middag på en långsam restaurang med hög ljudvolym. Listan blev färdig först efter halv elva, men ett trevligt innehåll hade den!

Torsdag 17/3

Vi återvände denna vår sista skådamorgon till Los Flamencos och gav oss genast in i skogen i jakt på Chestnut Piculet och Tocuyo Sparrow. Efter ett par timmars harvande lyckades Joakim skönt nog hitta ett par pyttespettar som sågs fint av alla, men sparven visade tyvärr inga livstecken. Andra roligheter var Crested Bobwhite, Ferruginous Pygmy-Owl, Ochre-lored Flatbill, Black-and-white Warbler, Glaucous Tanager och ett par kvicka Vermilion Cardinals. Morgonens kommentar kom som så ofta från Ola och gällde en Gray Pileated-Finch som "spärrade upp hela huvudet". Att det måste ha varit "en väldigt annorlunda upplevelse" råder det ingen tvekan om :). Ute ur skogen gav den obligatoriska lagunspaningen flera roliga tillskott i form av enstaka exemplar av American Flamingo, Double-striped Thick-knee och Cayenne Tern samt ett gäng sandlöpare. Spovarna var kvar liksom en Forster's



Spotted Sandpiper, Los Flamencos.

Tern medan silltrutarna utökats till två! En adult pilgrimsfalk rörde om i grytan och lyckades enligt Bengt-Eric även slå en obestämd vadare. Vid 10-tiden avbröt vi skådningen för att åka till hotellet och förbereda oss inför hemresan, klockan halv ett startade färden mot **Santa Marta**. Nisse och Bengt-Eric var heta på Chestnut-winged Chachalaca, men hur skulle man se en sådan mitt på blanka eftermiddagen? Kanske Julio kände till lokalen nära flygplatsen? Det gjorde han, och vid halv fyra klev vi ur bussen i stekande hetta. Vi hade 20 minuter på oss, ett till synes omöjligt företag! Men hur det nu var fick den skeptiske reseledaren se en större fågel flyga över vägen, och snart var konstaterandet av två chachalacas ett faktum. Det rådde ett visst tumult innan alla fick se de rörliga fåglarna, men till slut satt de fast på samtligas näthinnor. Kryss för samtliga! Snart befann vi oss på flygplatsen och kom iväg utan problem, planet landade i **Bogotá** vid 18.40-tiden. Här tog vi farväl av Bengt-Eric som skulle hem direkt på kvällen och Håkan som skulle fortsätta till Hawaii. Övriga fortsatte till Hotel Emporium där vi åt en god köttbit och överensstämde i att det hade varit en mycket lyckad resa (indeed!). Henry och Samuel tog farväl av övriga i gruppen som hade hela morgondagen på sig att utforska Bogota, sedan var det bara att slutgiltigt förbereda sig för hemresan och krypa till kojs.

Fredag 18/3

Allt förflöt väl under morgonen. Vi fick frukost klockan sex, skjutsades till flygplatsen, checkade in smidigt i elite access-kön och hade tid över för att i lugn och ro ta oss igenom alla kontroller. Även en donut slank ner innan det var dags att gå ombord på planet som lyfte i hyfsad tid. Våra kvarstannare tog sig enligt rapport in till koloniala Bogotá för ett besök på stadens berömda guldmuseum. Liberty Airport i **Newark** bevisade åter sin ställning som (i mitt tycke) världens smidigaste storflygplats, jag hann med att handla en bok, ta ut pengar och käka middag innan det var dags att ta farväl av Henry. Stockholmsfligheten tog bara sju timmar, och på den tiden hann jag se tre bra filmer: *The Voyage of the Dawnreader*, *Harry Potter and the Deathly Hallows* och *Tangled*. Ingen sömn alls med andra ord, men trevligt var det!

Lördag 19/3

Vi landade på Arlanda redan 05.50, vilket var över en och en halv timme tidigare än tidsschemat! För första gången någonsin lyckades jag därför ta mig hem till Tranås så tidigt som 11.12, två timmar tidigare än normalt. Muy bien indeed! Inte så dumt med lite vårvinter heller för den delen ...

Artlista

TINAMIDAE

Tawny-breasted Tinamou *Nothocercus julius* 5/3 2 sj., 6/3 1 sj. Colibri del Sol, 9/3 3 sj. Jardin.

Little Tinamou *Crypturellus soui* 28/2 1 sj. Pauxi.

PODICIPEDIDAE

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* 24/2 10 ex. Laguna de Fúquene.

FREGATIDAE

Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* 15/3 5 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 20 ex., 17/3 ca 25 ex. Los Flamencos.

PHALACROCORACIDAE

Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus* 1/3 ca 50 ex. Medio Magdalena, 3/3 5 ex. Arrierito–Medellín, 9/3 2 ex. Rio Cauca, 15/3 ca 10 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 30 ex., 17/3 ca 20 ex. Los Flamencos.

ANHINGIDAE

Anhinga *Anhinga anhinga* 1/3 1 ex. Medio Magdalena (NK).

PELECANIDAE

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis* 15/3 21 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 10 ex. Los Flamencos.

ARDEIDAE

Capped Heron *Pilherodius pileatus* 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín.

Great Blue Heron *Ardea herodias* 9/3 1 ex. Rio Cauca, 16/3 ca 10 ex., 17/3 3 ex. Los Flamencos.

Cocoi Heron *Ardea cocoi* 24/2 1 ex. Laguna de Fúquene, 1/3 5 ex. Medio Magdalena.

Great Egret *Ardea alba* 24/2 2 ex. Laguna de Fúquene, 1/3 ca 50 ex. Medio Magdalena, 3/3 ca 75 ex. Arrierito–Medellín, 4/3 5 ex. Medellín–Bolombolo, 9/3 1 ex. Rio Cauca, 15/3 ca 10 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 30 ex., 17/3 ca 30 ex. Los Flamencos.

Reddish Egret *Egretta rufescens* (nt) 16/3 ca 10 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

Tricolored Heron *Egretta tricolor* 16/3 5 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Little Blue Heron *Egretta caerulea* 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 15/3 2 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 10 ex., 17/3 3 ex. Los Flamencos.

Snowy Egret *Egretta thula* 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 3/3 ca 20 ex. Arrierito–Medellín, 15/3 ca 20 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 50 ex., 17/3 ca 30 ex. Los Flamencos.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Sedd under 13 dagar med max. 1000+ ex. i Medio Magdalena 1/3 och 800 ex. längs Rio Cauca 9/3.

Striated Heron *Butorides striata* 1/3 3 ex. Medio Magdalena, 16/3 2 ex. Los Flamencos.

Yellow-crowned Night-Heron *Nycticorax violaceus* 16/3 15 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 24/2 ca 20 ex. Laguna de Fúquene, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín, 15/3 1 ad. Santa Marta–Riohacha (BES).

Least Bittern *Ixobrychus exilis* 24/2 3 ex. Laguna de Fúquene.

THRESKIORNITIDAE

Green Ibis *Mesembrinibis cayennensis* 1/3 1 hörd Medio Magdalena.

Whispering Ibis *Phimosus infuscatus* 1/3 ca 30 ex. Medio Magdalena, 3/3 ca 100 ex. Arrierito–Medellín, 16/3 4 ex. Los Flamencos.

American White Ibis *Eudocimus albus* 16/3 ca 80 ex. Los Flamencos. Dessutom sågs två hybrider mellan White och Scarlet Ibis.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* 16/3 1 ex. Los Flamencos.

Roseate Spoonbill *Platalea ajaja* 15/3 5 ex., 16/3 ca 20 ex., 17/3 ca 15 ex. Los Flamencos.

PHOENICOPTERIDAE

American Flamingo *Phoenicopterus ruber* 17/3 1 ex. Los Flamencos.

ANHIMIDAE

Northern Screamer *Chauna chaveria* (nt) 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 15 och 17/3 1 ex. Santa Marta–Riohacha. Den sistnämnda fågeln sågs på exakt samma ställe mer eller mindre inne i en by, så det verkar tveksamt om den kan betraktas som en vild fågel.

ANATIDAE

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor* 1/3 1 ex. Medio Magdalena.

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis* 1/3 2 ex. Medio Magdalena (NK), 9/3 5 ex. Rio Cauca, 16/3 9 ex. Los Flamencos, 17/3 4 ex. Riohacha–Santa Marta (NK).

Andean Teal *Anas andium* 11/3 2 ex. Nevado del Ruiz.

Blue-winged Teal *Anas discors* 24/2 ca 20 ex. Laguna de Fúquene.

American Ruddy-Duck *Oxyura jamaicensis andina* 11/3 3 ex. Nevado del Ruiz.

CATHARTIDAE

Turkey Vulture *Cathartes aura* Tämligen allmän, sedd under 17 dagar.

Lesser Yellow-headed Vulture *Cathartes burrovianus* 1/3 ca 10 ex. Medio Magdalena, 16/3 1 ex. Los Flamencos.

Black Vulture *Coragyps atratus* Tämligen allmän–allmän, sedd under 19 dagar.

King Vulture *Sarcoramphus papa* 15/3 1 juv. Tayrona (SH), 17/3 2 ad. Río hacha–Santa Marta.

PANDIONIDAE

Osprey *Haliaeetus albicilla* 24/2 2 ex. Laguna de Fúquene, 28/2 1 ex. str. Pauxi (NK), 14/3 1 ex. str. El Dorado.

ACCIPITRIDAE

Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus* 3/3 5 ex. Arrierito, 7/3 1 ex. Las Tangaras, 15/3 1 ex. Santa Marta–Riohacha.

White-tailed Kite *Elanus leucurus* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo–Bogotá, 2 ex. La Florida, 24/2 2 ex. längs med vägen, 2 ex. Laguna de Fúquene, 27/2 1 ex., 28/1 1 ex. Pauxi, 4/3 3 ex. Colibri del Sol.

Double-toothed Kite *Harpagus bidentatus* 7/3 3 ex. Las Tangaras.

Plain-breasted Hawk *Accipiter (striatus) ventralis* 9/3 1 ex. Rio Cauca (NK).

Common Black-Hawk *Buteogallus anthracinus* 15/3 1 ad. Tayrona.

Savanna Hawk *Buteogallus meridionalis* 1/3 3 ex. Medio Magdalena, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín.

Black-chested Buzzard-Eagle *Geranoaetus melanoleucus* 25/2 1 ex. Galán, 11/3 1 ad. Nevado del Ruiz.

Roadside Hawk *Buteo magnirostris* Sedd med 1-5 ex. under 15 dagar, mestadels under transporter.

Broad-winged Hawk *Buteo platypterus* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 24/2 2 ex., 25/2 1 ex. längs med vägen, 28/2 1 ex. Pauxi, 3/3 1 ex. nära Arrierito, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 2 ex. Las Tangaras, 10/3 2 ex. Rio Blanco, 12/3 3 ex., 14/3 2 ex. El Dorado, 15/3 2 ex. Minca.

Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus* 12/3 2 ex., 15/3 2 ex. Minca, 13/3 2 ex. El Dorado.

White-tailed Hawk *Buteo albicaudatus* 4/3 1 ad. Colibri del Sol.

Black Hawk-Eagle *Spizaetus tyrannus* 26/2 1 ex., 27/2 1 ad. Reinita.

FALCONIDAE

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima* Sedd med 1-20 ex. under 11 dagar, främst utefter vägarna.

Northern Caracara *Caracara cheriway* 1/3 5 ex. Medio Magdalena, 4/3 3 ex., 6/3 1 ex. Colibri del Sol, 10/3 1 ex. Rio Blanco, 15/3 5 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 30 ex., 17/3 ca 20 ex. Los Flamencos.

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans* 28/2 1 hörd Pauxi, 1/3 2 ex. Medio Magdalena.

Barred Forest-Falcon *Micrastur ruficollis* 14/3 1 ex. (NK, BES)+2 hörda El Dorado.

American Kestrel *Falco sparverius* 23/2 ca 10 ex. Mundo Nuevo/Bogotá, 24/2 2 ex., 25/2 4 ex. längs med vägen, 26/2 2 ex. Reinita, 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 6/3 1 ex. längs med vägen, 17/3 3 ex. Santa Marta.

Aplomado Falcon *Falco femoralis* 4/3 1 ex. Concordia.

Merlin *Falco columbarius* 14/3 1 2K El Dorado.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* 9/3 1 ex. Jardin, 16/3 1 ex., 17/3 1 ad. Los Flamencos.

CRACIDAE

Chestnut-winged Chachalaca *Ortalis garrula* 17/3 2 ex. Santa Marta–Ciénega.

Rufous-vented Chachalaca *Ortalis ruficauda* 16/3 1 ex.+1 sj. Los Flamencos.

Colombian Chachalaca *Ortalis columbiana* 25/2 ca 10 ex. San Gil, 28/2 2 ex., 1/3 1 hörd Pauxi, 1/3 3 ex. Medio Magdalena, 2/3 1 hörd, 3/3 2 ex.+8 hörda Arrierito, 4/3 1 hörd Medellín–Bolombolo, 8/3 1 ex. Ciudad Bolívar–Jardin.

Andean Guan *Penelope montagnii* 9/3 1 ex. Jardin.

Wattled Guan *Aburria aburri* 28/2 2 sj. Pauxi, 3/3 2 sj. Arrierito.

Sickle-winged Guan *Chamaepetes goudotii sanctaemarthae* 13/3 2 ex.+2 sj., 14/3 1 ex.+3 sj., 15/3 1 sj. El Dorado.

ODONTOPHORIDAE

Crested Bobwhite *Colinus cristatus* 17/3 minst 9 ex. Los Flamencos.

Marbled Wood-Quail *Odontophorus gujanensis* 28/2 5 sj. Pauxi.

Black-fronted Wood-Quail *Odontophorus atrifrons atrifrons* 12/3 2 sj., 13/3 1 pull, 6 sj. El Dorado.

Chestnut Wood-Quail *Odontophorus hyperythrus* (nt) 2/3 3 sj. Arrierito, 7/3 3 sj., 8/3 2 sj. Las Tangaras.

Gorgeted Wood-Quail *Odontophorus strophium* (EN) 26/2 1 sj. (skymtad av JJ) Reinita.

ARAMIDAE

Limpkin *Aramus guarauna* 16/3 1 ex. Los Flamencos.

RALLIDAE

Russet-crowned Crake *Anurolimnas viridis* 2/3 4 sj. Arrierito.

Bogotá Rail *Rallus semiplumbeus* (EN) 23/2 2 hörda La Florida. Verkar ha blivit något svårare att se de sista åren, men det beror också mycket på det aktuella vattenståndet.

Gray-necked Wood-Rail *Aramides cajanea* 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín, 16/3 1 ex. Los Flamencos.

Sora *Porzana carolina* 24/2 1 ex. Laguna de Fúquene.

Blackish Rail *Pardirallus nigricans* 2/3 2 hörda Arrierito.

Purple Gallinule *Porphyrio martinicus* 1/3 2 ad., 1 juv. Medio Magdalena.

Common Gallinule *Gallinula galeata* 23/2 4 ex. La Florida, 24/2 ca 20 ex. Laguna de Fúquene.

Spot-flanked Gallinule *Gallinula melanops bogotensis* 24/2 7 ex. Laguna de Fúquene. Denna isolerade ras betraktas numera som kritiskt utrotningshotad.

American Coot *Fulica americana columbiana* 23/2 7 ex. La Florida, 24/2 ca 100 ex. Laguna de Fúquene.

JACANIDAE

Wattled Jacana *Jacana jacana hypomelaena* 1/3 ca 15 ex. Medio Magdalena, 3/3 5 ex. Arrierito–Medellín, 16/3 10 ex. Los Flamencos, 17/3 13 ex. Riohacha–Santa Marta. En fågel vid Los Flamencos såg ut att tillhöra en normalfärgad ras, förmodligen *melanopygia*.

HAEMATOPODIDAE

American Oystercatcher *Haematopus palliatus* 16-17/3 2 ex. Los Flamencos.

RECURVIROSTRIDAE

Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus* 17/3 2 ex. Santa Marta (SH).

BURHINIDAE

Double-striped Thick-knee *Burhinus bistriatus pediacus* 17/3 1 ex. Los Flamencos.

CHARADRIIDAE

Southern Lapwing *Vanellus chilensis* 23/2 1 ex.+1 hörd La Florida, 1/3 ca 10 ex. Medio Magdalena, 3/3 5 ex. Arrierito–Medellín, 4/3 5 ex. Colibri del Sol, 6/3 10 ex.+hörd Colibri del Sol/Urrao, 8/3 1 ex. Ciudad Bolívar–Jardin, 11/3 2 ex. Nevado del Ruiz, 1 ex. Manizales, 16/3 2 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

Grey Plover *Pluvialis squatarola* 16/3 8 ex. Los Flamencos.

Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus* 16/3 ca 130 ex. Los Flamencos.

Wilson's Plover *Charadrius wilsonia* 16/3 6 ex. Los Flamencos.

SCOLOPACIDAE

Noble Snipe *Gallinago nobilis* (nt) 24/2 2 ex. Laguna de Fúquene.

Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus* 16/3 ca 400 ex. Los Flamencos.

Marbled Godwit *Limosa fedoa* 16-17/3 4 ex. Los Flamencos.

Hudsonian Curlew *Numenius (phaeopus) hudsonicus* 16/3 ca 50 ex., 17/3 ca 20 ex. Los Flamencos.

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca* 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 9/3 1 ex. Rio Cauca, 16/3 ca 20 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* 16/3 3 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Solitary Sandpiper *Tringa solitaria* 25/2 2 ex. San Gil–Zapoteca, 1/3 6 ex. Medio Magdalena, 16/3 3 ex., 17/3 3 ex. Los Flamencos.

Willet *Tringa semipalmata* 16/3 ca 100 ex., 17/3 ca 50 ex. Los Flamencos.

Spotted Sandpiper *Actitis macularius* 15/3 3 ex. Tayrona, 16-17/3 1 ex. Los Flamencos.

Sanderling *Calidris alba* 17/3 ca 30 ex. Los Flamencos.

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* 16/3 ca 1000 ex., 17/3 ca 10 ex. Los Flamencos.

Western Sandpiper *Calidris mauri* 16/3 ca 100 ex., 17/3 ca 150 ex. Los Flamencos.

Least Sandpiper *Calidris minutilla* 16/3 ca 200 ex. Los Flamencos.

LARIDAE

Laughing Gull *Leucophaeus atricilla* 16/3 ca 150 ex., 17/3 ca 75 ex. Los Flamencos.

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus graellsii* 16/3 1 ad., 17/3 2 ad. Los Flamencos.

Caspian Tern *Hydroprogne caspia* 16/3 5 ex., 17/3 4 ex. Los Flamencos.

Cabot's Tern *Thalasseus (sandvicensis) acutiflavus* 16/3 ca 100 ex., 17/3 ca 50 ex. Los Flamencos. En individ den 17/3 var en *eurygnatha*, Cayenne Tern

Royal Tern *Thalasseus maximus* 15/3 10 ex. Riohacha, 16/3 ca 50 ex., 17/3 ca 20 ex. Los Flamencos.

Common Tern *Sterna hirundo* 16/3 1 ex. Los Flamencos.

Forster's Tern *Sterna forsteri* 16/3 2 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos. Tidigare fanns bara 2-3 fynd i Colombia!

Yellow-billed Tern *Sternula superciliaris* 1/3 1 ad. nära Puerto Berrio, Medio Magdalena.

Black Skimmer *Rynchops niger* 16/3 1 juv. Los Flamencos.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia* Vanlig i anslutning till städer och samhällen, sedd under 14 dagar.

Scaled Pigeon *Patagioenas speciosa* 12/3 4 ex., 15/3 3 ex. Minca.

Bare-eyed Pigeon *Patagioenas coro* 15/3 3 ex., 16/3 ca 50 ex., 17/3 ca 25 ex. Los Flamencos.

Band-tailed Pigeon *Patagioenas fasciata* Noterad under 17 dagar med max. 100 ex. vid Colibri del Sol 6/3 respektive El Dorado 14/3.

Pale-vented Pigeon *Patagioenas cayennensis* 1/3 1 ex.+1 sj. Medio Magdalena, 3/3 2 ex. Arrierito–Medellín.

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea* 28/2 1 sj. Pauxi, 8/3 1 ex.+1 sj. Las Tangaras.

Ruddy Pigeon *Patagioenas subvinacea* 26/2 1 ex.+1 sj., 27/2 1 sj. Reinita, 28/2 1 ex.+1 sj. Pauxi, 2/3 1 sj., 3/3 1 ex.+1 sj. Arrierito, 4/3 1 ex. Colibri del Sol, 6/3 2 ex. Urrao–El Carmen.

Eared Dove *Zenaida auriculata* Noterad i måttliga antal under 9 dagar, främst i anslutning till städer.

Common Ground-Dove *Columbina passerina* 16/3 6 ex. Los Flamencos.

Ruddy Ground-Dove *Columbina talpacoti* Observerad med 1-40 ex. under 9 dagar.

Blue Ground-Dove *Claravis pretiosa* 12/3 1 ♂+4 sj., 15/3 1 sj. Minca.

Scaled Dove *Scardafella squammata* 16/3 ca 20 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi* 25/2 3 ex.+1 sj. San Gil, ca 10 ex. San Gil–Zapatoca, 27/2 5 ex. Reinita/Pauxi, 28/2 3 ex.+4 sj. Pauxi, 1/3 ca 20 ex. San Vicente/Medio Magdalena, 12/3 ca 20 ex.+ca 15 sj., 15/5 3 ex.+3 sj. Minca, 16/3 2 ex., 17/3 ca 20 ex. Los Flamencos, 3 ex. Santa Marta–Cienega.

Lined Quail-Dove *Geotrygon linearis* 26/2 1 ex.+2 sj. Reinita, 28/2 1 sj. Pauxi, 2/3 3 sj. Arrierito, 12/3 2 sj., 13/3 2 ex.+6 sj., 14/3 5 ex.+10 sj., 15/3 1 sj. El Dorado.

White-throated Quail-Dove *Geotrygon frenata* 7/3 3 sj., 8/3 2 sj. Las Tangaras.

PSITTACIDAE

Military Macaw *Ara militaris* (VU) 12/3 34 ex. Minca, 15/3 10 ex. El Dorado–Minca.

Yellow-eared Parrot *Ognorhynchus icterotis* (EN) 9/3 11-13 ex. Jardin.

Scarlet-fronted Parakeet *Aratinga wagleri* 9/3 3 ex. Rio Cauca, 10/3 ca 40 ex. Rio Blanco, 13/3 ca 10 ex., 14/3 ca 10 ex.+hörd El Dorado, 15/3 2 ex. Minca.

Brown-throated Parakeet *Aratinga pertinax* 16/3 ca 10 ex., 17/3 2 ex. Los Flamencos, 17/3 2 ex. Santa Marta–Cienega.

Santa Marta Parakeet *Pyrrhura viridicata* (EN) 13/3 ca 10 ex. El Dorado.

Flame-winged Parakeet *Pyrrhura calliptera* (VU) 23/2 ca 50 ex. Mundo Nuevo.

Barred Parakeet *Bolborhynchus lineola* 5/3 2 ex. Colibri del Sol.

Green-rumped Parrotlet *Forpus passerinus* 15/3 5 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 20 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

Spectacled Parrotlet *Forpus conspicillatus* 24/2 ca 20 ex., 25/2 5 ex. San Gil, 27/2 5 ex. Reinita, 28/2 ca 15 ex. Pauxi, 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 3/3 2 ex. Arrierito–Medellín, 4/3 2 ex. Medellín, 8/3 2 ex. Ciudad Bolivar–Jardin, 9/3 7 ex. Rio Cauca.

Orange-chinned Parakeet *Brotogeris jugularis* 27/2 hörd Reinita, 27/2 2 ex., 28/2 ca 10 ex., 1/3 hörd Pauxi, 12/3 ca 30 ex., 15/3 2 ex. Minca.

Saffron-headed Parrot *Pyrrhura pyrrhura* (nt) 27/2 15-20 ex. Pauxi.

Rusty-faced Parrot *Hapalopsittaca amazonina* (VU) 5/3 ca 10 hörda Colibri del Sol.

Blue-headed Parrot *Pionus menstruus* 27/2 3 ex., 28/2 11 ex. Pauxi, 12/3 ca 25 ex. Minca.

Red-billed Parrot *Pionus sordidus saturatus* 12/3 10 ex., 13/3 ca 10 ex., 14/3 4 ex.+hörd El Dorado.

White-capped Parrot *Pionus seniloides* 23/2 hörd Mundo Nuevo, 9/3 2 ex. Jardin, 10/3 6 ex. Rio Blanco.

Bronze-winged Parrot *Pionus chalcopterus* 3/3 5 ex. Arrierito–Medellín.

Orange-winged Amazon *Amazona amazonica* 9/3 1 ex. Rio Cauca.

Scaly-naped Amazon *Amazona mercenaria* 10/3 1 ex.+3 hörda Rio Blanco, 13/3 ca 50 ex., 14/3 4 ex. El Dorado.

CUCULIDAE

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* 25/2 2 ex.+1 hörd San Gil, 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi, 7/3 2 ex.+3 hörda, 8/3 3 ex. Las Tangaras, 12/3 1 ex., 15/3 1 ex. Minca, 17/3 1 ex.+1 hörd Los Flamencos.

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani* Sedd under 11 dagar med max. 50-100 ex. den 25/2.

Groove-billed Ani *Crotophaga sulcirostris* 16/3 ca 20 ex., 17/3 ca 10 ex. Los Flamencos.

American Striped Cuckoo *Tapera naevia* 25-27/2 1 sj., 27/2 1 ex. Reinita, 27-28/2 1 sj. Pauxi, 1/3 2 sj. Medio Magdalena, 2-3/2 1 sj. Arrierito, 3/3 1 sj. Arrierito–Medellín, 16/3 3 sj., 17/3 1 sj. Los Flamencos.

STRIGIDAE

Tropical Screech-Owl *Megascops choliba* 25-27/2 1 sj. Reinita, 1/3 2 sj. Arrierito.

Santa Marta Screech-Owl *Megascops sp. nov.* 13/3 1 sj., 14/3 5 sj. El Dorado.

Mottled Owl *Strix virgata* 1/3 1 sj. Arrierito, 14/3 1 sj. El Dorado.

Cloud-forest Pygmy-Owl *Glaucidium nubicola* (VU) 8/3 1 sj. Las Tangaras.

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium brasilianum* 11/3 1 sj., 12/3 1 sj., 15/3 1 sj. Minca, 17/3 1 sj. ♂+1 sj. Los Flamencos.

CAPRIMULGIDAE

Lesser/Common Nighthawk *Chordeiles acutipennis/minor* 17/3 1 ex. S Riohacha (NK).

Common Pauraque *Nyctidromus albigollis* 26/2 1 sj. Reinita, 28/2 1 sj. Pauxi, 7/3 1 ex., 8/3 1 ex.+1 sj. Las Tangaras.

Band-winged Nightjar *Caprimulgus longirostris* 10/3 1 sj. Rio Blanco, 13/3 1 ex. El Dorado.

Lyre-tailed Nightjar *Uropsalis lyra* 8/3 1 sj. Las Tangaras.

APODIDAE

Chestnut-collared Swift *Streptoprocne rutilus* 8/3 ca 30 ex., 9/3 2 ex. Jardin, 12/3 5 ex., 15/3 ca 20 ex. Minca.

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo–Bogotá, 25/2 ca 50 ex. längs med vägen, 1/3 ca 500 ex. Medio Magdalena, 3/3 ca 100 ex. Arrierito–Medellín, 4/3 ca 50 ex., 6/3 5 ex. Colibri del Sol, 7/3 ca 50 ex., 8/3 ca 20 ex. Las Tangaras, 9/3 ca 5 ex. Jardin, 10/3 ca 10 ex. Rio Blanco, 12/3 ca 10 ex., 15/3 ca 10 ex. Minca, 12/3 ca 10 ex. El Dorado.

Short-tailed Swift *Chaetura brachyura* 28/2 ca 20 ex. Pauxi, 1/3 5 ex. Puerto Berrio.

White-tipped Swift *Aeronautes montivagus* 25/2 ca 40 ex. Zapoteca–San Vicente, 26/2 2 ex. Reinita, 27/2 ca 50 ex., 28/2 2 ex. Pauxi, 15/3 2 ex. Minca (NK).

TROCHILIDAE

White-tipped Sicklebill *Eutoxeres aquila* 7/3 1 ex. Las Tangaras.

Hairy Hermit *Glaucis hirsuta* 28/2 1 ♀ Pauxi, 12/3 1 ex., 15/3 1 ex. Minca.

White-whiskered Hermit *Phaethornis yaruqui* 7/3 1 ex. Las Tangaras (NK).

Green Hermit *Phaethornis guy* 25/2 1 ex. Zapoteca–San Vicente, 26/2 3 ex., 27/2 2 ex. Reinita, 28/2 4 ex.+ 5 hörda Pauxi, 2/3 2 ex. Arrierito.

Tawny-bellied Hermit *Phaethornis syrmatophorus* 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Pale-bellied Hermit *Phaethornis anthophilus* 27-28/2 1 ex. Pauxi.

Sooty-capped Hermit *Phaethornis augusti curiosus* 12/3 1 ex., 14/3 2 ex. El Dorado.

Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae* 26/2 1 ex. Reinita, 7/3 2 ex. Las Tangaras.

Lazuline Sabrewing *Campylopterus falcatus* 12/3 1 ♂ Minca, 13-15/3 1 ♂ El Dorado.

White-necked Jacobin *Florisuga mellivora* 27/2-1/3 10-25 ex. dagligen Pauxi, 2-3/3 1 ♂ Arrierito, 12/3 ca 20 ex., 15/3 ca 10 ex. Minca.

Brown Violetear *Colibri delphinae* 27/2 2 ex., 28/2 ca 10 ex., 1/3 2 ex. Pauxi, 12-14/3 1 ex. El Dorado.

Green Violetear *Colibri thalassinus* 4-6/3 1-2 ex. dagligen Colibri del Sol, 12-15/3 max. 50 ex. dagligen El Dorado.

Sparkling Violetear *Colibri coruscans* 23/2 2 ex.+hörd La Florida, 24/2 1 ex. Laguna de Fúquene, 4-6/3 2-4 ex. dagligen Colibri del Sol, 13-14/3 1 ex. El Dorado.

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis* 25/2 2 ♂ San Gil, 5 ex. Zapoteca, 27/2 ca 5 ex., 28/2 4 ex. Pauxi, 2/3 1 ♂ Arrierito, 12/3 2 ♂, 1 ♀, 15/3 3 ex. Minca, 16/3 1 ♂ Los Flamencos.

Western Emerald *Chlorostilbon melanorhynchus* 2/3 1 ♀, 3/3 1 ♂ Arrierito.

Red-billed Emerald *Chlorostilbon gibsoni* 16/3 5 ex., 17/3 7 ex. Los Flamencos.

Coppery Emerald *Chlorostilbon russatus* 14/3 1 ♀ El Dorado.

Purple-crowned Woodnymph *Thalurania colombica* 26/2 ca 20 ex., 27/2 ca 7 ex. Reinita, 27/2 3 ex., 28/2 5 ex. Pauxi, 12-15/3 max. 30 ex. dagligen El Dorado.

Green-crowned Woodnymph *Thalurania fannyi* 2/3 ca 15 ex., 3/3 ca 10 ex. Arrierito.

Shining-green Hummingbird *Lepidopyga goudoti* 1/3 1 ♀ Medio Magdalena.

Buffy Hummingbird *Leucippus fallax* 16/3 2 ex., 17/3 3 ex. Los Flamencos.

Rufous-tailed Hummingbird *Amazilia tzacatl* Sedd under 13 dagar med max. 15-20 ex. vid Pauxi 28/2.

Chestnut-bellied Hummingbird *Amazilia castaneiventris* (EN) 27/2 1 ex. Reinita.

Andean Emerald *Amazilia franciae* 25/2 1 ex. Zapoteca, 26/2 2 ex., 27/2 2 ex. Reinita, 27-28/2 1 ex. Pauxi, 2-3/3 uppemot 50 ex. Arrierito, 7/3 2 ex., 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Steely-vented Hummingbird *Amazilia saucerottei* 2-3/3 uppemot 50 ex. Arrierito, 12/3 ca 30 ex., 13/3 ca 20 ex. Minca.

Indigo-capped Hummingbird *Amazilia cyanifrons* 24/2 10-15 ex. Barbosa–San Gil, 25/2 2 ex. San Gil, 26/2 3 ex., 27/2 ca 10 ex. Reinita, 27/2 2 ex., 28/2 3 ex. Pauxi.

Blossomcrown *Anthocephala floriceps floriceps* (VU) 12 och 14/3 1 ♂, 14/3 även 1 ♀ El Dorado.

White-vented Plumeleteer *Chalybura buffonii* 28/2 2 ♂ Pauxi, 12/3 10 ex., 15/3 5 ex. Minca.

Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys* 26/2 5 ex. Reinita, 6/3 2 ex. Urrao–El Carmen, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Fawn-breasted Brilliant *Heliodoxa rubinoides* 10/3 5 ex. Rio Blanco.

Empress Brilliant *Heliodoxa imperatrix* 7/3 7 ex. Las Tangaras.

Green-fronted Brilliant *Heliodoxa jacula* 26/2 ca 15 ex., 27/2 5 ex. Reinita, 27/2 2 ex., 28/2 1 ex. Pauxi, 2-3/3 ca 20 ex. Arrierito.

Rufous-gaped Hillstar *Urochroa bougueri bougueri* 7/3 1 ex., 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Buff-tailed Coronet *Boissonneaua flavescens* 26/2 2 ex. Reinita, 4/3 1 ex. Colibri del Sol, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 10/3 ca 40 ex. Rio Blanco.

Velvet-purple Coronet *Boissonneaua jardini* 7/3 5 ex. Las Tangaras.

Shining Sunbeam *Aglaeactis cupripennis* 11/3 ca 20 ex. Nevado del Ruiz.

Mountain Velvetbreast *Lafresnaya lafresnayi* 4/3 5-10 ex., 5/3 ca 20 ex., 6/3 ca 10 ex. Colibri del Sol (*lafresnayi?*), 13/3 3 ♀ El Dorado (*liriope*)

Bronzy Inca *Coeligena coeligena* 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Brown Inca *Coeligena wilsoni* 7/3 3 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Black Inca *Coeligena prunellei* (VU) 26/2 ca 20 ex., 27/2 1 ex. Reinita.

Collared Inca *Coeligena torquata* 4/3 ca 5 ex., 5/3 ca 10 ex., 6/3 5 ex. Colibri del Sol, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 9/3 4 ex. Jardin, 10/3 5 ex. Rio Blanco.

White-tailed Starfrontlet *Coeligena phalerata* 12/3 1 ♀, 13/3 1 ♂, 5 ♀, 14/3 1 ♀ El Dorado. Verkligen synd att inte alla fick se hanen, den tillhör definitivt världens läckraste kolibrier ...

Dusky Starfrontlet *Coeligena orina* (CR) 5/3 ca 10 ex. Colibri del Sol. Kanooooo!

Sword-billed Hummingbird *Ensifera ensifera* 5/3 4 ex., 6/3 1 ex. (HH) Colibri del Sol.

Great Sapphirewing *Pterophanes cyanopterus* 11/3 4 ex. Nevado del Ruiz.

Longuemare's Sunangel *Heliangelus (amethysticollis) clarisse* 23/2 ca 10 ex. Mundo Nuevo. Lumpas oftast med Amethyst-throated Sunangel.

Tourmaline Sunangel *Heliangelus exortis* 4-6/3 20-30 ex. dagligen Colibri del Sol, 9/3 5 ex. Jardin, 10/3 5 ex. Rio Blanco.

Glowing Puffleg *Eriocnemis vestitus* 23/2 4 ex. Mundo Nuevo (*vestitus*), 5/3 5 ex. Colibri del Sol (*paramillo*).

Black-thighed Puffleg *Eriocnemis derbyi* (nt) 11/3 1 ♂, 1 ♀ Nevado del Ruiz.

Coppery-bellied Puffleg *Eriocnemis cupreovertris* (nt) 23/2 2 ex. Mundo Nuevo.

Golden-breasted Puffleg *Eriocnemis mosquera* 11/3 3 ex. Nevado del Ruiz.

Greenish Puffleg *Haplophaedia aureliae* 2/3 3 ex. Arrierito, 7/3 6 ex. Las Tangaras.

Purple-bibbed Whitetip *Urosticte benjamini* 8/3 1 ♀ Las Tangaras.

Booted Racket-tail *Ocreatus underwoodii* 26/2 2 ♂, 27/2 1 ♀ Reinita, 3/3 1 ♂ Arrierito.

Purple-backed Thornbill *Ramphomicron microrhynchum* 5/3 2 ♂ Colibri del Sol, 11/3 1 juv. ♂ Nevado del Ruiz.

Black-backed Thornbill *Ramphomicron dorsale* (EN) 13/3 1 ♀ El Dorado. Få skådare har sett denna art, som är mycket oregelbunden på Cuchilla de San Lorenzo och nästan enbart rapporterats från regnperioden! Artens skyddsstatus kommer inom kort officiellt att ändras från Least concern till Endangered.

Bearded Helmetcrest *Oxygogon guerinii stubelii* 11/3 1 ♂ Nevado del Ruiz.

Tyrian Metaltail *Metallura tyrianthina* 23/2 5 ex. Mundo Nuevo, 5/3 1 ♀ Colibri del Sol, 10/3 1 ♀ Rio Blanco (*tyrianthina*), 12/3 2 ♂, 13/3 ca 15 ex., 14/3 1 ♂, 1 ♀ El Dorado (*districta*).

Viridian Metaltail *Metallura williami* 5/3 1 ♂-f. Colibri del Sol (*recisa*), 11/3 ca 10 ex. Nevado del Ruiz (*williami*).

Rainbow-bearded Thornbill *Chalcostigma herrani tolimae* 11/3 1 ♂, 2 ♀ Nevado del Ruiz.

Long-tailed Sylph *Agelaiocercus kingii* 4-6/3 4 ex. dagligen Colibri del Sol, 10/3 1 ♂ Rio Blanco.

Violet-tailed Sylph *Agelaiocercus coelestis* 7/3 ca 10 ex., 8/3 8 ex. Las Tangaras.

Long-billed Starthroat *Heliomaster longirostris* 28/2 1 ex. Pauxi, 15/3 1 ex. Minca.

White-bellied Woodstar *Chaetocercus mulsant* 24/2 1 ♀ Laguna de Fúquene, 3/3 1 ♀ Arrierito, 4-6/3 max. 20 ex. dagligen Colibri del Sol, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Santa Marta Woodstar *Chaetocercus astreans* 13/3 1 ♀ El Dorado (NK).

TROGONIDAE

Gartered Trogon *Trogon caligatus* 28/2 1 sj. Pauxi, 12/3 1 sj., 15/3 1 sj. Minca.

Collared Trogon *Trogon collaris* 26/2 2 ♀+5 sj. Reinita, 2/3 1 ♀, 3/3 3 ex. Arrierito.

Masked Trogon *Trogon personatus* 5/3 1 ♂, 6/3 1 ♂ Colibri del Sol, 7/3 1 8/3 1 ♂ Las Tangaras, 10/3 3 ♂, 1 ♀ Rio Blanco (*temperatus*), 13/3 1 ♀, 14/3 1 par El Dorado (*sanctaemartae*).

Golden-headed Quetzal *Pharomachrus auriceps* 7/3 1 ♂+2 sj., 8/3 2 sj. Las Tangaras, 9/3 2 sj. Jardin.

White-tipped Quetzal *Pharomachrus fulgidus festatus* 13/3 1 ♀+2 sj., 14/3 2 sj. El Dorado.

ALCEDINIDAE

Green Kingfisher *Chloroceryle americana* 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín (SH), 15/3 2 ex. Tayrona, 16/3 1 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona* 9/3 1 ex. Rio Cauca, 15/2 2 ex. Tayrona.

Ringed Kingfisher *Megaceryle torquatus* 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín, 15/3 2 ex. Tayrona, 17/3 1 ex. Riohacha–Santa Marta.

Belted Kingfisher *Megaceryle alcyon* 17/3 1-2 ex. Los Flamencos.

MOMOTIDAE

Whooping Motmot *Momotus subrufescens* 24/2 1 ex., 25/2 1 ex. San Gil, 12/3 3 ex.+2 sj. Minca.

Andean Motmot *Momotus aequatorialis* 2/3 2/3 1 ex., 3/3 1 ex. Arrierito, 7/3 2 ex. Las Tangaras.

GALBULIDAE

Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda* 12/3 3 ex.+1 sj. Minca, 16/3 2 ex.+5 sj., 17/3 1 ex.+1 sj. Los Flamencos.

BUCCONIDAE

Pied Puffbird *Notharcus tectus* 1/3 1 ex. Medio Magdalena.

Russet-throated Puffbird *Hypnelus ruficollis* 16/3 3 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Moustached Puffbird *Malacoptila mystacalis* 2/3 1 sj. Arrierito.

CAPITONIDAE

White-mantled Barbet *Capito hypoleucus* (EN) 26/2 1 sj. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi.

Red-headed Barbet *Eubucco bourcierii* 2/3 2 sj., 3/3 2 ex.+1 sj. Arrierito, 7/3 4 ex., 8/3 4 ex.+2 sj. Las Tangaras.

SEMORNITHIDAE

Toucan Barbet *Semnornis ramphastinus* (nt) 7/3 6 ex.+4 sj., 8/3 6 sj. Las Tangaras.

RAMPHASTIDAE

Santa Marta Toucanet *Aulacorhynchus (prasinus) lautus* 12/3 4 ex., 13/3 4 ex.+2 sj., 14/3 6 ex. El Dorado.

Plumbeous-throated Toucanet *Aulacorhynchus (p.) griseigularis* 10/3 3 ex. Rio Blanco. Splittad från Andean Toucanet *A. (p.) albivitta* i en färsk uppsats som åter bekräftar att *A. prasinus*-komplexet består av ett flera arter.

Yellow-billed Toucanet *Aulacorhynchus (sulcatus) calorhynchus* 12/3 2 ex., 14/3 1 ex. El Dorado.

Crimson-rumped Toucanet *Aulacorhynchus haematopygus* 26/2 7 sj. Reinita, 28/2 2 sj. Pauxi, 7/3 2 ex. Las Tangaras.

Black-billed Mountain-Toucan *Andigena nigrirostris* 23/2 3 ex.+2 hörda Mundo Nuevo, 5/3 3-4 ex., 6/3 2 ex. Colibri del Sol, 6/3 2 ex. Urrao–El Carmen, 9/3 3 ex.+1 hörd Jardin.

Collared Aracari *Pteroglossus torquatus* 27/2 4 ex., 28/2 3 ex., 1/3 1 ex. Pauxi.

Rainbow-billed Toucan *Ramphastos sulfuratus* 12/3 2 ex.+1 sj. Minca, 13/3 1 ex., 14/3 1 ex.+1 sj. El Dorado.

Citron-throated Toucan *Ramphastos (vitellinus) citreolaemus* 28/2 1 ex.+1 sj. Pauxi.

Chestnut-mandibled Toucan *Ramphastos (ambiguus) swainsonii* 27/2 1 sj., 28/2 4 sj. Pauxi.

PICIDAE

Scaled Piculet *Picumnus squamulatus* 15/3 2 ex. Minca.

Olivaceous Piculet *Picumnus olivaceus* 24/2 1 sj., 25/2 2 ex.+1 sj. San Gil, 27/2 1 ex.+1 sj., 28/2 1 ex.+2 sj. Pauxi.

Chestnut Piculet *Picumnus cinnamomeus* 17/3 2 ex. Los Flamencos.

Acorn Woodpecker *Melanerpes formicivorus* 4/3 2 ex. Medellín–Concordia, 6/3 1 ex. Colibri del Sol.

Red-crowned Woodpecker *Melanerpes rubricapillus* Sedd under 11 dagar med max 10 ex. den 25/2.

Smoky-brown Woodpecker *Picoides fumigatus* 24/2 1 ♀ Laguna de Fúquene, 26/2 1 ex. Reinita, 7/3 1 ex., 8/3 1 ex. Las Tangaras, 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Red-rumped Woodpecker *Veniliornis kirkii* 27/2 1 ex. Pauxi.

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus* 28/2 1 ex. Pauxi, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 2 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Crimson-mantled Woodpecker *Colaptes rivolii* 10/3 4 ex. Rio Blanco.

Spot-breasted Woodpecker *Colaptes punctigula* 25/2 1 ex. San Gil, 28/1 1 ex. Pauxi, 1/3 1 ex. Medio Magdalena.

Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus* 27/2 2 ex. Reinita, 28/2 4 ex., 1/3 4 ex. Pauxi, 12/3 2 ex. Minca.

Powerful Woodpecker *Campephilus pollens* 23/2 1 trummande Mundo Nuevo, 26/2 1 trummande Reinita, 9/2 1 par Jardin, 10/3 1 par Rio Blanco.

Crimson-crested Woodpecker *Campephilus melanoleucos* 12/3 3 ex. Minca.

FURNARIIDAE

Gray-throated Leaf-tosser *Sclerurus albigularis propinquus* 13/3 1 ex. El Dorado (SH).

Stout-billed Cinclodes *Cinclodes excelsior* 11/3 7 ex. Nevado del Ruiz.

Caribbean Hornero *Furnarius (leucopus) longirostris* 15/3 1 ex. Tayrona (EJ, NK), 16/3 5 ex.+6 sj., 17/3 4 ex.+2 sj. Los Flamencos.

Andean Tit-Spinetail *Leptasthenura andicola* 11/3 2 ex. Nevado del Ruiz.

Silvery-throated Spinetail *Synallaxis subpudica* 23/2 2 ex. La Florida, 24/2 6 ex. Laguna de Fúquene.

Azara's Spinetail *Synallaxis azarae* 2/3 1 ex.+2 sj., 3/3 2 ex.+3 sj. Arrierito, 5/3 4 sj., 6/3 3 sj. Colibri del Sol, 7/3 5 ex.+10 sj., 8/3 3 sj. Las Tangaras, 9/3 5 sj. Jardin, 10/3 3 sj. Rio Blanco.

Pale-breasted Spinetail *Synallaxis albescens* 26/2 5 sj., 27/2 2 ex.+5 sj. Reinita, 27/2 1 sj., 28/2 2 sj., 1/3 1 sj. Pauxi, 1/3 1 sj. Medio Magdalena, 2/3 1 sj., 3/3 5 sj. Arrierito.

Rufous Spinetail *Synallaxis unirufa* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 5/3 1 ex. Colibri del Sol, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Rusty-headed Spinetail *Synallaxis fuscorufa* (VU) 13/3 7 ex.+2 sj., 14/3 1 sj. El Dorado.

Slaty Spinetail *Synallaxis brachyura* 27/3 1 sj. ♂ Reinita, 2/3 1 sj. Arrierito.

White-whiskered Spinetail *Synallaxis candei candei* 16/3 ca 10 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

White-browed Spinetail *Hellmayrea gularis* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo.

Red-faced Spinetail *Cranioleuca erythrops* 3/3 2 ex. Arrierito, 7/3 1 ex., 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Streak-capped Spinetail *Cranioleuca hellmayri* 13/3 3 ex., 14/3 2 ex. El Dorado.

Yellow-chinned Spinetail *Certhiaxis cinnamomea* 1/3 3 ex. Medio Magdalena.

White-chinned Thistletail *Asthenes fuliginosa* 11/3 1 ex. Nevado del Ruiz. Placeringen i *Asthenes* känns tveksam, men SACC röstade nyligen igenom ändringen.

Star-chested Treerunner *Margarornis stellatus* (nt) 7/3 2 ex. Las Tangaras.

Pearled Treerunner *Margarornis squamiger* 23/2 3 ex. Mundo Nuevo, 6/3 2 ex. Colibri del Sol, 9/3 3 ex. Jardin, 10/3 5 ex. Rio Blanco, 11/3 2 ex. Nevado del Ruiz.

Pacific Tuftedcheek *Pseudocolaptes johnsoni* 7/3 2 ex. Las Tangaras.

Streaked Tuftedcheek *Pseudocolaptes boissonneautii* 26/2 1 ex. Reinita, 5/3 1 ex., 6/3 2 ex. Colibri del Sol, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Scaly-throated Foliage-gleaner *Anabacerthia variegaticeps* 7/3 1 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Montane Foliage-gleaner *Anabacerthia striaticollis* 26/2 6 ex. Reinita, 10/3 2 ex. Rio Blanco, 13/3 7 ex., 14/3 5 ex. El Dorado.

Lineated Foliage-gleaner *Syndactyla subalaris* 26/2 1 sj. Reinita, 2/3 2 sj. Arrierito, 7/3 1 sj., 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Buff-fronted Foliage-gleaner *Philydor rufum* 2/3 2 ex.+1 sj., 3/3 4 ex. Arrierito, 7/3 5 ex., 8/3 4 ex. Las Tangaras.

Uniform Treehunter *Thripadectes ignobilis* 7/3 1 ex. Las Tangaras.

Streak-capped Treehunter *Thripadectes virgaticeps* 2/3 1 ex. Arrierito.

Santa Marta Foliage-gleaner *Automolus rufipectus* (nt) 14/3 1 ex. (JJ, OE), 15/3 1 hörd El Dorado.

Plain Xenops *Xenops minutus* 27/2 1 ex. Pauxi, 3/3 1 ex. Arrierito.

Streaked Xenops *Xenops rutilans* 10/3 2 ex. Rio Blanco (*heterurus*), 14/3 4 ex. El Dorado (*phelpsi*).

Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus* 26/2 2 ex. Reinita, 3/3 1 ex. Arrierito, 9/3 1 ex. Rio Cauca.

Wedge-billed Woodcreeper *Glyphorhynchus spirurus* 28/2 1 ex. Pauxi, 2/3 1 ex. Arrierito.

Strong-billed Woodcreeper *Xiphocolaptes promeropirhynchus* 23/2 2 ex.+2 sj. Mundo Nuevo (*promeropirhynchus*), 12/3 1 sj., 13/3 1 ex. (SH) +2 sj. El Dorado (*sanctaemartae*).

Straight-billed Woodcreeper *Dendroplex picus* 25/2 1 ex. San Gil, 2 ex. San Gil–Zapoteca, 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 12/3 1 sj. Minca, 16/3 2 ex.+2 sj., 17/3 2 ex. Los Flamencos, 17/3 1 ex.+1 sj. Santa Marta–Ciénaga.

Cocoa Woodcreeper *Xiphorhynchus susurrans* 28/2 4 sj., 1/3 2 sj. Pauxi, 12/3 1 ex.+2 sj. Minca.

Olive-backed Woodcreeper *Xiphorhynchus triangularis* 3/3 1 ex. Arrierito.

Montane Woodcreeper *Lepidocolaptes lachrymiger* 6/3 1 ex. Colibri del Sol, 10/3 4 ex. Rio Blanco (*sneiderni*), 13/3 4 ex., 14/4 2 ex. El Dorado (*sanctaemartae*).

Streak-headed Woodcreeper *Lepidocolaptes souleyetii* 27/2 2 sj. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi, 7/3 2 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. Rio Cauca, 12/3 1 ex.+1 sj. Minca.

Brown-billed Scythebill *Campylorhamphus pusillus* 26/2 5 ex. Reinita.

THAMNOPHILIDAE

Black-crested Antshrike *Sakesphorus canadensis pulchellus* 16/3 ca 10 ex., 17/3 ca 10 ex. Los Flamencos, 17/3 1 ex. Santa Marta–Ciénega.

Black-backed Antshrike *Thamnophilus melanonotus* 12/3 2 ♂, 4 ♀ Minca.

Bar-crested Antshrike *Thamnophilus multistriatus* 25/2 4 ex.+1 sj. San Gil, 1 ex. San Gil–Zapoteca, 27/2 2 sj. Reinita, 28/2 1 par, 1/3 1 sj. Pauxi.

Uniform Antshrike *Thamnophilus unicolor* 26/2 1 par+1 sj. Reinita, 2/3 1 par+1 sj. Arrierito.

Western Slaty-Antshrike *Thamnophilus atrinuchus* 8/3 1 ♂ Las Tangaras, 15/3 1 par Minca.

Recurve-billed Bushbird *Clytoctantes alixii* (EN) 26/2 1 sj. Reinita.

Plain Antvireo *Dysithamnus mentalis* 24/2 4 ex., 25/2 3 ex. San Gil, 28/2 1 ♂ Pauxi, 2/3 2 ♀, 3/3 1 ♀ Arrierito.

Slaty Antwren *Myrmotherula schisticolor* 26/2 1 par Reinita (OE), 2/3 1 ♂ Arrierito, 13/3 1 ♂, 14/3 1 par El Dorado.

Northern White-fringed Antwren *Formicivora (grisea) intermedia* 25/2 1 ♂ San Gil, 1 ♂ San Gil–Zapoteca, 12/3 1 par Minca, 16/3 ca 20 ex., 17/3 ca 10 ex. Los Flamencos.

Long-tailed Antbird *Drymophila caudata* 14/3 1 ex. El Dorado.

Rufous-rumped Antwren *Terenura callinota* 8/3 3 ex. Las Tangaras.

Dusky Antbird *Cercomacra tyrannina* 28/2 1 par+1 sj. Pauxi.

Parker's Antbird *Cercomacra parkeri* 26/2 1 par Reinita, 2/3 1 par+2 sj., 3/3 1 hörd Arrierito.

Magdalena Antbird *Myrmeciza (laemosticta?) palliata* 28/2 4 ex. Pauxi. En splitt är på gång; av allt att döma är Esmeraldas Antbird *M. nigricauda* systerart till detta taxon, inte Dull-mantled Antbird *M. laemosticta*!

Immaculate Antbird *Myrmeciza immaculata* 7/3 1 par Las Tangaras.

FORMICARIIDAE

Black-faced Antthrush *Formicarius analis* 28/2-1/3 1 sj. Pauxi.

Rufous-breasted Antthrush *Formicarius rufipectus* 7/3 1 sj. Las Tangaras.

GRALLARIIDAE

Tawny Antpitta *Grallaria quitensis* 11/3 2 sj. Nevado del Ruiz.

Brown-banded Antpitta *Grallaria milleri* (EN) 10/3 2 ex.+1 sj. Rio Blanco.

Urrao Antpitta *Grallaria urraoensis* (CR) 5/3 2 ex. Colibri del Sol. Det mesta i denna "såpopera" har nu blivit klarlagt, och jag tvekar inte att ta ställning för Urrao Antpitta och mot Fenwick's Antpitta.

Bicolored Antpitta *Grallaria rufocinerea* (VU) 10/3 1 ex.+4 sj. Rio Blanco.

Santa Marta Antpitta *Grallaria bangsi* (VU) 12/3 1 ex., 13/3 2 ex.+2 sj., 14/3 1 sj. ♂ El Dorado.

White-bellied Antpitta *Grallaria hypoleuca* 26/2 5 sj. Reinita.

Yellow-breasted Antpitta *Grallaria flavotincta* 7/3 1 ex.+3 sj., 8/3 3 sj. Las Tangaras.

Chestnut-naped Antpitta *Grallaria nuchalis* 5/3 2 sj., 6/3 1 sj. Colibri del Sol, 9/3 3 sj. Jardin, 10/3 2 sj. Rio Blanco.

Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla* 23/2 3 sj. Mundo Nuevo, 6/3 1 sj. Urroo-El Carmen, 10/3 2 ex.+4 sj. Rio Blanco.

Rufous Antpitta *Grallaria rufula* 23/3 4 sj. Mundo Nuevo, 11/3 4 sj. Nevado del Ruiz. Rufous Antpitta består säkerligen av ett helt komplex av arter. Fåglarna i östra Anderna tillhör nominatrasen *rufula*, och hit förs traditionellt även populationerna från centrala och västra Anderna samt Ecuador. Sången hos fåglarna i östra Anderna är dock totalt annorlunda, något som vi själva kunde konstatera, så förmodligen måste en "ny" art beskrivas vad det lider.

Santa Marta Rufous Antpitta *Grallaria (r.) spatiator* 13/3 1 ex.+1 sj. El Dorado. Denna form av Rufous Antpitta är så distinkt att det måste vara en separat art.

Ochre-breasted Antpitta *Grallaricula flavirostris* 2/3 1 ex. Arrierito.

Rusty-breasted Antpitta *Grallaricula ferrugineipectus* 12/3 1 sj., 14/3 2 sj. El Dorado.

Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana* 9/3 1 sj. Jardin.

RHINOCRYPTIDAE

Ocellated Tapaculo *Acropternis orthonyx* 9/3 3 sj. Jardin, 10/3 3 sj. Rio Blanco.

White-crowned Tapaculo *Scytalopus atratus* 26/2 1 ex.+2 sj. Reinita, 2/3 1 ex.+10 sj., 3/3 5 sj. Arrierito.

Santa Marta Tapaculo *Scytalopus sanctaemartae* 12/3 1 sj. ♂, 14/3 2 ex. El Dorado.

Nariño Tapaculo *Scytalopus vicini* 7/3 3 ex.+5 sj., 8/3 1 sj. Las Tangaras.

Stiles's Tapaculo *Scytalopus stilesi* 3/3 2 sj. Arrierito.

Alto Pisones Tapaculo *Scytalopus sp. nov.* 7/3 3 ex.+3 sj., 8/3 2 ex.+5 sj. Las Tangaras.

Brown-rumped Tapaculo *Scytalopus latebricola* 13/3 5 sj. El Dorado.

Spillmann's Tapaculo *Scytalopus spillmanni* 5/3 2 sj., 6/3 2 sj. Colibri del Sol, 9/3 5 sj. Jardin, 10/3 5 sj. Rio Blanco.

Magdalena Tapaculo *Scytalopus rodriguezi* (EN) 26/2 1 sj. ♂+1 sj. Reinita.

Matorral Tapaculo *Scytalopus griseicollis* 23/2 1 sj. ♂+4 sj. Mundo Nuevo.

Paramillo Tapaculo *Scytalopus canus* (EN) 5/3 3 sj. Colibri del Sol.

Páramo Tapaculo *Scytalopus opacus* 11/3 1 ♀, 1 pull +3 sj. Nevado del Ruiz.

Blackish Tapaculo *Scytalopus latrans* 5/3 1 sj. Colibri del Sol, 9/3 1 sj. Jardin, 10/3 3 sj. Rio Blanco.

Ash-colored Tapaculo *Myornis senilis* 10/3 2 ex.+3 sj. Rio Blanco.

TYRANNIDAE

Black-capped Tyrannulet *Phyllomyias nigrocapillus* 26/2 1 ex. Reinita, 9/3 1 ex. Jardin (*nigrocapillus*), 13/3 1 ex. El Dorado (*flavimentum*).

Yellow-crowned Tyrannulet *Tyrannulus elatus* 27/2 2 sj., 28/2 1 ex.+1 sj., 1/3 2 sj. Pauxi.

Forest Elaenia *Myiopagis gaimardii* 12/3 3 ex.+1 sj. Minca.

Greenish Elaenia *Myiopagis viridicata* 12/3 2 ex. Minca.

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster* 24/2 1 ex.+1 sj., 25/2 1 ex.+ca 10 sj. San Gil, 26/2 3 ex.+4 sj., 27/2 2 ex.+3 sj. Reinita, 27/2 2 sj., 28/2 5 ex.+2 sj. Pauxi, 1/3 några ex.+5 sj. Medio Magdalena, 3/3 2 ex.+2 sj. Arrierito, 7/3 1 ex. Las Tangaras, 12/3 3 ex.+2 sj., 15/3 1 ex.+1 sj. Minca.

Mountain Elaenia *Elaenia frantzii* 6/3 1 ex. Colibri del Sol, 1 ex. Urrao–El Carmen, 13/3 4 ex., 14/3 2 ex.+1 sj. El Dorado.

Southern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma obsoletum* 25/2 1 ex.+1 sj. San Gil, 12/3 4 ex.+2 sj. Minca.

White-banded Tyrannulet *Mecocerculus stictopterus* 23/2 5 ex. Mundo Nuevo, 5/3 4 ex. Colibri del Sol.

White-throated Tyrannulet *Mecocerculus leucophrys* 23/2 ca 10 ex. Mundo Nuevo, 24/2 2 ex. Laguna de Fúquene, 5/3 ca 10 ex. Colibri del Sol, 9/3 2 ex. Jardin, 10/3 2 ex. Rio Blanco, 11/3 10 ex. Nevado del Ruiz, 13/3 2 ex. El Dorado.

Torrent Tyrannulet *Serpophaga cinerea* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo, 6/3 4 ex. Colibri del Sol, 8/3 1 ex. El Carmen (SH).

Yellow Tyrannulet *Capsiempis flaveola* 12/3 1 ex. Minca.

Bronze-olive Pygmy-Tyrant *Pseudotriccus pelzelni* 7/3 2 ex.+1 hörd Las Tangaras.

Rufous-headed Pygmy-Tyrant *Pseudotriccus ruficeps* 9/3 1 ex. Jardin.

Golden-faced Tyrannulet *Zimmerius chrysops* Sedd eller hörd med 1-9 ex. under 12 dagar i centrala Colombia, dessutom 1 ex. vid Minca 12/3.

Rufous-browed Tyrannulet *Phylloscartes superciliaris* 26/2 2 ex. Reinita, 2/3 1 ex. Arrierito.

Marble-faced Bristle-Tyrant *Phylloscartes opthalmicus* 26/2 1 ex. Reinita (NK).

Slaty-capped Flycatcher *Leptopogon superciliaris* 26/2 3 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi, 2/3 3 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Rufous-breasted Flycatcher *Leptopogon rufipectus* 6/3 3 ex.+1 hörd Colibri del Sol, 10/3 3 ex.+1 hörd Rio Blanco.

Streak-necked Flycatcher *Mionectes striaticollis* 26/2 3 ex. Reinita, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Olive-striped Flycatcher *Mionectes olivaceus galbinus* 13/3 1 ex., 14/3 3 ex. El Dorado.

Ochre-bellied Flycatcher *Mionectes oleagineus* 28/2 1 ex. Pauxi, 12/3 1 ex., 15/3 2 ex. Minca.

Northern Scrub-Flycatcher *Sublegatus arenarum* 16/3 3 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

Slender-billed Tyrannulet *Inezia tenuirostris* 16/3 ca 10 ex.+6 sj., 17/3 2 ex. Los Flamencos.

Ornate Flycatcher *Myiobrycon ornatus* 26/2 1 ex. Reinita, 2/3 4 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 7/3 6 ex., 8/3 4 ex. Las Tangaras.

Southern Bentbill *Oncostoma olivaceum* 28/2 1 ex. Pauxi

Scale-crested Pygmy-Tyrant *Lophotriccus pileatus* 26/2 ca 10 sj. Reinita, 2/3 1 ex.+5 sj., 3/3 2 ex.+1 sj. Arrierito, 8/3 5 sj. Las Tangaras.

Pale-eyed Pygmy-Tyrant *Atalotriccus pilaris* 12/3 5 ex.+1 sj., 15/3 3 ex. Minca, 16/3 2 ex. Los Flamencos.

Pearly-vented Tody-Tyrant *Hemitriccus margaritaceiventer* 25/2 1 ex. San Gil–Zapoteca, 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Black-throated Tody-Tyrant *Hemitriccus granadensis* 6/3 2 ex. Urrao–El Carmen, 13/3 2 ex., 14/3 3 ex.+1 sj. El Dorado.

Rufous-crowned Tody-Flycatcher *Poecilatriccus ruficeps* 9/3 1 ex. Jardin, 10/3 2 ex.+3 hörda Rio Blanco.

Slate-headed Tody-Flycatcher *Poecilatriccus sylvia* 28/2-1/3 1 ex. Pauxi.

Common Tody-Flycatcher *Todirostrum cinereum* 26/2 1 ex., 27/2 2 ex. Reinita, 27/2 1 ex., 28/2 5 ex. Pauxi, 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 3/3 1 ex. Arrierito, 1 ex. Arrierito–Medellín, 8/3 1 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. Rio Cauca.

Yellow-olive Flatbill *Tolmomyias sulphurescens* 25/2 1 ex. San Gil, 26/2 1 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 3 ex. Pauxi, 9/3 2 ex. Rio Cauca, 12/3 1 ex., 15/3 1 ex. Minca.

Ochre-lore Flatbill *Tolmomyias flaviventris* 17/3 2 ex. Los Flamencos.

White-throated Spadebill *Platyrrhynchus mystaceus* 2/3 1 ex. Arrierito.

Yellow-throated Spadebill *Platyrrhynchus flavigularis* 26/2 1 ex.+1 hörd Reinita. Yes! Som regel en sällsynt och svårsedd art!

Northern Royal-Flycatcher *Onychorhynchus (coronatus) mexicanus* 15/3 2 ex. Minca.

Flavescent Flycatcher *Myiophobus flavicans* 10/3 3 ex. Rio Blanco.

Bran-colored Flycatcher *Myiophobus fasciatus* 27/2 2 ex. Reinita, 28/1 ex. Pauxi.

Handsome Flycatcher *Nephelomyias pulcher pulcher* 7/3 3 ex., 8/3 4 ex. Las Tangaras.

Black-tailed Flycatcher *Myiobius atricaudus* 3/3 1 ex. Arrierito (NK).

Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias cinnamomea* 26/2 5 ex. Reinita, 2/3 1 ex. Arrierito, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 5 ex., 8/3 8 ex. Las Tangaras, 10/3 ca 10 ex. Rio Blanco (*pyrrhopterus*), 13/3 2 ex., 14/3 8 ex. El Dorado (*assimilis*).

Fuscous Flycatcher *Cnemotriccus fuscatus cabanisi* 12/3 1 ex. Minca.

Acadian Flycatcher *Empidonax virescens* 24/2 1 ex. San Gil, 28/2 2 ex. Pauxi.

Smoke-colored Pewee *Contopus fumigatus* 7/3 1 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. Jardín.

Eastern/Western Wood-Pewee *Contopus virens/sordidulus* 26/2 2 ex., 27/2 ca 10 ex. Reinita, 2/3 1 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 7/3 2 ex. Las Tangaras. Utan att höra något läte är det mycket svårt att säkert bestämma wood-pewees i Sydamerika. Min gissning är dock att de flesta av fåglarna vi såg var Eastern Wood-Pewees.

Black Phoebe *Sayornis nigricans* 24/3 2 ex., 25/3 3 ex. San Gil, 28/2 2 ex. Pauxi, 1/3 2 ex., 4/3 1 ex. längs med vägen, 4/3 1 ex., 6/3 3 ex. Colibri del Sol, 7/3 3 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. längs med vägen.

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus* 25/2 3 ex. San Gil–Zapoteca, 26/2 1 ♂ Reinita, 27/2 ca 10 ex. Reinita/Pauxi, 4/3 1 ♂ längs med vägen, 16/3 6 ex., 17/3 1 ♀ Los Flamencos.

Yellow-bellied Chat-Tyrant *Ochthoeca diadema* 10/3 1 ex. Rio Blanco (*gratiosa*), 13/3 1 ex. El Dorado (NK – *jesupi*).

Slaty-backed Chat-Tyrant *Ochthoeca cinnamomeiventris* 4/3 1 ex., 6/3 2 sj. Colibri del Sol, 10/3 2 ex.+3 sj. Rio Blanco.

Rufous-breasted Chat-Tyrant *Ochthoeca rufipectoralis* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 5/3 3 ex., 6/3 1 ex. Colibri del Sol.

Brown-backed Chat-Tyrant *Ochthoeca fumicolor* 23/2 4 ex. Mundo Nuevo, 11/3 3 ex. Nevado del Ruiz.

Pied Water-Tyrant *Fluvicola pica* 16/3 2 ex. Los Flamencos.

White-headed Marsh-Tyrant *Arundinicola leucocephala* 1/3 1 par Medio Magdalena.

Streak-throated Bush-Tyrant *Myiotheretes striaticollis* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo–Bogotá, 9/3 2 ex. Jardín.

Santa Marta Bush-Tyrant *Myiotheretes pernix* (EN) 13/3 1 ex. El Dorado.

Smoky Bush-Tyrant *Myiotheretes fumigatus* 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus* 27/2 3 ex. Pauxi, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín.

Cattle Tyrant *Machetornis rixosus* 25/2 1 ex. San Gil, 27/2 2 ex. Reinita, 1/3 5 ex. Medio Magdalena, 4/3 2 ex. längs med vägen, 8/3 2 ex. Jardín, 12/3 1 ex. Minca, 15/3 2 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 3 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Piratic Flycatcher *Legatus leucophaeus* 28/2 1 ex.+4 sj. Pauxi, 1/3 2 ex.+3 sj. Medio Magdalena, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín, 12/3 1 ex.+2 sj., 15/3 2 ex. Minca.

Rusty-margined Flycatcher *Myiozetetes cayanensis* Sedd i smärre antal under 10 dagar.

Social Flycatcher *Myiozetetes similis* 12/3 5 ex., 15/3 2 ex. Minca.

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus* Sedd i smärre antal under 12 dagar.

Golden-crowned Flycatcher *Myiodynastes chrysocephalus* 3/3 1 ex. Arrierito, 4/3 1 ex. Colibri del Sol, 7/3 2 ex., 8/3 1 ex.+1 hörd Las Tangaras, 10/3 1 ex. Rio Blanco (*chrysocephalus*), 13/3 2 ex. El Dorado (*cinerascens*).

Streaked Flycatcher *Myiodynastes maculatus* 24/2 3 ex. San Gil, 12/3 5 ex., 15/3 3 ex. Minca.

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua* 28/2 1 sj., 1/3 1 sj. Pauxi, 12/3 3 ex.+1 sj. Minca.

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän, sedd under 20 dagar.

Gray Kingbird *Tyrannus dominicensis* 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 15/3 5 ex. Riohacha, 16/3 3 ex., 17/3 2 ex. Los Flamencos, 17/3 1 ex. Santa Marta–Ciénega.

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana* 1/3 ca 20 ex. Medio Magdalena, 3/3 2 ex. Arrierito–Medellín, 4/3 1 ex., 6/3 2 ex. nära Urrao, 8/3 1 ex. Ciudad Bolivar–Jardin, 17/3 2 ex. Riohacha–Santa Marta.

Dusky-capped Flycatcher *Myiarchus tuberculifer* 27/2 2 ex. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi, 2/3 2 ex.+3 sj., 3/3 1 ex. Arrierito, 7/3 1 ex., 8/3 1 sj. Las Tangaras, 12/3 1 ex., 15/3 2 ex. Minca, 14/3 1 sj. El Dorado.

Apical Flycatcher *Myiarchus apicalis* 25/2 2 ex. San Gil, 2 ex. San Gil–Zapoteca.

Pale-edged Flycatcher *Myiarchus cephalotes* 3/3 2 ex. Arrierito, 10/3 3 ex. Rio Blanco.

Great Crested Flycatcher *Myiarchus crinitus* 12/3 1 ex. Minca.

Brown-crested Flycatcher *Myiarchus tyrannulus* 12/3 2 ex. Minca, 16/3 ca 10 ex., 17/3 5 ex. Los Flamencos.

Bright-rumped Attila *Attila spadiceus* 28/2 2 sj. Pauxi.

COTINGIDAE

Red-crested Cotinga *Ampelion rubrocristatus* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 5/3 2 ex. Colibri del Sol, 9/3 1 ex. Jardin, 10/3 1 ex. Rio Blanco, 11/3 2 ex. Nevado del Ruiz.

Green-and-black Fruiteater *Pipreola riefferii* 6/3 1 ♂ Colibri del Sol (HH), 1 ♂ Urrao–El Carmen, 7/3 1 ♂ +1 sj. Las Tangaras, 9/3 2 ex.+5 sj. Jardin, 10/3 1 ex.+5 sj. Rio Blanco.

Barred Fruiteater *Pipreola arcuata* 23/2 1 ♀+1 hörd Mundo Nuevo, 9/3 1 par Jardin, 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Golden-breasted Fruiteater *Pipreola aureopectus decora* 13/3 4 ex.+6 sj., 14/3 6 ex.+10 sj., 15/3 1 sj. El Dorado.

Orange-breasted Fruiteater *Pipreola jucunda* 8/3 1 ♂ Las Tangaras.

Olivaceous Piha *Snowornis cryptolophus* 7/3 3 ex., 8/3 3 ex. Las Tangaras.

Dusky Piha *Lipaugus fuscocinereus* 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Chestnut-capped Piha *Lipaugus weberi* (EN) 2/3 2 ex. Arrierito.

PIPRIDAE

Golden-winged Manakin *Masicus chrysopterus* 26/2 2 ♂, 1 ♀ Reinita, 2/3 3 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 8/3 1 ♂, 1 ♀ Las Tangaras.

Golden-collared Manakin *Manacus vitellinus* 9/3 2 ♂, 1 ♀ Rio Cauca.

White-bearded Manakin *Manacus manacus* 27/2 2 hörda, 28/2 2 hörda Pauxi, 12/3 2 hörda, 15/3 1 ♂, 1 ♀ Minca.

Western Striped Manakin *Machaeropterus (regulus) striolatus* 28/2 2 ♂, 1 ♀ Pauxi.

Club-winged Manakin *Machaeropterus deliciosus* 8/3 3 ♂, 2 ♀+1 hörd Las Tangaras.

TITYRIDAE

Masked Tityra *Tityra semifasciata* 28/2 5 ex. Pauxi, 15/3 1 par Minca.

Barred Becard *Pachyramphus versicolor* 7/3 1 ♂, 2 ♀ Las Tangaras, 10/3 2 sj. Rio Blanco.

Cinereous Becard *Pachyramphus rufus* 1/3 1 ♂ Medio Magdalena.

Cinnamon Becard *Pachyramphus cinnamomeus* 27/2 2 ex.+2 sj., 28/2 3 sj., 1/3 1 ex.+2 sj. Pauxi, 12/3 2 ex.+2 sj., 15/3 1 ex. Minca.

White-winged Becard *Pachyramphus polychopterus* 26/2 1 sj. Reinita (SH), 1/3 1 sj. Medio Magdalena, 2/3 1 ♂, 3/3 2 sj. Arrierito, 8/3 1 ♂ Las Tangaras.

Black-and-white Becard *Pachyramphus albogriseus coronatus* 14/3 1 ♂ El Dorado.

Slender-billed Schiffornis *Schiffornis (turdina) stenorhyncha* 2/3 1 sj. Arrierito. Thrush-like Schiffornis kan komma att splittas i ca 5 arter.

VIREONIDAE

Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis* 24/2 2 ex.+1 sj., 25/2 1 sj. San Gil, 27/2 2 sj., 28/2 2 ex.+3 sj., 1/3 1 sj. Pauxi, 12/3 1 ex. Minca.

Black-billed Peppershrike *Cyclarhis nigrirostris* 7/3 1 ex.+2 sj., 8/3 1 ex. Las Tangaras, 10/3 2 sj. Rio Blanco.

Yellow-browed Shrike-Vireo *Vireolanius eximius* 28/2 4 sj. (1 skymtad) Pauxi.

Yellow-throated Vireo *Vireo flavifrons* 27/2 1 ex. Reinita.

Chocó Vireo *Vireo masteri* (EN) 7/3 2 ex., 8/3 1 sj. Las Tangaras. En av få lokaler där arten är vanlig som dessutom är lättåtkomlig!

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys* 6/3 2 ex. Urrao–El Carmen, 10/3 1 ex. Rio Blanco, 13/3 2 ex., 14/3 3 ex. El Dorado.

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus* 12/3 4 ex. Minca.

Black-whiskered Vireo *Vireo altiloquus* 12/3 1 ex. Minca.

Rufous-naped Greenlet *Hylophilus semibrunneus* 26/2 4 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi, 2/3 2 sj., 3/3 1 ex. Arrierito.

Golden-fronted Greenlet *Hylophilus aurantiifrons* 12/3 2 ex., 15/3 1 ex. Minca.

Scrub Greenlet *Hylophilus flavipes* 24/2 1 ex., 25/2 2 ex.+1 sj. San Gil, 28/2 2 sj. Pauxi, 12/3 3 sj., 15/3 2 sj. Minca, 16/3 8 ex.+2 sj., 17/3 2 ex.+1 sj. Los Flamencos.

CORVIDAE

Black-collared Jay *Cyanolyca armillata* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Beautiful Jay *Cyanolyca pulchra* (nt) 8/3 1 hörd Las Tangaras.

Black-chested Jay *Cyanocorax affinis* 1/3 4 ex. Medio Magdalena, 9/3 2 ex. Valle de Cauca (SH), 12/3 12 ex., 13/3 3 ex., 14/3 ca 10 ex., 15/3 5 ex. El Dorado.

Inca Jay *Cyanocorax yncas* 26/2 3 hörda Reinita, 3/3 6 ex. Arrierito, 4-6/3 4-5 ex. dagligen Colibri del Sol.

HIRUNDINIDAE

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca* Tämligen allmän–allmän i centrala Colombia, sedd under 15 dagar.

Brown-bellied Swallow *Orochelidon murina* 23/2 ca 50 ex. Mundo Nuevo, 24/2 100-tals Laguna de Fúquene, 11/3 ca 50 ex. Nevado del Ruiz.

White-thighed Swallow *Atticora tibialis* 3/3 ca 10 ex. Arrierito, 7/3 2 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras.

Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 16 dagar.

Gray-breasted Martin *Progne chalybea* 27/2 5 ex. San Vicente, 1/3 ca 20 ex. Medio Magdalena, 2/2 2 ex. Arrierito, 9/3 4 ex. Jardin.

White-winged Swallow *Tachycineta albiventer* 1/3 10 ex. Medio Magdalena.

Collared Sand Martin *Riparia riparia* 1/3 ca 10 ex. Medio Magdalena.

Barn Swallow *Hirundo rustica* 24/2 1 ex. Laguna de Fúquene, 1/3 ca 50 ex. Medio Magdalena, 9/3 ca 30 ex. Rio Cauca, 16/3 ca 100 ex., 17/3 ca 50 ex. Los Flamencos.

TROGLODYTIDAE

Bicolored Wren *Campylorhynchus griseus* 25/2 2 ex. San Gil, 5 ex. San Gil–Zapoteca, 26/2 2 ex., 27/2 5 ex. Reinita, 28/2 5 ex. Pauxi, 1/3 ca 25 ex. Medio Magdalena, 12/3 3 ex.+8 sj., 15/3 2 sj. Minca, 15/3 1 sj. Tayrona, 16/3 2 ex.+4 sj., 17/3 1 ex.+1 sj. Los Flamencos.

White-headed Wren *Campylorhynchus albobrunneus* 7/3 6 ex., 8/3 3 ex. Las Tangaras.

Sharpe's Wren *Cinnycerthia olivascens* 7/3 ca 15 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras, 10/3 5 ex. Rio Blanco.

Grass Wren *Cistothorus platensis* 11/3 6 ex. Nevado del Ruiz.

Apolinar's Wren *Cistothorus apolinari* (EN) 23/2 3 sj. La Florida, 24/2 4 ex.+2 sj. Laguna de Fúquene.

Sooty-headed Wren *Pheugopedius spadix* 28/2 1 ex.+1 sj. Pauxi, 2/3 3 sj., 3/3 2 sj. Arrierito.

Black-bellied Wren *Pheugopedius fasciatoventris* 28/2 2 sj. Pauxi.

Whiskered Wren *Pheugopedius mystacalis* 25/2 2 sj. Zapoteca–San Vicente, 26/2 6 sj., 27/2 3 sj. Reinita.

Rufous-breasted Wren *Pheugopedius rutilus* 12/3 3 ex.+2 sj., 15/3 1 sj. Minca.

Rufous-and-white Wren *Thryophilus rufalbus* 25/2 1 sj. Zapoteca–San Vicente, 12/3 2 sj. ♂+2 sj., 15/3 2 sj. Minca.

Niceforo's Wren *Thryophilus nicefori* (CR) 25/2 2 ex. San Gil. Vackert!

Bay Wren *Cantorchilus nigricapillus* 7/3 1 sj. Las Tangaras.

Buff-breasted Wren *Cantorchilus leucotis* 16/3 2 ex. Los Flamencos.

Southern House-Wren *Troglodytes musculus* Noterad under 16 dagar med 1-6 ex.

Mountain Wren *Troglodytes solstitialis* 5/3 1 ex. Colibri del Sol, 10/3 3 ex. Rio Blanco.

Gray-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucophrys* Noterad under 10 dagar i centrala Colombia med max. 6 ex.+10 sj. vid Las Tangaras den 7/3. Från Santa Marta/El Dorado finns följande obsar: 12/3 2 ex.+3 sj., 13/3 1 ex.+3 sj., 14/3 10 sj., 15/3 2 sj. (*bangsi*) samt 13/3 3 ex.+1 sj. (*anachoreta*). Höghöjdsrasen *anachoreta* kommer med största sannolikhet att splittas till en egen art.

Munchique Wood-Wren *Henicorhina negreti* (CR) 6/3 1 sj. ♂ Urrao–El Carmen.

White-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucosticta* 1/3 2 ex. Pauxi.

Southern Nightingale-Wren *Microcerculus marginatus* 28/2 5 sj. Pauxi, 2/3 3 sj., 3/3 2 sj. Arrierito, 12/3 1 sj., 15/3 1 sj. Minca.

Chestnut-breasted Wren *Cyphorhinus thoracicus* 6/3 1 sj. Urrao–El Carmen.

POLIOPTILIDAE

Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus melanurus* 28/2 1 sj. Pauxi.

Tropical Gnatcatcher *Polioptila plumbea* 9/3 2 ♂ Rio Cauca, 16/3 ca 15 ex., 17/3 ca 10 ex. Los Flamencos.

CINCLIDAE

White-capped Dipper *Cinclus leucocephalus* 4/3 1 ex., 6/3 3 ex. Colibri del Sol, 7/3 1 ex. Las Tangaras.

TURDIDAE

Andean Solitaire *Myadestes ralloides* 26/2 4 sj. Reinita, 2/3 1 sj., 3/3 1 sj. Arrierito, 6/3 2 sj. Colibri del Sol, 2 sj. Urrao–El Carmen, 7/3 2 sj., 8/3 2 ex.+4 sj. Las Tangaras.

Black-billed Thrush *Turdus ignobilis* Tämligen allmän i centrala Colombia, sedd under 13 dagar.

Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas* 24/2 5 ex., 25/2 ca 10 ex. San Gil, 12/3 8 ex., 15/3 5 ex. Minca, 14/3 2 ex. El Dorado.

Clay-colored Thrush *Turdus grayi* 12/3 1 ex. Minca.

Yellow-legged Thrush *Turdus flavipes* 25/2 2 ♂, 1 ♀ Zapoteca–San Vicente, 26/2 1 sj. ♂, 27/2 5 ex. Reinita, 28/2 3 ♂ Pauxi, 12/3 6 ex., 14/3 8 ex. El Dorado.

Glossy-black Thrush *Turdus serranus* 4/3 3 sj., 5/3 2 sj., 6/3 3 sj. Colibri del Sol, 6/3 1 ♂+2 sj. Urrao–El Carmen.

Great Thrush *Turdus fuscater* Vanlig i den tempererade zonen i centrala Colombia, sedd under 12 dagar. Dessutom 20-talet ex. vid El Dorado 13/3 (*cacozelus*)

Black-hooded Thrush *Turdus olivater sanctaemartae* 14/3 5 ex. El Dorado.

Orange-billed Nightingale-Thrush *Catharus aurantiirostris* 24/2 1 sj., 25/2 2 ex. San Gil (*insignis*), 15/3 1 sj. El Dorado (*sierrae*).

Slaty-backed Nightingale-Thrush *Catharus fuscater sanctaemartae* 13/3 1 sj. (SH), 14/3 1 ex. El Dorado.

Gray-cheeked Thrush *Catharus minimus* 24/2 1 ex. San Gil.

Swainson's Thrush *Catharus ustulatus* 25/2 2 ex. San Gil, 26/2 1 ex. Reinita, 28/2 3 ex. Pauxi, 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 3/3 1 ex. Arrierito.

MIMIDAE

Tropical Mockingbird *Mimus gilvus* Observerad under 12 dagar med max. 20 ex. den 27/2 kring Reinita och Pauxi.

PARULIDAE

Tennessee Warbler *Leiothlypis peregrina* 25/2 4 ex. Zapoteca–San Vicente, 27/2 2 ex. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi, 12-15/3 10-20 ex. dagligen Minca/El Dorado.

Tropical Parula *Parula pitiayumi* 24/2 1 sj., 25/2 3 ex. San Gil, 25/3 2 ex. Zapoteca–San Vicente, 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 2 ex.+2 sj. Pauxi, 8/3 1 ex.+2 sj. Las Tangaras.

Yellow Warbler *Dendroica (petechia) aestiva* 24/2 1 ex. Laguna de Fúquene, 25/2 5 ex. San Gil, 3/3 1 ex. Arrierito–Medellín, 9/3 1 ♂ Rio Cauca, 12/3 5 ex., 15/3 2 ex. Minca, 16/3 2 ex. Los Flamencos.

Blackburnian Warbler *Dendroica fusca* 23/2 5 ex. Mundo Nuevo, 25/2 10 ex. Zapoteca–San Vicente, 26/2 ca 15 ex., 27/2 ca 10 ex. Reinita, 28/2 4 ex. Pauxi, 2/3 5 ex., 3/3 10 ex. Arrierito, 5/3 2 ♂, 6/3 2 ♂ Colibri del Sol, 6/3 4 ♂ Urrao–El Carmen, 7/3 5 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. Jardin, 10/3 ca 15 ex. Rio Blanco, 11/3 1 ex. Manizales, 13/3 5 ex., 14/3 8 ex. El Dorado.

Bay-breasted Warbler *Dendroica castanea* 28/2 10-15 ex., 1/3 1 ex. Pauxi, 3/3 3 ex. Arrierito, 7/3 1 ex. Las Tangaras.

Cerulean Warbler *Dendroica caerulea* (VU) 26/2 5 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 2 ♂ Pauxi.

Black-and-white Warbler *Mniotilta varia* 25/2 1 ex. Zapoteca–San Vicente, 26/2 7 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 5 ex. Pauxi, 2/3 1 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 8/3 1 ex. Las Tangaras, 10/3 2 ex. Rio Blanco, 13/3 1 ex., 14/3 3 ex. El Dorado, 15/3 2 ex. Minca, 17/2 2 ex. Los Flamencos.

American Redstart *Setophaga ruticilla* 27/2 1 ♂ Reinita, 28/2 4 ex. Pauxi, 12/3 1 ♂, 15/3 4 ex. Minca, 14/3 8 ex. El Dorado.

Prothonotary Warbler *Protonotaria citrea* 16-17/3 1 ex. Los Flamencos.

Northern Waterthrush *Parkesia noveboracensis* 24-25/2 1 ex. San Gil, 28/2 1 ex. Pauxi, 1/3 1 ex. Medio Magdalena, 15/3 1 ex. Tayrona, 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Mourning Warbler *Oporornis philadelphia* 27/2 2 ♂ Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi.

Canada Warbler *Wilsonia canadensis* 25/2 1 ex. Zapoteca–San Vicente, 26/2 ca 10 ex., 27/2 3 ex. Reinita, 28/2 5 ex. Pauxi, 2/3 3 ex., 3/3 5 ex. Arrierito, 7/3 2 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Slate-throated Whitestart *Myioborus miniatus* 26/2 ca 20 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 2/3 5 ex., 3/3 5 ex. Arrierito, 4/3 1 ex. Colibri del Sol, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 ca 15 ex., 8/3 ca 10 ex. Las Tangaras, 10/3 5 ex. Rio Blanco (*ballux*), 12/3 2 ex., 13/3 2 ex., 14/3 10 ex. El Dorado (*santaemartae*).

Golden-fronted Whitestart *Myioborus ornatus* 23/2 5 ex.+4 sj. Mundo Nuevo (*ornatus*), 5/3 10 ex., 6/3 10 ex. Colibri del Sol, 6/3 4 ex. Urrao–El Carmen, 9/3 ca 15 ex. Jardin, 10/3 ca 10 ex. Rio Blanco, 11/3 5 ex.+1 sj. Nevado del Ruiz (*chrysops*).

Yellow-crowned Whitestart *Myioborus flavivertex* 13/3 ca 10 ex. El Dorado.

Citrine Warbler *Basileuterus luteoviridis* 5/3 1 ex. (HH), 6/3 1 ex. Colibri del Sol, 9/3 3 ex. Jardin (*richardsoni*), 10/3 1 ex. Rio Blanco (*quindianus*).

Black-crested Warbler *Basileuterus nigrocristatus* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

White-lored Warbler *Basileuterus conspicillatus* (nt) 12/3 1 ex. (OE), 13/3 3 ex., 14/3 10 ex. El Dorado.

Russet-crowned Warbler *Basileuterus coronatus* 5/3 1 sj., 6/3 4 ex. Colibri del Sol, 6/3 1 ex. Urrao–El Carmen, 10/3 5 ex.+2 sj. Rio Blanco.

Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus* 25/2 2 ex. Zapoteca–San Vicente (NK, EJ).

Chestnut-capped Warbler *Basileuterus (rufifrons) delatarii* 25/2 4 ex. San Gil, 28/2 2 ex., 1/3 1 ex. Pauxi, 12/3 4 ex., 15/3 2 ex. Minca.

Three-striped Warbler *Basileuterus tristriatus* 26/2 2 ex. Reinita, 2/3 6 ex., 3/3 5 ex. Arrierito, 7/3 7 ex., 8/3 3 ex. Las Tangaras.

Santa Marta Warbler *Basileuterus basilicus* (VU) 13/3 3 ex. El Dorado.

Buff-rumped Warbler *Phaeothlypis fulvicauda* 28/2 3 ex.+3 sj., 1/3 2 ex.+1 sj. Pauxi, 3/3 2 ex.+1 sj. Arrierito.

THRAUPIDAE

Black-faced Tanager *Schistochlamys melanopis* 2-3/3 2 ex. Arrierito.

Black-capped Hemispingus *Hemispingus atropileus* 6/3 3 ex. Colibri del Sol, 9/3 4 ex. Jardin, 10/3 ca 10 ex. Rio Blanco.

Superciliaried Hemispingus *Hemispingus superciliaris* 10/3 5 ex. Rio Blanco.

Black-headed Hemispingus *Hemispingus verticalis* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 5/3 2 ex. Colibri del Sol.

Black-eared Hemispingus *Hemispingus melanotis* 10/3 3 ex. Rio Blanco.

Gray-hooded Bush Tanager *Cnemoscopus rubrirostris* 6/3 7 ex. Colibri del Sol, 9/3 ca 15 ex. Jardin, 10/3 ca 15 ex. Rio Blanco.

Gray-headed Tanager *Eucometis penicillata* 28/2 1 ex. Pauxi (OE), 12/3 2 ex. Minca.

Tawny-crested Tanager *Tachyphonus delatarii* 8/3 1 ♂ Las Tangaras.

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus* 27/2 3 ex. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi, 12/3 2 ♂, 15/3 1 ♀ Minca.

Crimson-backed Tanager *Ramphocelus dimidiatus* 25/2 2 ex. San Gil, 1 ex. längs med vägen, 26/2 3 ex. Reinita, 27/2 ca 15 ex. Reinita/Pauxi, 28/2 ca 20 ex. Pauxi, 1/3 ca 30 ex. Medio Magdalena, 2/3 4 ex., 3/3 ca 20 ex. Arrierito, 12/3 5 ex., 15/3 3 ex. Minca.

Flame-rumped Tanager *Ramphocelus flammigerus* 4/3 2 ♂ Medellín–Bolombolo, 7/3 4 ♂, 8/3 10 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. Rio Cauca.

Lemon-rumped Tanager *Ramphocelus (f.) icteronotus* 26/2 2 ♂, 27/2 5 ex. Reinita, 28/2 2 ♂ Pauxi, 1/3 några ex. Medio Magdalena, 2/3 ca 10 ex., 3/3 5 ex. Arrierito, 7/3 5 ex. Las Tangaras.

Blue-capped Tanager *Thraupis cyanocephala* 5/3 4 ex., 6/3 6 ex. Colibri del Sol, 6/3 2 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 2 ex. Las Tangaras, 13/3 6 ex. El Dorado.

Palm Tanager *Thraupis palmarum* Tämligen allmän, sedd under 12 dagar.

Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus* Tämligen allmän, sedd under 16 dagar.

Glaucous Tanager *Thraupis glaucocolpa* 16/3 4 ex., 17/3 6 ex. Los Flamencos.

Black-and-gold Tanager *Bangsia melanochlamys* (VU) 7/3 7 ex., 8/3 7 ex. Las Tangaras.

Gold-ringed Tanager *Bangsia aureocincta* (EN) 7/3 1 ♂ Las Tangaras.

Hooded Mountain-Tanager *Buthraupis montana* 23/2 5 ex. Mundo Nuevo, 10/3 ca 10 ex. Rio Blanco.

Scarlet-bellied Mountain-Tanager *Anisognathus igniventris* 23/2 ca 10 ex. Mundo Nuevo, 11/3 3 ex.+2 sj. Nevado del Ruiz.

Santa Marta Mountain-Tanager *Anisognathus melanogenys* 13/3 ca 10 ex. El Dorado.

Lacrimose Mountain-Tanager *Anisognathus lacrymosus* 5/3 2 ex. Colibri del Sol, 9/3 5 ex. Jardin, 10/3 3 ex. Rio Blanco.

Blue-winged Mountain-Tanager *Anisognathus somptuosus* 26/2 1 ex. Reinita, 3/3 2 ex. Arrierito, 7/3 10 ex., 8/3 7 ex. Las Tangaras, 9/3 2 ex. Jardin, 10/3 ca 5 ex. Rio Blanco.

Black-chinned Mountain-Tanager *Anisognathus notabilis* 7/3 4 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras.

Grass-green Tanager *Chlorornis riefferii* 6/3 3 ex. Urrao–El Carmen, 9/3 2 ex. Jardin, 10/3 5 ex. Rio Blanco.

Buff-breasted Mountain-Tanager *Dubusia taeniata* 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Purplish-mantled Tanager *Iridosornis porphyrocephala* (nt) 2/3 1 ex. Arrierito (OE), 6/3 4 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 7 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota* 24/2 1 ♂ Laguna de Fúquene. Mitt ute i ett vassbälte!

Glistening-green Tanager *Chlorochrysa phoenicotis* 7/3 5 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Multicolored Tanager *Chlorochrysa nitidissima* (VU) 2/3 3 ex. Arrierito.

Plain-colored Tanager *Tangara inornata* 28/2 2 ex. Pauxi.

Rufous-throated Tanager *Tangara rufigula* 7/3 2 ex., 8/3 3 ex. Las Tangaras.

Golden Tanager *Tangara arthus* 26/2 3 ex. Reinita, 2/3 3 ex., 3/3 8 ex. Arrierito, 7/3 ca 10 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras.

Silver-throated Tanager *Tangara icterocephala* 2/3 2 ex., 3/3 6 ex. Arrierito, 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Saffron-crowned Tanager *Tangara xanthocephala* 7/3 5 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras.

Metallic-green Tanager *Tangara labradorides* 26/2 3 ex. Reinita.

Beryl-spangled Tanager *Tangara nigroviridis* 26/2 5 ex., 27/2 1 ex. Reinita, 2/3 5 ex., 3/3 1 ex. Arrierito, 6/3 ca 10 ex. Urrao–El Carmen, 7/3 ca 10 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras, 9/3 3 ex. Jardin, 10/3 ca 5 ex. Rio Blanco.

Blue-and-black Tanager *Tangara vassorii* 23/2 6 ex. Mundo Nuevo, 5/3 5 ex., 6/3 ca 10 ex. Colibri del Sol, 9/3 5 ex. Jardin, 10/3 4 ex. Rio Blanco.

Black-capped Tanager *Tangara heinei* 26/2 1 ♂, 27/2 1 ♂ Reinita, 2/3 1 par, 3/3 3 ex. Arrierito, 4/3 1 par Colibri del Sol, 12/3 4 ex., 13/3 4 ex., 14/3 6 ex. El Dorado.

Black-headed Tanager *Tangara cyanoptera* 12/3 1 ♂, 14/3 2 ♂ El Dorado, 15/3 1 par Minca.

Scrub Tanager *Tangara vitriolina* 24/2 2 ex., 25/3 2 ex. San Gil, 25/3 ca 15 ex. San Gil–Zapoteca, 26/2 1 ex., 27/2 ca 10 ex. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi, 2/3 10 ex., 3/3 5 ex. Arrierito, 6/3 2 ex. Colibri del Sol, 7/3 2 ex. Las Tangaras, 9/3 1 ex. Rio Cauca, 11/3 1 ex. Manizales.

Blue-necked Tanager *Tangara cyanicollis* 26/2 1 ex., 27/2 5 ex. Reinita, 27/2 5 ex, 28/2 ca 10 ex., 1/3 2 ex. Pauxi, 2/3 2 ex., 3/3 5 ex. Arrierito.

Golden-hooded Tanager *Tangara larvata* 7/3 2 ex. Las Tangaras.

Speckled Tanager *Tangara guttata* 27/2 2 ex. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi, 3/3 1 ex. Arrierito.

Bay-headed Tanager *Tangara gyrola* 27/2 2 ex. Reinita, 27/2 3 ex., 28/2 ca 10 ex. Pauxi, 2/3 3 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 7/3 1 ex. Las Tangaras, 12/3 2 ex., 15/3 5 ex. Minca, 13/3 1 ex., 14/3 ca 10 ex. El Dorado.

Swallow Tanager *Tersina viridis griseescens* 12/3 4 ex., 15/3 5 ex. Minca, 14/3 3 ex. El Dorado.

Turquoise Dacnis *Dacnis hartlaubi* (VU) 27/2 2 ♂, 1 ♀ Reinita.

Blue Dacnis *Dacnis cayana* 12/3 1 ♀ Minca.

Yellow-tufted Dacnis *Dacnis (lineata) egregia* 27/2 1 ♂ San Vicente–Pauxi, 28/2 1 ♂ Pauxi, 1/3 1 ♂ Medio Magdalena.

Red-legged Honeycreeper *Cyanerpes cyaneus* 12/3 1 ♂ Minca (OE).

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza* 28/2 1 ♂ Pauxi.

Guira Tanager *Hemithraupis guira* 28/2 1 par Pauxi, 9/3 1 par Rio Cauca.

Scarlet-and-white Tanager *Chrysothlypis salmoni* 3/3 1 ♂ Arrierito.

Rufous-browed Conebill *Conirostrum rufum* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo.

Blue-backed Conebill *Conirostrum sitticolor* 23/3 3 ex. Mundo Nuevo, 5/3 1 ex. Colibri del Sol, 9/3 4 ex. Jardin.

Capped Conebill *Conirostrum albifrons* 23/2 1 par Mundo Nuevo (*albifrons*), 6/3 4 ex. Colibri del Sol, 9/3 1 ♀ Jardin (*atrocyaneum?*), 10/3 5 ex. Rio Blanco, 11/3 1 ex. Nevado del Ruiz (*centralandium*).

Rusty Flowerpiercer *Diglossa sittoides* 12/3 1 ♂, 14/3 2 ♂ El Dorado.

Chestnut-bellied Flowerpiercer *Diglossa gloriosissima* (EN) 5/3 4 ex. Colibri del Sol.

White-sided Flowerpiercer *Diglossa albilatera* 23/2 1 par Mundo Nuevo, 4-6/3 1 par Colibri del Sol, 7/3 2 ♂ Las Tangaras, 10/3 ca 5 ex. Rio Blanco, 12/3 ca 10 ex., 13/3 5 ex., 14/3 5 ex. El Dorado.

Glossy Flowerpiercer *Diglossa lafresnayii* 23/2 5 ex. Mundo Nuevo.

Black Flowerpiercer *Diglossa humeralis* 24/2 3 ex. Laguna de Fúquene, 11/3 ca 20 ex. Nevado del Ruiz.

Black-throated Flowerpiercer *Diglossa brunneiventris* 5/3 4 ex. Colibri del Sol.

Indigo Flowerpiercer *Diglossa indigotica* 7/3 2 ex., 8/3 1 ex. Las Tangaras.

Masked Flowerpiercer *Diglossa cyanea* 23/2 ca 20 ex. Mundo Nuevo, 26/2 3 ex. Reinita, 5/3 2 ex., 6/3 2 ex. Colibri del Sol, 9/3 2 ex. Jardin, 10/3 5 ex. Rio Blanco.

Plushcap *Catamblyrhynchus diadema* 10/3 4 ex. Rio Blanco, 13/3 1 ex. El Dorado.

Black-backed Bush Tanager *Urothraupis stolzmanni* 11/3 minst 5 ex. Nevado del Ruiz.

INCERTAE SEDIS

Bananaquit *Coereba flaveola* 24/2 ca 15 ex. Barbosa–San Gil, 25/2 ca 10 ex. San Gil, 27/2 3 ex. Reinita, 28/2 ca 20 ex., 1/3 någa ex. Pauxi, 3/3 5 ex. Arrierito, 12/3 1 sj. Minca, 16/3 7 ex., 17/3 ca 10 ex. Los Flamencos.

Yellow-faced Grassquit *Tiaris olivacea* 26/2 1 ex.+1 sj., 27/2 ca 10 ex. Reinita, 28/2 5 ex. Pauxi, 4/3 1 sj. längs med vägen, 7/3 1 ♂, 8/3 1 sj. Las Tangaras.

Black-faced Grassquit *Tiaris bicolor* 24/2 1 ex., 25/2 2 ex. San Gil, 17/3 2 ex. Los Flamencos.

Streaked Saltator *Saltator striatipectus* 25/2 5 ex. San Gil, 2 ex. San Gil–Zapoteca, 27/2 7 ex. Reinita, 27/2 3 ex., 28/2 5 ex. Pauxi, 12/3 5 ex., 15/3 1 ex. Minca, 16/3 3 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Grayish Saltator *Saltator coerulescens* 12/3 2 ex. Minca, 16/3 7 ex., 17/3 1 ex. Los Flamencos.

Buff-throated Saltator *Saltator maximus* 28/2 1 ex.+1 sj. Pauxi, 2/3 1 ex., 3/3 2 ex. Arrierito, 12/3 5 ex., 15/3 3 ex. Minca, 14/3 1 ex. El Dorado.

Black-winged Saltator *Saltator atripennis* 2-3/3 1 ex. Arrierito, 7/3 1 ex., 8/3 2 ex. Las Tangaras.

Orinocan Saltator *Saltator orenocensis* 16/3 3 ex. Los Flamencos.

Masked Saltator *Saltator cinctus* (nt) 10/3 1 ex. Rio Blanco.

EMBERIZIDAE

Gray Pileated-Finch *Coryphospingus pileatus* 16/3 7 ex. Los Flamencos.

Plumbeous Sierra-Finch *Phrygilus unicolor* 11/3 4 ♂ Nevado del Ruiz.

Blue-black Grassquit *Volatiania jacarina* 24/2 1 ♂ längs med vägen, 27/2 2 ex. Reinita, 2 ♂ Pauxi, 1/3 2 ♂ Medio Magdalena, 12/3 5 ex. Minca, 14/3 1 ♂ El Dorado.

Gray Seedeater *Sporophila intermedia* 25/3 1 ♂ San Gil.

Yellow-bellied Seedeater *Sporophila nigricollis* 27/2 5 ex. Reinita, 1 ♂ San Vicente–Pauxi, 28/2 ca 5 ex. Pauxi, 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 3/3 3 ex. Arrierito.

Ruddy-breasted Seedeater *Sporophila minuta* 27/2 1 par San Vicente–Pauxi, 28/2 2 ♂ Pauxi, 1/3 3 ex. Medio Magdalena, 12/3 1 ♂ Minca.

Thick-billed Seed-Finch *Oryzoborus funereus* 27/2 4 ex. Reinita, 28/2 4 ex. Pauxi, 1/3 2 ex. Medio Magdalena, 3/3 1 ♂ Arrierito, 12/3 1 ♂, 15/3 1 ♂ Minca.

Band-tailed Seedeater *Catamenia analis* 24/2 1 ♂ Laguna de Fúquene.

Plain-colored Seedeater *Catamenia inornata* 11/3 5 ex. Nevado del Ruiz.

Páramo Seedeater *Catamenia homochroa* 5/3 1 ♂ Colibri del Sol.

Saffron Finch *Sicalis flaveola* Rätt allmän på lägre höjd 24/2-1/3, i övrigt 1 ex. längs med vägen 3/3 och 1 ex. Manizales 11/3.

Common Bush Tanager *Chlorospingus (ophthalmicus) flavopectus* 26/2 ca 20 ex. Reinita, 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Dusky Bush Tanager *Chlorospingus semifuscus* 7/3 5 ex., 8/3 5 ex. Las Tangaras.

Yellow-throated Bush Tanager *Chlorospingus flavigularis* 2/3 ca 20 ex., 3/3 ca 15 ex. Arrierito.

Yellow-throated Brush-Finch *Atlapetes (albinucha) gutturalis* 27/2 2 ex. Reinita, 2/3 2 ex., 3/3 6 ex. Arrierito, 7/3 1 ex. Las Tangaras.

Pale-naped Brush-Finch *Atlapetes pallidinucha* 11/3 6 ex. Nevado del Ruiz.

Santa Marta Brush-Finch *Atlapetes melanocephalus* 12/3 6 ex., 13/3 ca 10 ex., 14/3 ca 15 ex., 15/3 5 ex. El Dorado.

Tricolored Brush-Finch *Atlapetes tricolor* 7/3 3 ex., 8/3 4 ex. Las Tangaras.

Slaty Brush-Finch *Atlapetes schistaceus* 23/2 2 ex. Mundo Nuevo, 5/3 6 ex., 6/3 1 ex. Colibri del Sol, 9/3 4 ex. Jardin, 10/3 4 ex. Rio Blanco.

Black-striped Sparrow *Arremonops conirostris* 28/2 1 ex.+1 sj. Pauxi.

Chestnut-capped Brush-Finch *Arremon brunneinuchus* 26/2 1 ex. Reinita, 7/3 3 ex. Las Tangaras.

Stripe-headed Brush-Finch *Arremon assimilis* 5/3 4 ex. Colibri del Sol, 10/3 2 ex. Rio Blanco.

Colombian Brush-Finch *Arremon basilicus* 12/3 3 ex., 13/3 3 ex., 14/3 2 ex. El Dorado.

Orange-billed Sparrow *Arremon aurantirostris* 28/2 1 ex. Pauxi.

Golden-winged Sparrow *Arremon schlegeli* 25/2 2 ex. San Gil (*canidorsum*), 12/3 1 ex. Minca (NK – *schlegeli*).

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis* Tämligen allmän, sedd under 19 dagar.

CARDINALIDAE

Highland Hepatic-Tanager *Piranga (flava) lutea* 27/2 1 ♂ Reinita, 28/2 1 ♀ Pauxi.

Summer Tanager *Piranga rubra* 24/2 1 ♀ Barbosa–San Gil, 24/2 3 ex., 25/2 1 ex. San Gil, 25/2 5 ex. längs med vägen, 26/2 2 ♂, 27/2 3 ex. Reintia, 28/2 5 ex. Pauxi, 2/3 1 ♂, 3/3 2 ex. Arrierito, 7/3 2 ♂ Las Tangaras, 15/3 2 ex. Minca.

White-winged Tanager *Piranga leucoptera* 3/3 1 ♂ Arrierito.

Red-hooded Tanager *Piranga rubriceps* 10/3 3 ex. Rio Blanco.

Sooty Ant-Tanager *Habia gutturalis* (nt) 28/2 5 ex. Pauxi.

Crested Ant-Tanager *Habia cristata* 7/3 1 ♂ Las Tangaras (NK, JJ).

Golden-bellied Grosbeak *Pheucticus chrysogaster* 13/3 1 ♂ El Dorado.

Black-backed Grosbeak *Pheucticus aureoventris* 24/2 2 ♂ Laguna de Fúquene.

Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus* 27/2 4 ex. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi, 7/3 2 ♂ Las Tangaras, 15/3 1 ♂, 1 ♀ Minca.

Vermilion Cardinal *Cardinalis phoeniceus* 16/3 2 ♂, 17/3 1 ♂, 1 ♀ Los Flamencos.

ICTERIDAE

Yellow-hooded Blackbird *Chrysomus icterocephalus* 23/2 ca 25 ex. La Florida, 24/2 ca 100 ex. Laguna de Fúquene.

Red-breasted Blackbird *Sturnella militaris* 1/3 10 ex. Medio Magdalena, 3/3 2 ex. Arrierito–Medellín, 4/3 4 ex. kring Urrao.

Eastern Meadowlark *Sturnella magna* 23/2 2 ex.+2 sj. Mundo Nuevo, 24/2 3 ex. Laguna de Fúquene, 26/2 1 sj. Reinita.

Great-tailed Grackle *Quiscalus mexicanus* 15/3 ca 15 ex. Santa Marta–Riohacha, 16/3 ca 20 ex., 17/3 ca 30 ex. Los Flamencos.

Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* Sedd under 12 dagar med max. 30 ex. vid Los Flamencos 16/3.

Giant Cowbird *Molothrus oryzivorus* 26/2 5 ex., 27/2 5 ex. Reinita, 3/3 1 ex., 4/3 3 ex. längs med vägen, 12/3 1 ex. Minca.

Yellow Oriole *Icterus nigrogularis* 16/3 ca 10 ex., 17/3 4 ex. Los Flamencos, 17/3 2 ex. Santa Marta–Ciéneqa.

Yellow-backed Oriole *Icterus chrysater* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo–Bogotá, 24/2 2 ex. Laguna de Fúquene, 25/2 5 ex. San Gil–San Vicente, 26/2 2 ex.+1 sj., 27/2 7 ex.+3 sj. Reinita, 1/3 1 sj. Medio Magdalena, 8/3 1 ex. Las Tangaras, 12/3 2 ex. El Dorado.

Yellow-tailed Oriole *Icterus mesomelas* 27/2 1 ex. Reinita, 28/2 1 ex. Pauxi.

Orange-crowned Oriole *Icterus auricapillus* 1/3 1 ex. Pauxi, 12/3 2 ex., 15/3 2 ex. Minca.

Baltimore Oriole *Icterus galbula* 27/2 1 ♂ Reinita, 12/3 1 ♂ Minca, 16/3 2 ♂, 17/3 1 ♂ Los Flamencos.

Yellow-billed Cacique *Amblycercus holosericeus* 13/3 2 ex. El Dorado.

Yellow-rumped Cacique *Cacicus cela* 1/3 15 ex. Medio Magdalena.

Northern Mountain-Cacique *Cacicus leucorhamphus* 9/3 2 ex. Jardin, 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Crested Oropendola *Psarocolius decumanus* 1/3 3 ex. Medio Magdalena, 3/3 2 ex. Arrierito–Medellín, 12-15/3 5-30 ex. dagligen Minca/El Dorado.

Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons* 26/2 12 ex.+hörd, 27/2 några ex. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi, 3/3 2 ex. Arrierito.

Red-bellied Grackle *Hypopyrrhus pyrohypogaster* (VU) 3/3 2 ex. Arrierito, 8/3 3 ex. Las Tangaras (EJ).

FRINGILLIDAE

Trinidad Euphonia *Euphonia trinitatis* 16/3 1 par+5 sj., 17/3 2 sj. Los Flamencos.

Thick-billed Euphonia *Euphonia laniirostris* 24/2 1 ex. längs med vägen, 24/2 1 ex., 25/2 ca 5 ex. San Gil, 27/2 1 ex. Reinita, 27/2 3 ex., 28/3 ca 5 ex. Pauxi, 1/3 några ex. Medio Magdalena, 12/3 5 ex. Minca.

Golden-rumped Euphonia *Euphonia cyanocephala* 24/2 3 par Laguna de Fúquene, 27/2 1 par Reinita, 3/3 1 par Arrierito.

Orange-bellied Euphonia *Euphonia xanthogaster* 26/2 5 ex. Reinita, 28/2 2 ex. Pauxi, 2/3 ca 15 ex., 3/3 ca 10 ex. Arrierito, 7/3 ca 10 ex., 8/3 ca 10 ex. Las Tangaras, 10/3 1 ♂ Rio Blanco.

Blue-naped Chlorophonia *Chlorophonia cyanea psittacina* 12/3 4 ex., 13/3 3 ex., 14/3 10 ex., 15/3 1 ex. El Dorado.

Andean Siskin *Spinus spinescens* 23/3 5 ex. La Florida, 24/2 5 ex. Laguna de Fúquene, 25/2 2 ex. längs med vägen, 11/3 2 ex. Nevado del Ruiz.

Hooded Siskin *Spinus magellanicus* 10/3 1 ♂ Rio Blanco.

Lesser Goldfinch *Spinus psaltria* 24/2 5 ex. San Gil, 27/2 3 ex. Reinita, 27/2 2 ex. Pauxi, 1/3 1 ♂ Medio Magdalena, 12/3 3 ex. Minca.

Däggdjur

Nine-banded Armadillo *Dasyus novemcinctus* 13/3 1 ex. El Dorado (JJ).

Red Howler Monkey *Alouatta seniculus* 13/3 hörd, 14/3 10 ex.+hörd El Dorado.

Red-tailed Squirrel *Sciurus granatellus* 24/2 2 ex., 25/2 5 ex. San Gil, 27/2 2 ex. Reinita, 3/3 1 ex. Arrierito, 12-15/3 2-4 ex. dagligen Minca/El Dorado.

Andean Squirrel *Sciurus pucheranii* 23/2 1 ex. Mundo Nuevo, 2/3 1 ex. Arrierito, 6/3 1 ex. Colibri del Sol, 10/3 1 ex. Rio Blanco.

Western Dwarf Squirrel *Microsciurus mimulus* 8/3 3 ex. Las Tangaras. Taxonomin inom arten är oklar, troligen utgör den här Chocóformen en separat art.

Brazilian Guinea Pig *Cavia aperea* 24/2 1 ex. Laguna de Fúquene.

Central American Agouti *Dasyprocta punctata* 25/2 2 ex. San Gil.

Brazilian Rabbit *Sylvilagus brasiliensis* 11/3 1 ex. Minca, 16/3 2 ex. Los Flamencos.

Northern Gray Fox *Urocyon cinereoargenteus* 10/3 2 ex. Rio Blanco.